

(19)



(11)

EP 2 236 076 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

06.10.2010 Patentblatt 2010/40

(51) Int Cl.:

A61B 5/00 (2006.01)

G06F 19/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **09004527.9**

(22) Anmeldetag: **30.03.2009**

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SI SK TR**

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL BA RS

(71) Anmelder:

- **Roche Diagnostics GmbH
68298 Mannheim (DE)**

Benannte Vertragsstaaten:

DE

- **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG
4070 Basel (CH)**

Benannte Vertragsstaaten:

**AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR**

(72) Erfinder:

- **Blasberg, Peter
69469 Weinheim (DE)**
- **Koehler, Matthias
69514 Laudenbach (DE)**
- **Kloos, Alfred
82008 Unterhaching (DE)**

(54) **Verfahren und System zur Ermittlung der Differenz zwischen prä- und postprandialen Blutzuckerwerten**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und System zur Ermittlung der Differenz zwischen prä- und post-prandialen Blutzuckerwerten.

EP 2 236 076 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und System zur Ermittlung der Differenz zwischen prä- und post-prandialen Blutzuckerwerten.

[0002] Die Frage nach dem Einfluss von Mahlzeiten auf die Höhe des Blutzuckers (nachfolgend auch Blutglukose genannt) bei Diabetikern ist von hoher medizinischer Relevanz. Dies zeigt sich z.B. darin, dass medizinische Fachgesellschaften wie die IDF (International Diabetes Foundation) oder die ADA (American Diabetes Association) Richtlinien zu dieser Thematik veröffentlicht haben (siehe hierzu beispielsweise http://www.idf.org/webdata/docs/Guideline_PMG_final.pdf oder http://care.diabetesjournals.org/cgi/reprint/31/Supplement_1/S12).

[0003] Die Aufnahme von Mahlzeiten bzw. Kohlenhydraten ist der wichtigste Einflussfaktor für eine Erhöhung des Blutzuckers bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Erhöhte Blutzuckerspiegel sind der wichtigste Faktor für die Spätkomplikationen des Diabetes, wie Nierenversagen, Erblindung, Myokardinfarkt, Amputationen, etc.

[0004] Die Ermittlung des mahlzeitenbezogenen Blutzuckeranstiegs für das Individuum in Abhängigkeit von den Hauptmahlzeiten ist allerdings nur unzureichend gelöst.

[0005] Eine Möglichkeit zur Ermittlung der Blutzuckeranstiege stellen experimentelle Tests wie GCT (Glucose Challenge Test) oder OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) dar, bei denen der Patient eine definierte Menge an Glucose aufnimmt und der Blutzucker vor und zu definierten Zeiten nach der Aufnahme bestimmt wird. Diese Tests lassen sich nur unter definierten Bedingungen in professionellen Einrichtungen durchführen, sind zeitaufwändig und für den Patienten belastend. Des weiteren werden diese Test generell ohne den Einfluss anti-diabetischer Therapeutika durchgeführt.

[0006] Medizinisch relevant und interessant ist der Einfluss verschiedener Mahlzeiten auf den Blutzucker unter der typischen Medikation des Patienten. Anhand dessen kann festgestellt werden, ob Art der Medikation, Dosis und Zeit der Verabreichung geeignet sind, postprandiale Blutzuckeranstiege in gewissen Grenzen zu halten.

[0007] Die Selbstmessung des Blutzuckers ist prinzipiell eine gut geeignete Methode, um die erwähnten Effekte zu quantifizieren. Allerdings sind gewisse Randbedingungen einzuhalten und zu überprüfen, um die Validität der Messwerte sicher zu stellen.

[0008] Wichtig ist dabei eine genaue Zuordnung der Blutzuckerwerte zur Mahlzeit vorzunehmen. Insbesondere muss eine Messung unmittelbar vor der Mahlzeit erfolgen, eine weitere Messung muss innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nach der Mahlzeit, typischerweise zwischen 1 und max. 2 Stunden nach der Mahlzeit, erfolgen. Des weiteren sollten mehrere Messwertepaare von mehreren Tagen zu verschiedenen Mahlzeiten bzw. Tageszeiten vorliegen, um statistisch solide Aussagen

zu den Blutzuckeränderungen bei verschiedenen Mahlzeiten treffen zu können.

[0009] Neben den o. g. klinischen Tests GCT und OGTT steht derzeit nur die Selbstmessung der Blutzuckerwerte zur Verfügung. Die gemessenen Werte können dann z.B. in Diabetes-Tagebücher eingetragen werden. Diese Tagebücher weisen häufig Rubriken wie "vor dem Frühstück" und "nach dem Frühstück" auf, in welche dann die gemessenen Werte eingetragen und durch den Arzt begutachtet werden können. Aus der Literatur ist jedoch bekannt, dass manuell erfasste Blutzuckerwerte zu einem hohen Prozentsatz (> 50%) inkorrekt und unvollständig sind (vgl. z. B. Reliability of self-recorded blood glucose data in patient logbooks compared with SMBG data saved in device memory and printed out with Accu-Chek Smart Printer; J. K. Tshiang Tshiananga, D. Franke, M. Luebker, C. Weber, K. Neeser, 43rd EASD (2007) Annual Meeting, Amsterdam). Darüber hinaus ist eine korrekte Einhaltung der Zeitkriterien für die Messungen nicht nachvollziehbar. Weiter ist eine Auswertung mehrerer Messereignisse nur schwer durchzuführen und ebenso fehleranfällig.

[0010] Als Alternative können die Blutzuckerwerte aus dem Speicher des Blutzuckermessgerätes ausgelesen werden und mit entsprechenden Softwareprogrammen analysiert werden. Einige Blutzuckermessgeräte erlauben auch die Markierung einzelner Werte als "prä-" bzw. "postprandial" (d. h. in diesem Zusammenhang als "vor" bzw. "nach" einer Mahlzeit vorgenommen).

[0011] Zumeist basieren diese Software-Auswertungen jedoch darauf, dass die gespeicherten Messwerte anhand des Messzeitpunktes in verschiedene Mahlzeitenklassen eingeordnet werden. Wenn die Mahlzeitenklasse "vor dem Frühstück" z.B. von 5:30 Uhr bis 8:00 Uhr definiert ist, wird ein um 5:32 Uhr gemessener Wert automatisch dieser Mahlzeitenklasse zugewiesen. Teilweise werden auch technische Lösungen angeboten, bei denen unabhängig von der Uhrzeit ein Messwert einer bestimmten Mahlzeitenklasse direkt zugewiesen werden kann.

[0012] Die Mehrzahl der vorhandenen Software-Programme berechnet durchschnittliche Blutzuckerwerte und Streumasse (z.B. Standard-Abweichung oder Spannweite) für die verschiedenen Mahlzeitenklassen.

[0013] Der Nachteil der existierenden Lösungen liegt darin, dass die Art der statistischen Behandlung der gemessenen Blutzuckerwerte eine fehlerhafte Interpretation der mahlzeitenbezogenen Blutzuckerdifferenzen nahelegt.

[0014] Durch die Berechnung der isolierten Statistik für die einzelnen Mahlzeitenklassen werden leicht Rückschlüsse über den Mahlzeiteinfluss anhand von Mittelwertdifferenzen zwischen den 'vor' und 'nach'-Werten (d. h. den prä- und post-prandialen Messwerten) gezogen. Diese können z.B. deshalb irreführend sein, weil die 'vor'-Messungen an anderen Tagen als die 'nach' Messungen erfolgt sind und Unterschiede zwischen den Werten nicht auf die eingenommenen Mahlzeiten zu-

rückzuführen sind. Des weiteren wird in aller Regel außer acht gelassen, dass für eine korrekte Ermittlung der Mahlzeiten-bezogenen Blutzuckeränderung eine korrekte zeitliche Abfolge der Blutzuckermessungen in Relation zur Mahlzeitenaufnahme gegeben sein muss.

[0015] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen. Insbesondere soll die vorliegende Erfindung ein Verfahren und System bereitstellen, dass eine weniger fehleranfällige, vorzugsweise automatisierte Zuordnung von zu einer Mahlzeit gehörenden prä- und postprandialen Blutglukosewerten ermöglicht. So sollen verbesserte Auswertemöglichkeiten und damit verbundene medizinische Rückschlüsse ermöglicht werden.

[0016] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand der Erfindung gelöst.

[0017] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren gemäß Anspruch 1, ein System gemäß Anspruch 8 und ein Computerprogrammprodukt gemäß Anspruch 9. Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0018] Voraussetzung für das nachfolgend beschriebene Verfahren zur Ermittlung mahlzeitenbezogener Blutzuckerwertveränderungen ist die Kennzeichnung von Blutzuckerwerten als 'vor' oder 'nach' der Mahlzeit. Diese Kennzeichnung erfolgt am Blutzuckermessgerät unmittelbar im Zusammenhang mit der Blutzuckermessung. Eine Vielzahl von derzeit kommerziell erhältlichen Blutglukosemessgeräten erlaubt diese Markierung durch entsprechende Eingabe über Bedienknöpfe am Messgerät.

[0019] Die in einem Blutglukosemessgerät gespeicherten Blutglukosemesswerte können nun mit einer relativen (d. h. z. B. von einem internen Zeitzähler ermittelten, der beispielsweise die relative Zeit seit der Herstellung oder Erstinbetriebnahme des Messgeräts ermittelt) oder absoluten (d. h. z. B. mit Datum und Uhrzeit) Zeitmarke versehen werden und zusammen mit diesen Markierungen, die auch als "prä- bzw. postprandiales Flagging" bezeichnet werden, an ein geeignetes Auswerteprogramm übertragen werden. Das Programm kann dabei im Blutzuckermessgerät selbst enthalten sein oder in einem anderen, zur Datenverarbeitung geeigneten Gerät, wie z. B. Computer, Mobiltelefon, PDA oder ähnlichem, laufen.

[0020] In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung ist es möglich, einen unmarkierten bzw. irrtümlich als prä-prandial markierten Wert innerhalb einer bestimmten, vordefinierten Zeitfensters, z. B. 1,5h nach einem als prä-prandial markierten Wert automatisch bzw. nach Rückfrage als post-prandial markierten Wert zu interpretieren. Typischerweise wird dieser Wert dann nachträglich als "nach"-Blutzuckermesswert markiert.

[0021] Erfindungsgemäß werden Mahlzeit-induzierte Blutzuckeränderungen wie folgt ermittelt:

[0022] Die Daten werden, beginnend mit dem ältesten Wert, nach Werten durchsucht, die die Markierung 'vor' tragen, d. h. als prä-prandiale Werte gekennzeichnet

sind.

[0023] Ausgehend von der Uhrzeit eines gefundenen 'vor'-Wertes wird in einem bestimmten Zeitfenster, typischerweise von minimal 60 Minuten und maximal 120 Minuten nach dem "vor"-Wert, nach Blutzuckerwerten mit der Markierung 'nach' gesucht. Werden in diesem Zeitabschnitt mehrere Blutzuckerwerte mit der 'nach'-Markierung gefunden, wird für nachfolgende Berechnung einer der "nach"-Werte, vorzugsweise der höchste der gefundenen Messwerte, verwendet.

[0024] Es wird die Differenz ('nach' minus 'vor') des gefundenen Paares ermittelt und typischerweise unter einer von vier Zeitrubriken ('Frühstück', 'Mittagessen', 'Abendessen' sowie 'Abend / Nacht') gespeichert.

[0025] Die entsprechende Zeitrubrik wird anhand der Messzeit des 'vor'-Wertes ermittelt. Die Zeitblöcke (vor / nach Frühstück, vor / nach Mittagessen, vor / nach Abendessen sowie Abend / Nacht) lassen sich bevorzugt individuell einstellen.

[0026] Wurde ein vor / nach Paar ermittelt und gespeichert, wird typischerweise die Suche nach weiteren Paaren nach dem zuvor gefundenen Paar (d. h. nach der Messzeit des zuvor gefundenen 'nach'-Wertes) fortgesetzt, bis alle Werte bis zum jüngsten Blutzuckermesswert durchsucht sind.

[0027] Anschließend werden die Anzahl, der Mittelwert und die Standardabweichung für alle gefundenen Paare sowie für die genannten Zeitblöcke ermittelt und ausgegeben.

[0028] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird sichergestellt, dass jeweils zu einer bestimmten Mahlzeit gehörende Blutzuckermesswertepaare miteinander verglichen werden. Dadurch wird eine zuverlässigere Aussage über den Einfluss einzelner Mahlzeiten auf den Blutzuckerwert und den Effekt der Therapiemaßnahmen (z. B. Insulingabe durch Spritzen, Pens oder Insulinpumpen, orale Einnahme von Blutzucker senkenden Medikamenten) ermöglicht.

[0029] Die Erfindung soll anhand der Figur näher erläutert werden.

[0030] Figur 1 zeigt exemplarisch anhand eines Reports eine mögliche Darstellungsform von Blutglukosemessdaten.

[0031] Die vor bzw. nach Mahlzeiten ermittelten Blutglukosemesswerte sind durch den Benutzer des Messsystems markiert worden und werden in der Darstellung der Figur 1 mit leeren Quadraten (vor einer Mahlzeit ermittelter Wert) und vollen Quadraten (nach einer Mahlzeit ermittelter Wert) gekennzeichnet. Im oberen, tabellenartigen Bereich der Figur 1 sind die eigentlichen Messdaten mit Wochentag, Datum, Uhrzeitbereich und "vor"- bzw. "nach"-Markierung dargestellt. In der Tabelle sind neben allgemeinen statistischen Werten auch die Werte für die Anzahl n der "vor" und "nach"-Blutzuckermesswerte (d. h. der prä- und postprandialen Blutglukosemesswerte), ihre Durchschnittswerte (MBG für engl. "mean blood glucose value"), Standardabweichungen (SD für engl. "standard deviation") sowie die Differenz-

werte für zueinander gehörige prä- und postprandialen Blutglukosemesswertepaare (ΔBG) in den jeweiligen Zeitblöcken dargestellt. Eine Zusammenfassung der Daten für alle Messwerte findet sich im darunterliegenden Abschnitt. Hier ist auch ersichtlich, dass bei der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht für alle präprandialen Messwerte dazugehörige postprandiale Werte gefunden wurden, da die Anzahl der Wertepaare in der Rubrik ΔBG nur 32 beträgt, insgesamt aber 42 prä- und 42 postprandialen Werte gemessen wurden.

[0032] Das erfindungsgemäße Verfahren und System ermöglicht ein einfaches Erkennen und Darstellen der sogenannten Meal-Excursions, d. h. des Anstiegs oder Abfalls des Blutzuckerwertes nach der Einnahme von Mahlzeiten. Dies wiederum erlaubt eine vereinfachte und verbesserte Kontrolle der Insulintherapie und ggf. eine Anpassung von Dosis und Zeitpunkt von mahlzeitenbezogenen Insulingaben und so schlussendlich eine Verbesserung der Therapie und eine Verringerung oder Vermeidung von Diabetesspätfolgen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung des Unterschieds zwischen präprandialen und postprandialen Blutglukosemesswerten umfassend die Schritte
 - i) Auslesen von mit einer relativen oder absoluten Zeitmarke versehenen und als präprandial **gekennzeichneten** Blutglukosemesswerten und von mit einer relativen oder absoluten Zeitmarke versehenen postprandialen Blutglukosemesswerten aus dem Speicher eines Blutglukosemessgeräts,
 - ii) Ermitteln der zeitlichen Reihenfolge der als präprandial markierten Blutglukosemesswerte,
 - iii) Ermitteln der zu den jeweiligen präprandialen Blutglukosemesswerte korrespondierenden postprandialen Blutglukosemesswerte durch Anwenden eines zeitlichen Auswahlkriteriums,
 - iv) Ermitteln der Differenz zwischen korrespondierenden prä- und postprandialen Blutglukosemesswerten, und
 - v) Anzeigen der Differenzwerte.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Blutglukosemesswerte und die Differenz zwischen korrespondierenden prä- und postprandialen Blutglukosemesswerten Zeitrubriken zugeordnet werden, die Mahlzeiten repräsentieren.
3. Verfahren gemäß Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Zuordnung zu den Zeitrubriken anhand der Uhrzeit des präprandialen Blutglukosemesswertes erfolgt.
4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** in Schritt ii) die Sortierung aufsteigend beginnend mit dem ältesten präprandialen Blutglukosemesswert erfolgt.
5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** in Schritt iii) als zeitliches Auswahlkriterium ein Zeitfenster von mindestens 60 Minuten und höchstens 120 Minuten nach dem jeweiligen präprandialen Blutglukosemesswert angewandt wird.
6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** im Falle des Vorliegens mehrerer postprandialer Blutglukosemesswerte, die das zeitliche Auswahlkriterium erfüllen, der jeweils höchste Blutglukosemesswert in Schritt iv) verwendet wird.
7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Schritte ii) und iii) dergestalt ablaufen, dass ausgehend vom ältesten präprandialen Blutglukosemesswert zunächst der höchste korrespondierende postprandiale Blutglukosemesswert ermittelt wird, dieses Blutglukosemesswertepaar zur Weiterverarbeitung gespeichert wird, anschließend der nächstjüngere präprandiale Blutglukosemesswert und der höchste korrespondierende postprandiale Blutglukosemesswert ermittelt wird, dieses Blutglukosemesswertepaar zur Weiterverarbeitung ebenfalls gespeichert wird, und diese Schritte wiederholt werden, bis alle Blutglukosemesswerte bis zum jüngsten präprandialen Blutglukosemesswert und gegebenenfalls dem höchsten korrespondierenden postprandialen Blutglukosemesswert berücksichtigt sind.
8. System zur Ermittlung des Unterschieds zwischen präprandialen und postprandialen Blutglukosemesswerten umfassend eine Datenverarbeitungseinrichtung und ein Computerprogramm zur Ausführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.
9. Computerprogrammprodukt zur Ermittlung des Unterschieds zwischen präprandialen und postprandialen Blutglukosemesswerten enthaltend ein Computerprogramm zur Ausführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.

Fig. 1
Logbook

	Date	07:00 - 08:59	09:00 - 11:44	11:45 - 13:59	14:00 - 16:59	17:00 - 19:29	19:30 - 21:59	22:00 - 23:59	00:00 - 06:59
Wednesday	11.02.2009	-	202 ■	137 □	186 ■	103 □	209 ■	-	-
	11.02.2009	-	99 □	-	-	-	-	-	-
Tuesday	10.02.2009	-	175 ■	119 □	187 ■	144 □	184 ■	-	-
	10.02.2009	-	108 □	-	-	-	-	-	-
Monday	09.02.2009	117 □	198 ■	81 ■	-	-	225 ■	-	-
	09.02.2009	-	-	114 □	-	-	124 □	-	-
Sunday	08.02.2009	117 □	207 ■	124 □	178 ■	117 □	188 ■	-	-
Saturday	07.02.2009	110 □	223 ■	65 □	94 ■	97 □	202 ■	-	-
Friday	06.02.2009	106 □	189 ■	94 □	146 ■	115 □	214 ■	-	-
Thursday	05.02.2009	121 □	205 ■	133 ■	-	101 □	198 ■	-	-
	05.02.2009	-	-	97 □	-	-	-	-	-
Wednesday	04.02.2009	124 □	198 ■	175 ■	-	114 □	225 ■	-	-
	04.02.2009	-	-	92 □	-	-	-	-	-
Tuesday	03.02.2009	-	225 ■	184 □	114 ■	101 □	189 ■	-	-
	03.02.2009	-	115 □	-	-	-	-	-	-
Monday	02.02.2009	118 □	249 ■	80 □	171 ■	99 □	204 ■	-	-
Sunday	01.02.2009	117 □	252 ■	141 □	135 ■	163 □	213 ■	-	-
Saturday	31.01.2009	121 □	227 ■	112 □	106 ■	105 □	274 ■	-	-
Friday	30.01.2009	123 □	232 ■	65 ■	-	96 □	188 ■	-	-
	30.01.2009	-	-	108 □	-	-	-	-	-
Thursday	29.01.2009	-	205 ■	168 ■	-	144 □	231 ■	-	-
	29.01.2009	-	101 □	110 □	-	-	-	-	-
n		10	18	19	9	13	15	0	0
MBG		118	189	117	146	115	208	-	-
SD		8	50	33	36	20	31	-	-
n □		14		14		14		0	
MBG □		114		113		115		-	
SD □		8		28		19		-	
n ■			14		14		14		0
MBG ■			213		140		212		-
SD ■			22		39		23		-
n (■-□)		10		11		11		0	
ΔBG (■-□)		95		22		68		-	

	□	■	ΔBG (■-□)
Evaluated results	84	42	32
Mean BG (MBG)	151 mg/dL	114 mg/dL	188 mg/dL
Standard Deviation (SD)	51 mg/dL	20 mg/dL	45 mg/dL
Maximum	274 mg/dL		
Minimum	65 mg/dL		

■ Above Target H Hypo ■ Weekend ○ Hypo Symptoms
 ■ Below Target □ BG (before meal) ■ BG (after meal)



EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

der nach Regel 63 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

EP 09 00 4527

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 2008/234943 A1 (RAY PINAKI [US] ET AL) 25. September 2008 (2008-09-25) * Absätze [0003] - [0005], [0129] * * Abbildung 15 *	8,9	INV. A61B5/00 G06F19/00
A	US 2007/033074 A1 (NITZAN TAMIR [US] ET AL) 8. Februar 2007 (2007-02-08) * Absätze [0141], [0162], [0166], [0167] * * Abbildung 6 *	8,9	
A	US 2008/071580 A1 (MARCUS ALAN O [US] ET AL) 20. März 2008 (2008-03-20) * Abbildungen 5,6 * * Absätze [0155] - [0184] *	8,9	
A	US 2007/179352 A1 (RANDLOV JETTE [DK] ET AL) 2. August 2007 (2007-08-02) * das ganze Dokument *	8,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			A61B G06F
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPÜ in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind. Vollständig recherchierte Patentansprüche: Unvollständig recherchierte Patentansprüche: Nicht recherchierte Patentansprüche: Grund für die Beschränkung der Recherche: Siehe Ergänzungsblatt C			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		25. Juni 2009	De la Hera, Germán
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

4

EPO FORM 1503 03.82 (P04E09)



**UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE
ERGÄNZUNGSBLATT C**

Nummer der Anmeldung

EP 09 00 4527

Vollständig recherchierte Ansprüche:
8,9

Nicht recherchierte Ansprüche:
1-7

Grund für die Beschränkung der Recherche (nicht patentfähige Erfindung(en)):

Artikel 53 (c) EPÜ - Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 09 00 4527

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

25-06-2009

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2008234943 A1	25-09-2008	CA 2627385 A1	20-09-2008
		CN 101308528 A	19-11-2008
		EP 1988482 A2	05-11-2008
		JP 2009037588 A	19-02-2009
US 2007033074 A1	08-02-2007	CA 2660630 A1	24-04-2008
		WO 2008048452 A2	24-04-2008
US 2008071580 A1	20-03-2008	WO 2009035477 A1	19-03-2009
US 2007179352 A1	02-08-2007	WO 2005093629 A2	06-10-2005
		EP 1735729 A2	27-12-2006
		JP 2007535974 T	13-12-2007

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **Accu-Chek Smart Printer ; J. K. Tshiang Tshiananga ; D. Franke ; M. Luebker ; C. Weber ; K. Neeser.** 43rd EASD (2007) Annual Meeting, 2007 [0009]

专利名称(译)	用于计算餐前和餐后血糖值之间差异的方法和系统		
公开(公告)号	EP2236076A1	公开(公告)日	2010-10-06
申请号	EP2009004527	申请日	2009-03-30
[标]申请(专利权)人(译)	罗氏诊断公司		
申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
当前申请(专利权)人(译)	罗氏糖尿病护理GMBH F.HOFFMANN-LA ROCHE AG		
[标]发明人	BLASBERG PETER KOEHLER MATTHIAS KLOOS ALFRED		
发明人	BLASBERG, PETER KOEHLER, MATTHIAS KLOOS, ALFRED		
IPC分类号	A61B5/00 G06F19/00		
CPC分类号	A61B5/14532 G16H50/20		
其他公开文献	EP2236076B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及用于确定餐前和餐后血糖水平之间差异的方法和系统。

Fig. 1
Logbook

