



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110514828 A

(43)申请公布日 2019.11.29

(21)申请号 201910918350.9

(22)申请日 2019.09.26

(71)申请人 天津华科泰生物技术有限公司

地址 300000 天津市北辰区天津北辰经济
技术开发区医药园京福公路东侧优谷
新科技园

(72)发明人 林斯 张衡 肖燚

(74)专利代理机构 北京汇泽知识产权代理有限
公司 11228

代理人 李岩

(51)Int.Cl.

G01N 33/558(2006.01)

G01N 33/533(2006.01)

G01N 33/543(2006.01)


权利要求书2页 说明书15页 附图4页

(54)发明名称

一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,包括试纸条,包括试纸条,所述试纸条包括检测线及质控线,所述检测线上包被有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,所述质控线上包被有羊抗兔多克隆抗体。本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,其可用于血清、血浆和全血的检测,以用于预测子痫前期相关疾病的诊断。



1. 一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 包括试纸条, 所述试纸条包括检测线及质控线, 其特征在于, 所述检测线上包被有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体, 所述质控线上包被有羊抗兔多克隆抗体。

2. 如权利要求1所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 其特征在于, 所述试纸条还包括PVC板, 所述PVC板上固定有依次连接的样品垫、标记物垫、包被垫及吸水垫, 所述包被垫上依次设有检测线及质控线, 所述样品垫和标记物垫连接为一体。

3. 如权利要求2所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 其特征在于, 所述包被垫靠近检测线的一端连接有标记物垫, 靠近质控线的一端连接有吸水垫。

4. 如权利要求3所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 其特征在于, 所述标记物垫上包被有另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球, 所述另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的摩尔比为1:0.2~4。

5. 如权利要求4所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 其特征在于, 所述快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡还包括用于卡设试纸条的卡壳。

6. 如权利要求5所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡, 其特征在于, 所述卡壳包括:

底槽, 其连接于所述PVC板;

上盖, 其连接于所述底槽, 所述上盖上设置有用于向所述样品垫上加样的加样孔;

观察窗, 其设置于上盖上并用于检测线和质控线的数据采集。

7. 一种权利要求1-6任一项所述的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡的制备方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

1) 包被垫的制备: 将一株鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别包被到硝酸纤维素膜上, 干燥备用;

2) 标记物垫的制备: 将另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合后, 喷涂在玻璃纤维素膜上, 干燥备用;

3) 组装试纸条: 在PVC板上粘接包被垫, 并在靠近该包被垫上的质控线的一端搭接吸水垫, 在靠近该包被垫上的检测线的一端搭接标记物垫及其连接的样品垫; 然后将其切成所需宽度的试纸条, 之后将该试剂条放入卡壳。

8. 如权利要求7所述的制备方法, 其特征在于, 所述表面活化的荧光乳胶微球通过以下步骤制得:

1) 取表面活性剂加入0.1~0.5mol/L, pH值为8~10的硼酸-硼砂缓冲溶液中, 再加入二甲基甲酰胺、N,N'-二环己基碳二亚胺和N-羟基琥珀酰亚胺, 搅拌反应; 所述硼酸-硼砂缓冲溶液包含0.5wt%~3wt%的PEG2000;

2) 取表面带有羧基的荧光乳胶微球的分散液, 以硼酸-硼砂缓冲溶液调pH至8~10后, 加入到步骤1) 所得的产物中, 在25℃下搅拌反应1~5h, 反应完毕后, 离心去除上清液, 得到表面活化的荧光乳胶微球, 用硼酸-硼砂缓冲溶液复溶备用; 所述硼酸-硼砂缓冲溶液包含0.5wt%~3wt%的PEG2000。

9. 如权利要求8所述的制备方法, 其特征在于, 所述表面活性剂包含有N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐, 四者的

重量比为 $(0.5 \sim 6) : (4 \sim 9) : (0.8 \sim 3) : (5 \sim 14)$;所述表面活性剂与所述氨基表面的荧光乳胶微球的重量比为 $(0.5 \sim 120) : 1$ 。

10. 如权利要求8或9所述的制备方法,其特征在于,所述另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球通过以下步骤制得:

取表面活化的荧光乳胶微球加入碳化二亚胺和N-羟基琥珀酰亚胺中室温搅拌2~6h,然后加入另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,室温下搅拌1~4h,再加入10~50mg BSA封闭液,继续搅拌1~4h;在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液;最后,用0.01M~0.5M, pH=7.4的磷酸缓冲溶液将固体沉淀物复溶,再加入Proclin300在4℃下保存待用;

其中,所述表面活化的荧光乳胶微球与另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体的质量比例为1:(0.01~4)。

一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于体外诊断领域,涉及一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡及其制备方法。

背景技术

[0002] PLGF(胎盘生长因子)是血管内皮生长因子(VEGF)家族中的一员,其分子结构为糖蛋白同型二聚体分子。它是一种基因定位于14q24q31的糖蛋白,由1条69kD的 α 链和34kD的 β 链通过二硫键连接形成二聚体。其碱基序列与VEGF有高度同源性。通过mRNA的选择性拼接,PLGF可产生4种不同亚型:PLGF-1,PLGF-2,PLGF-3和PLGF-4。

[0003] PLGF的生物学功能是通过特异结合其受体VEGFR-1来激活的。VEGFR-1具有很强的生物学活性,结合其配体后可介导内皮细胞与基质细胞的作用,也影响内皮细胞的分化成熟。PLGF能促进早孕时滋养细胞增殖与分化,可诱导内皮细胞增殖、迁移,抗内皮细胞凋亡,并能增加血管的通透性,能增强低浓度的VEGF的生物学活性,是参与多种肿瘤血管生成的重要的促血管生成因子。

[0004] PLGF是一种高度特异性的标志物,胎盘合体滋养层细胞有供氧压力时PLGF水平显著降低,检测孕妇血液PLGF水平可用来评估胎盘功能不全,以及对由此引起的子痫前期进行预测、鉴别和治疗监测。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡及其制备方法。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

[0007] 一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,包括试纸条,所述试纸条包括检测线及质控线,所述检测线上包被有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,所述质控线上包被有羊抗兔多克隆抗体。

[0008] 在本发明的一个具体方案中,其中所述试纸条还包括PVC板,所述PVC板上固定有依次连接的样品垫、标记物垫、包被垫及吸水垫,所述包被垫上依次设有检测线及质控线,所述样品垫和标记物垫连接为一体。

[0009] 在本发明的一个具体方案中,其中所述包被垫靠近检测线的一端连接有标记物垫,靠近质控线的一端连接有吸水垫。

[0010] 在本发明的一个具体方案中,其中所述标记物垫上包被有另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球,所述另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的摩尔比为1:(0.2~4)。

[0011] 在本发明的一个具体方案中,其中所述快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检

测卡还包括用于卡设试纸条的卡壳。

[0012] 在本发明的一个具体方案中,其中所述卡壳包括:

[0013] 底槽,其连接于所述PVC板;

[0014] 上盖,其连接于所述底槽,所述上盖上设置有用向所述样品垫上加样的加样孔;

[0015] 观察窗,其设置于上盖上并用于检测线和质控线的数据采集。

[0016] 一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡的制备方法,包括以下步骤:

[0017] 1) 包被垫的制备:将一株鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别包被到硝酸纤维素膜上,干燥备用;

[0018] 2) 标记物垫的制备:将另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合后,喷涂在玻璃纤维素膜上,干燥备用;

[0019] 3) 组装试纸条:在PVC板上粘接包被垫,并在靠近该包被垫上的质控线的一端搭接吸水垫,在靠近该包被垫上的检测线的一端搭接标记物垫及其连接的样品垫;然后将其切成所需宽度的试纸条,之后将该试剂条放入卡壳。

[0020] 在本发明的一个具体方案中,其中所述表面活化的荧光乳胶微球通过以下步骤制得:

[0021] 1) 取表面活性剂加入pH值为8~10的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)中,再加入二甲基甲酰胺、N,N'-二环己基碳二亚胺和N-羟基琥珀酰亚胺,搅拌反应;

[0022] 2) 取表面带有羧基的荧光乳胶微球的分散液,以硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)调pH至8~10后,加入到步骤1)所得的产物中,在25℃下搅拌反应1~5h,反应完毕后,离心去除上清液,得到表面活化的荧光乳胶微球,用硼酸-硼砂缓冲溶液复溶备用。

[0023] 在本发明的一个具体方案中,其中所述表面活性剂包含有N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐,四者的重量比为(0.5~6):(4~9):(0.8~3):(5~14);所述表面活性剂与所述氨基表面的荧光乳胶微球的重量比为(0.5~120):1。

[0024] 在本发明的一个具体方案中,其中所述另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球通过以下步骤制得:

[0025] 取表面活化的荧光乳胶微球加入碳化二亚胺(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)中室温搅拌2~6h,然后加入另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,室温下搅拌1~4h,再加入10~50mg BSA封闭液,继续搅拌1~4h;在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液;最后,用0.01M~0.5M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶,再加入Proclin300在4℃下保存待用。

[0026] 在本发明的一个具体方案中,其中所述表面活化的荧光乳胶微球与鼠另一株抗人PLGF单克隆抗体的质量比例为1:(0.01~4)。

[0027] 本发明的有益效果:

[0028] 1、本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,其可用于血清、血浆、全血的检测,以用于预测子痫前期相关疾病的诊断;

[0029] 2、本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,其样本用量

小,检测在5~20min之内即可完成,线性检测范围为10pg/mL~5000pg/mL,极大地提高了检测效率。

[0030] 3、本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,其灵敏度高、稳定性强、线性范围宽,具有优异的准确性和精密度。

[0031] 4、本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,在样本采集后,无需长时间等待,即可进行样本检测,操作简单,样本处理时间短,降低了时间成本,适用于临床快速诊断检测。

[0032] 5、本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡,其通过采用表面活化的荧光乳胶微球,克服了市面上荧光染料灵敏度差和湿式荧光微球稳定性差的缺陷,能够保证颗粒间的相对距离不易团聚,无需缓冲液,加入待测样本后能即刻复溶并顺利层析。

附图说明

[0033] 图1为本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析试纸条示意图;

[0034] 图2A为本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡中一种上盖的内部结构示意图;

[0035] 图2B为本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡中一种底槽的内部结构示意图;

[0036] 图3为本发明实施例1中孕妇胎盘生长因子的校准曲线;

[0037] 图4为本发明实施例2中孕妇胎盘生长因子的校准曲线;

[0038] 图5为本发明实施例3中孕妇胎盘生长因子的校准曲线;

[0039] 图6为本发明实施例4中孕妇胎盘生长因子的校准曲线;

[0040] 其中,1-PVC板,2-包被垫,3-标记物垫,4-吸水垫,5-检测线,6-质控线,7-标记物结合处,8-样本,9-样品垫,11-上盖,12-底槽,13-加样孔,14-观察窗,15-试纸条放置区域,16-定位柱,17-定位孔,18-第一限定部,19-第二限定部,20-第三限定部。

具体实施方式

[0041] 为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。

[0042] 以下材料或试剂若非特别说明,均为购买。

[0043] 实施例1:

[0044] 1. PLGF免疫层析检测卡的制备

[0045] 1) 表面活化的荧光乳胶微球的制备:

[0046] N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐,四者的重量比为0.5:4:0.8:5。

[0047] ①取表面活性剂(包含0.5mg的N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、4mg的聚乙二醇单月硅酸酯、0.8mg的十二烷基苯磺酸盐和5mg的月桂酰谷氨酸盐)加入0.2mol/L, pH=8.4的碱性硼酸盐缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)中,再加入1mL二甲基甲酰胺、

1mg的N,N'-二环己基碳二亚胺和0.5mgN-羟基琥珀酰亚胺,在120r/min的搅拌速度下进行反应;

[0048] ②取1mL,含1wt%表面带有羧基的荧光乳胶微球分散液(购自上海甄准生物技术有限公司),用10mL,0.2mol/L,pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)稀释分散均匀后,加入到步骤①所得的产物中,在25℃,120r/min的搅拌速度下搅拌反应5h,反应完毕后,按照12000r/min的转速离心去除上清液,得到表面活化的荧光乳胶微球,用0.2mol/L,pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液复溶至1mL备用。

[0049] 2) 另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0050] 取0.5mL步骤1)中制备的表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mgN-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌3h,然后加入200μL另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌2h,再加入20mg BSA封闭液,继续搅拌2h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.2M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0051] 3) 兔IgG多克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0052] 取0.5mL步骤1)中制备的表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mgN-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌3h,然后加入200μL mg羊兔IgG多克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌2h,再加入20mg BSA封闭液,继续搅拌2h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.2M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0053] 4) 包被垫的制备

[0054] 将一株鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别用0.2M的磷酸盐缓冲液(pH=7.4)稀释成1mg/mL,用划膜喷金仪在硝酸纤维素膜(NC膜)上进行划膜。含有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体的作为检测线(T线)5,含有羊抗兔多克隆抗体的作为质控线(C线)6,然后在37℃,湿度<30%的环境下干燥4h制成包被垫。

[0055] 5) 标记物垫的制备

[0056] ①将玻璃纤维素膜在0.2M的磷酸盐缓冲液(pH=7.4)浸泡46h,然后在35℃下干燥6h,备用。

[0057] ②将摩尔比为1:1的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合均匀后,按照5μL/cm的速度喷涂在玻璃纤维素膜上,然后放置在37℃下干燥2h制成标记物垫3。标记物垫上包被有另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的地方叫做标记物结合处7。

[0058] 设置标记物结合处7的目的在于:将待测血液样本8滴加到样品垫9上,在吸水垫4的作用下,血液样本向前层析,在标记物结合处7的血液样本中的PLGF与标记物结合处包被的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球反应,反应后的物质、未参加反应的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的荧光乳胶微球、兔IgG标记的荧光乳胶微球随着血液样本继续层析,在检测线处参加反应的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球与检测线包被的一株鼠抗人PLGF单克隆抗体反应而停留在检测线,在质控线处兔IgG标记的荧光乳胶微球与质控线包被的羊抗兔多克隆抗体反应而停留在质

控线,其他物质继续层析,最后通过荧光免疫层析仪分别采集检测线的荧光微球的信号(记作T)和质控线的荧光微球的信号(记作C),计算T/C值,从PLGF的标准曲线中读取血液样本中PLGF的浓度。

[0059] 6) 免疫层析检测卡的组装

[0060] 首先在PVC板1上粘接包被垫2,然后在靠近包被垫2上的质控线6的一端搭接吸水垫,在靠近包被垫2的检测线5的一端搭接标记物垫3及其连接的样品垫9,用切条机切成 $4\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ 的试纸条(见图1),将试纸条放入卡壳中制备成孕妇胎盘生长因子免疫层析检测卡。

[0061] 所述卡壳选自现有技术,例如,所述卡壳(如图2A、图2B所示)可以包括:底槽12,其连接于所述PVC板1;上盖11,其连接于所述底槽12,所述上盖11上设置有用向所述样品垫9上加样的加样孔13;观察窗14,其设置于上盖11上,用于检测线5和质控线6的数据采集。

[0062] 如图2B所示,所述底槽12包括:位于其内表面的对称分布的多个定位孔17,多个所述定位孔17之间设有多个用于限定试纸条横向移动的第一限定部18以及用于限定试纸条纵向移动的第二限定部19;对称设置的所述第一限定部18与所述第二限定部19围设成纸条放置区域15(虚线区域),用于放置试纸条;

[0063] 如图2A所示,所述上盖11包括:与多个所述定位孔17相配合的多个定位柱16,这样配合使用以将上盖11和底槽12固定在一起;所述上盖11还包括用于限定试纸条的上下移动的第三限定部20。

[0064] 所述包被垫2的上方设有用于数据采集的观察窗14,以露出全部所述检测线5和质控线6,用于收集其检测结果;且所述观察窗14开设于所述上盖11上与试纸条放置区域15的中部相对应的位置。所述上盖11在与所述样品垫9相对应的位置处开设有加样孔,以用于样品垫9上滴加样本8。所述检测线距离加样孔15-25mm。

[0065] 2. 检测

[0066] 取60 μL 的待测样本滴加到步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡的加样孔13(对应试纸条的样品垫9)中待测样本,室温静置15min,然后将PLGF免疫层析检测卡插入到荧光免疫分析仪进行检测,即时可获得检测结果。

[0067] 3. 试纸条的评价

[0068] 1) 配置不同浓度的PLGF校准品(0、10、40、200、1000、5000pg/mL),用本实施例1步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡按照步骤2的检测过程依次进行测定,空白检测线不高于10pg/mL,检测范围为10~5000pg/mL。检测结果如表1所示,以样本浓度为横坐标,检测线与质控线的比值(T/C)为纵坐标,用logistic(四参数)进行曲线拟合,拟合度 R^2 分别为0.9995, $n=6$,制备的PLGF校准曲线如图3所示,T/C值与校准品在浓度为10-5000pg/mL的范围内具有良好的相关性。

[0069] 表1检测数据

[0070]

标准浓度pg/mL	0	10	40	200	1000	5000
T/C值	0.1744	0.6534	0.9755	1.3546	1.8535	2.2356

[0071] 2) 定量限

[0072] 定量限(limit of quantitation,LoQ),参照CLSI发布的EP17-A2文件。

[0073] 依据临床要求和室间质量评价的允许误差,设定本试剂PLGF的总误差目标为30%。在不考虑分析偏差的情况下,允许总误差(TEa)=2CV,即 $CV=1/2TEa$ 。PLGF浓度在10.00pg/mL时检测的CV为12.97%,小于15%,符合质量目标要求,因此 $LoQ=10.00pg/mL$,表明PLGF荧光微球免疫层析检测卡的具有较高的灵敏度。

[0074] 3) 精密度

[0075] 抽取三个批次的PLGF检测试纸条,分别检测浓度为40、200、1000pg/mL的样本进行检测,每个浓度点平行测定10次,计算三个批号检测试纸条的批内变异系数和批间变异系数,从表2中可以看出批间和批内变异系数均小于13.53%,说明PLGF荧光免疫层析检测卡的精密度较高。

[0076] 表2检测数据

[0077]

批次	样本浓度 (pg/mL)	平均值	标准差	变异系数%
1	40	40.82	1.76	8.45
	200	199.28	57.63	11.64
	1000	1017.53	175.53	8.49
2	40	39.14	2.59	13.53
	200	203.79	64.75	12.85

[0078]

	1000	1036.79	116.54	5.72
3	40	40.98	1.04	4.96
	200	203.25	65.44	12.75
	1000	1041.03	156.96	7.69
三批批次	40	40.31	1.65	8.12
	200	204.11	65.75	13.04
	1000	1028.45	102.64	5.01

[0079] 4) 回收率

[0080] 取三批次浓度为5000pg/mL的PLGF校准品,分别加入到浓度接近于0的阴性样本中,其中所加入的PLGF校准品与阴性样本的体积比为1:9,重复测定3次,计算回收率。三批样本校准品回收率的结果分别为97.45%、100.99%、97.39%,回收率均在90%-110%之间,说明测定结果符合标准。

[0081] 5) 比对实验

[0082] 收集20位临床样本,采用本实施例制备的PLGF免疫层析检测卡与罗氏的PLGF检测试剂盒进行比对实验,实验结果见表3。

[0083] 表3检测数据

[0084]

试剂盒	本发明实施例 1 制备的 PLGF 免疫层析检测卡 (pg/mL)			罗氏试剂 盒(pg/mL)
	检测 1	检测 2	检测 3	
样本 1	10.45	10.97	10.65	6.35
样本 2	14.56	14.12	14.35	12.75
样本 3	26.48	27.39	26.39	25.61
样本 4	27.35	26.49	23.47	24.59
样本 5	26.46	26.98	24.96	25.36
样本 6	35.96	36.03	34.16	33.62
样本 7	46.82	48.93	47.01	45.29
样本 8	19.35	18.67	17.65	16.35
样本 9	27.86	26.78	25.14	24.63
样本 10	87.64	86.98	85.96	94.85
样本 11	56.94	54.23	54.71	55.69
样本 12	49.28	50.23	48.47	47.16
样本 13	37.76	36.78	38.95	40.13
样本 14	137.93	138.96	136.21	234.56
样本 15	234.21	236.97	234.59	333.16
样本 16	634.38	630.26	630.24	629.65
样本 17	931.43	930.46	958.95	1027.46
样本 18	1331.46	1306.49	1357.83	1229.35
样本 19	2269.34	2290.46	2203.41	2574.86
样本 20	4662.46	4568.99	4740.28	4461.49

[0085] 从表3的检测结果中可以看出,本发明实施例1制备的PLGF免疫层析检测卡复检测三次,检测1分别与检测2、检测3的结果进行相关性分析,回归方程分别为: $y=0.98479x-3.06498$, $R^2=0.9998$; $y=1.0101x-3.1388$, $R^2=0.9996$;表明实施例1制备的PLGF免疫层析检测卡的稳定性良好。将实施例1制备的PLGF免疫层析检测卡与罗氏PLGF蛋白检测试剂盒的结果进行相关性分析,回归方程为: $y=0.9834x+22.577$, $R^2=0.9923$, $n=20$,表明本发明实施例1制备的PLGF免疫层析检测卡与罗氏PLGF检测试剂盒的检测结果显著相关。因此本发明的PLGF免疫层析检测卡可以满足辅助临床诊断的需求。

[0086] 实施例2

[0087] 1. PLGF免疫层析检测卡的制备

[0088] 1) 表面活化的荧光乳胶微球的制备:

[0089] N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐,四者的重量比为5:7:2:8。

[0090] ①取表面活性剂(包含5mg的N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、7mg的聚乙二醇单月硅酸酯、2mg的十二烷基苯磺酸盐和8mg的月桂酰谷氨酸盐)加入0.2mol/L, pH=8.8的碱性硼酸盐缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)中,再加入1mL二甲基甲酰胺、1mg的N,N'-二环己基碳二亚胺和0.5mgN-羟基琥珀酰亚胺,在120r/min的搅拌速度下进行反应;

[0091] ②取1mL,含1wt%,表面带有羧基的荧光乳胶微球分散液(购自上海甄准生物技术

有限公司),用10mL,0.2mol/L,pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)稀释分散均匀后,加入到步骤①所得的产物中,在25℃,120r/min的搅拌速度下反应5h,反应完毕后,按照12000r/min的转速离心30min去除上清液,得到表面活化的荧光乳胶微球,用0.2mol/L,pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液复溶至1mL备用。

[0092] 2) 另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0093] 取0.5mL步骤1)中制备的表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mg N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌4h,然后加入500μL另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌4h,再加入50mg BSA封闭液,继续搅拌4h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.1M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0094] 3) 兔IgG多克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0095] 取0.5mL表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mg N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速搅拌4h,然后加入500μL mg羊兔IgG多克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌4h,再加入50mg BSA封闭液,继续搅拌4h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.2M的磷酸盐缓冲液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0096] 4) 包被垫的制备

[0097] 将一株鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别用0.2M的磷酸盐缓冲溶液(pH=7.4)稀释成1mg/mL,用划膜喷金仪在硝酸纤维素膜(NC膜)上进行划膜。含有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体的作为检测线(T线)5,含有羊抗兔多克隆抗体的作为质控线(C线)6,然后在37℃,湿度<30%的环境下干燥4h制成包被垫。

[0098] ,5) 标记物垫的制备

[0099] ①将玻璃纤维素膜在0.2M的磷酸盐缓冲液(pH=7.4)中浸泡4h,然后在35℃下干燥6h,备用。

[0100] ②将摩尔比为1:0.5的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合均匀后,按照20μL/cm的速度喷涂在玻璃纤维素膜上,然后放置在37℃下干燥1h制成标记物垫。标记物垫上包被有鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的地方叫做标记物结合处7。

[0101] 6) 免疫层析检测卡的组装

[0102] 首先在PVC板1上粘接包被垫2,然后在靠近包被垫2上的质控线6的一端搭接吸水垫,在靠近包被垫2的检测线5的一端搭接标记物垫3及其连接的样品垫9,用切条机切成4mm±0.1mm的试纸条(见图1),将试纸条放入卡壳中制备成孕妇胎盘生长因子免疫层析检测卡。所述卡壳的结构同实施例1。

[0103] 2. 检测

[0104] 取60μL的待测样本滴加到步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡的加样孔(对应试纸条的样品垫9)中待测样本,室温静置15min,然后将PLGF免疫层析检测卡插入到荧光免疫分析仪进行检测,即时可获得检测结果。

[0105] 3. 试纸条的评价

[0106] 1) 配置不同浓度的PLGF校准品(0、10、40、200、1000、5000pg/mL),用本实施例2步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡按照步骤2的检测过程依次进行测定,空白检测线不高于10pg/mL,检测范围为10~5000pg/mL。检测结果如表4所示,以样本浓度为横坐标,检测线与质控线的比值(T/C)为纵坐标,,用logistic(四参数)进行曲线拟合,拟合度 R^2 分别为0.9984, $n=6$,制备的PLGF校准曲线如图4所示,T/C值与校准品在浓度为10-5000pg/mL的范围内具有良好的相关性。

[0107] 表4检测数据

[0108]

标准浓度pg/mL	0	10	40	200	1000	5000
T/C值	0.1676	0.6355	0.9356	1.5566	1.9453	2.2654

[0109] 2) 定量限

[0110] 定量限(limit of quantitation,LoQ),参照CLSI发布的EP17-A2文件。

[0111] 依据临床要求和室间质量评价的允许误差,设定本试剂PLGF的总误差目标为30%。在不考虑分析偏差的情况下,允许总误差(TEa)=2CV,即 $CV=1/2TEa$ 。PLGF浓度在10.00pg/mL时检测的CV为12.80%,小于15%,符合质量目标要求,因此LoQ=10.00pg/mL,表明PLGF荧光微球免疫层析检测卡的具有较高的灵敏度。

[0112] 3) 精密度

[0113] 抽取三个批次的PLGF检测试纸条,分别检测浓度为40、200、1000 pg/mL的样本进行检测,每个浓度点平行测定10次,计算三个批号检测试纸条的批内变异系数和批间变异系数,从表5中可以看出批间和批内变异系数均小于14.89%,说明PLGF荧光免疫层析检测卡的精密度较高。

[0114] 表5检测数据

[0115]

批次	样本浓度 (pg/mL)	平均值	标准差	变异系数 %
1	40	40.82	1.86	8.93
	200	198.28	35.63	7.19
	1000	1037.53	187.53	9.07
2	40	39.14	2.76	14.42
	200	203.79	35.75	7.10
	1000	1026.79	175.54	8.62
3	40	40.98	2.04	9.72
	200	203.25	76.44	14.89
	1000	1041.03	197.96	9.70
三批批次	40	40.31	2.65	13.05
	200	204.11	66.75	13.24
	1000	1028.45	172.64	8.43

[0116] 4) 回收率

[0117] 取三批次浓度为5000pg/mL的PLGF校准品,分别加入到浓度接近于0的阴性样本

中,其中所加入的PLGF校准品与阴性样本的体积比为1:9,重复测定3次,计算回收率。三批样本校准品回收率的结果分别为93.654%、103.96%、95.33%,回收率均在90%~110%之间,说明测定结果符合标准。

[0118] 实施例3

[0119] 1. PLGF免疫层析检测卡的制备

[0120] 1) 表面活化的荧光乳胶微球的制备:

[0121] N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐,四者的重量比为3.5:7:2:10。

[0122] ①取表面活性剂(包含3.5mg的N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、7mg的聚乙二醇单月硅酸酯、2mg的十二烷基苯磺酸盐和10mg的月桂酰谷氨酸盐)加入0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)中,再加入1mL二甲基甲酰胺、1mg的N,N'-二环己基碳二亚胺和0.5mgN-羟基琥珀酰亚胺,在120r/min的搅拌速度下进行反应;

[0123] ②取1mL,含1wt%表面带有羧基的荧光乳胶微球分散液(购自上海甄准生物技术有限公司),用10mL,0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)稀释分散均匀后,加入到步骤①所得的产物中,在25℃,120r/min的搅拌速度下反应5h,反应完毕后,按照12000r/min的转速离心30min去除上清液,得到表面活化的荧光乳胶微球,用0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液复溶至1mL备用。

[0124] 2) 另一株鼠抗人sFlt-1单克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0125] 取0.5mL步骤1)制备的表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mg N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌2h,然后加入300μL另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌2h,再加入30mg BSA封闭液,继续搅拌2h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.2M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0126] 3) 兔IgG多克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0127] 取0.5mL表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mg N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌2h,然后加入300μL mg羊兔IgG多克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌2h,再加入30mg BSA封闭液,继续搅拌3h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.2M的磷酸缓冲溶液(pH=7.4)将固体沉淀物复溶至1mL,再加入1μL的Proclin300在4℃下保存待用。

[0128] 4) 包被垫的制备

[0129] 将鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别用0.01mol/L的磷酸盐缓冲溶液(pH=7.4)稀释成1mg/mL,用划膜喷金仪在硝酸纤维素膜(NC膜)上进行划膜。含有鼠抗人PLGF单克隆抗体的作为检测线(T线)5,含有羊抗兔多克隆抗体的作为质控线(C线)6,然后在37℃,湿度<30%的环境下干燥4h制成包被垫。

[0130] 5) 标记物垫的制备

[0131] ①将玻璃纤维素膜在0.2M的磷酸盐缓冲液(pH=7.4)中浸泡6h,然后在35℃下干燥8h,备用。

[0132] ②将摩尔比为1:2的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微

球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合均匀后,按照15 μ L/cm的速度喷涂在玻璃纤维素膜上,然后放置在37℃下干燥4h制成标记物垫。标记物垫上包被有鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的地方叫做标记物结合处7。设置标记物结合处7的目的同实施例1。

[0133] 6) 免疫层析检测卡的组装

[0134] 首先在PVC板1上粘接包被垫2,然后在靠近包被垫2上的质控线6的一端搭接吸水垫,在靠近包被垫2的检测线5的一端搭接标记物垫3及其连接的样品垫9,用切条机切成4mm $\pm$ 0.1mm的试纸条(见图1),将试纸条放入卡壳中制备成孕妇胎盘生长因子免疫层析检测卡。所述卡壳的结构同实施例1。

[0135] 2. 检测

[0136] 取60 μ L的待测样本滴加到步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡的加样孔(对应试纸条的样品垫9)中待测样本,室温静置15min,然后将PLGF免疫层析检测卡插入到荧光免疫分析仪进行检测,即时可获得检测结果。

[0137] 3. 试纸条的评价

[0138] 1) 配置不同浓度的PLGF校准品(0、10、40、200、1000、5000pg/mL),用本实施例3步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡按照步骤2的检测过程依次进行测定,空白检测线不高于10pg/mL,检测范围为10~5000pg/mL。检测结果如表6所示,以样本浓度为横坐标,检测线与质控线的比值(T/C)为纵坐标,用logistic(四参数)进行曲线拟合,拟合度 R^2 分别为0.9979, $n=6$,制备的PLGF校准曲线如图5所示,T/C值与校准品在浓度为10-5000pg/mL的范围内具有良好的相关性。

[0139] 表6检测数据

[0140]

标准浓度pg/mL	0	10	40	200	1000	5000
T/C值	0.1568	0.6553	0.9535	1.6536	2.1054	2.3547

[0141] 2) 定量限

[0142] 定量限(limit of quantitation,LoQ),参照CLSI发布的EP17-A2文件。

[0143] 依据临床要求和室间质量评价的允许误差,设定本试剂PLGF的总误差目标为30%。在不考虑分析偏差的情况下,允许总误差(TEa)=2CV,即 $CV=1/2TEa$ 。PLGF浓度在10.00pg/mL时检测的CV为13.87%,小于15%,符合质量目标要求,因此LoQ=10.00pg/mL,表明PLGF荧光微球免疫层析检测卡的具有较高的灵敏度。

[0144] 3) 精密度

[0145] 抽取三个批次的PLGF检测试纸条,分别检测浓度为40、200、1000pg/mL的样本进行检测,每个浓度点平行测定10次,计算三个批号检测试纸条的批内变异系数和批间变异系数,从表7中可以看出批间和批内变异系数均小于14.84%,说明PLGF荧光免疫层析检测卡的精密度较高。

[0146] 表7检测数据

[0147]

批次	样本浓度 (pg/mL)	平均值	标准差	变异系数%
1	40	40.82	1.53	7.35
	200	198.28	73.45	14.83
	1000	1037.53	176.53	8.54
2	40	39.14	1.76	9.20
	200	203.79	72.45	14.38
	1000	1036.79	178.54	8.77
3	40	40.98	2.12	10.10
	200	203.25	54.99	10.71
	1000	1041.03	201.96	9.90
三批批次	40	40.31	1.65	8.12
	200	204.11	65.75	13.04
	1000	1028.45	168.75	8.24

[0148] 4) 回收率

[0149] 取三批次浓度为5000pg/mL的PLGF校准品,分别加入到浓度接近于0的阴性样本中,其中所加入的PLGF校准品与阴性样本的体积比为1:9,重复测定3次,计算回收率。三批样本校准品回收率的结果分别为95.86%、103.22%、95.77%,回收率均在90%~110%之间,说明测定结果符合标准。

[0150] 实施例4

[0151] 1. PLGF免疫层析检测卡的制备

[0152] 1) 表面活化的荧光乳胶微球的制备:

[0153] N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、聚乙二醇单月硅酸酯、十二烷基苯磺酸盐和月桂酰谷氨酸盐,四者的重量比为6:9:3:14。

[0154] ①取表面活性剂(包含6mg的N,N'-双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠、9mg的聚乙二醇单月硅酸酯、3mg的十二烷基苯磺酸盐和14mg的月桂酰谷氨酸盐)加入0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)中,再加入1mL二甲基甲酰胺、1mg的N,N'-二环己基碳二亚胺和0.5mgN-羟基琥珀酰亚胺,在120r/min的搅拌速度下进行反应;

[0155] ②取1mL,含1wt%表面带有羧基的荧光乳胶微球分散液(购自上海甄准生物技术有限公司),用10mL,0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液(包含0.5wt%~3wt%的PEG2000)稀释分散均匀后,加入到步骤①所得的产物中,在25℃下搅拌反应3h,反应完毕后,按照12000r/min的转速离心去除上清液,得到表面活化的荧光乳胶微球,用0.2mol/L, pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲溶液复溶至1mL备用。

[0156] 2) 另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0157] 取0.5mL步骤1)中制备的表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺(EDC),1mg N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),于室温,120r/min的转速下搅拌3h,然后加入100μL另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体,于室温,120r/min的转速下搅拌1h,再加入10mg BSA封闭液,继续搅拌1h。在2~8℃下,按照11000r/min的转速离心30min,除去上清液。最后,用0.01M的磷酸缓冲溶

液 (pH=7.4) 将固体沉淀物复溶至1mL, 再加入1 μ L的Proclin300在4℃下保存待用。

[0158] 3) 兔IgG多克隆抗体标记表面活化的荧光乳胶微球

[0159] 取0.5mL表面活化的荧光乳胶微球加入1mg碳化二亚胺 (EDC), 1mg N-羟基琥珀酰亚胺 (NHS), 于室温, 120r/min的转速下搅拌3h, 然后加入100 μ L mg羊兔IgG多克隆抗体, 于室温, 120r/min的转速下搅拌1h, 再加入10mg BSA封闭液, 继续搅拌1h。在2~8℃下, 按照11000r/min的转速离心30min, 除去上清液。最后, 用0.2M的磷酸盐缓冲液 (pH=7.4) 将固体沉淀物复溶至1mL, 再加入1 μ L的Proclin300在4℃下保存待用。

[0160] 4) 包被垫的制备

[0161] 将鼠抗人PLGF单克隆抗体和羊抗兔多克隆抗体分别用0.01mol/L的磷酸盐缓冲溶液 (pH=7.4) 稀释成1mg/mL, 用划膜喷金仪在硝酸纤维素膜 (NC膜) 上进行划膜。含有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体的作为检测线 (T线) 5, 含有羊抗兔多克隆抗体的作为质控线 (C线) 6, 然后在37℃, 湿度<30%的环境下干燥4h制成包被垫。

[0162] 5) 标记物垫的制备

[0163] ①将玻璃纤维素膜在0.2M的磷酸盐缓冲液 (pH=7.4) 中浸泡6h, 然后在35℃下干燥8h, 备用。

[0164] ②将摩尔比为1:1的另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球混合均匀后, 按照10 μ L/cm的速度喷涂在玻璃纤维素膜上, 然后放置在45℃下干燥2h制成标记物垫。标记物垫上包被有另一株鼠抗人PLGF单克隆抗体标记的表面活化的荧光乳胶微球和兔IgG标记的表面活化的荧光乳胶微球的地方叫做叫做标记物结合处7。设置标记物结合处7的目的同实施例1。

[0165] 6) 免疫层析检测卡的组装

[0166] 先在PVC板1上粘接包被垫2, 然后在靠近包被垫2上的质控线6的一端搭接吸水垫, 在靠近包被垫2的检测线5的一端搭接标记物垫3及其连接的样品垫9, 用切条机切成4mm $\pm$ 0.1mm的试纸条 (见图1), 将试纸条放入卡壳中制备成孕妇胎盘生长因子免疫层析检测卡。所述卡壳的结构同实施例1。

[0167] 2. 检测

[0168] 取60 μ L的待测样本滴加到步骤1制备的PLGF免疫层析检测卡的加样孔 (对应试纸条的样品垫9) 中待测样本, 室温静置15min, 然后将PLGF免疫层析检测卡插入到荧光免疫分析仪进行检测, 即时可获得检测结果。

[0169] 3. 试纸条的评价

[0170] 1) 配置不同浓度的PLGF校准品 (0、10、40、200、1000、5000pg/mL), 用本实施例4步骤1制备的免疫层析检测卡按照步骤2的检测过程进行测定, 空白检测线不高于10pg/mL, 检测范围为10~5000pg/mL。检测结果如表8所示, 以样本浓度为横坐标, 检测线与质控线的比值 (T/C) 为纵坐标, 用logistic (四参数) 进行曲线拟合, 拟合度R²分别为0.9986, n=6, 制备的PLGF校准曲线如图6所示, T/C值与校准品在浓度为10~5000pg/mL的范围内具有良好的相关性。

[0171] 表8检测数据

[0172]

标准浓度pg/mL	0	10	40	200	1000	5000
-----------	---	----	----	-----	------	------

T/C值	0.1645	0.5789	0.8956	1.5745	2.0764	2.2654
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

[0173] 2) 定量限

[0174] 定量限(limit of quantitation,LoQ),参照CLSI发布的EP17-A2文件。

[0175] 依据临床要求和室内质量评价的允许误差,设定本试剂PLGF的总误差目标为30%。在不考虑分析偏差的情况下,允许总误差(TEa)=2CV,即 $CV=1/2TEa$ 。PLGF浓度在10.00pg/mL时检测的CV为14.86%,小于15%,符合质量目标要求,因此LoQ=10.00pg/mL,表明PLGF荧光微球免疫层析检测卡的具有较高的灵敏度。

[0176] 3) 精密度

[0177] 抽取三个批次的PLGF检测试纸条,分别检测浓度为40、200、1000pg/mL的样本进行检测,每个浓度点平行测定10次,计算三个批号检测试纸条的批内变异系数和批间变异系数,从表9中可以看出批间和批内变异系数均小于14.67%,说明PLGF荧光免疫层析检测卡的精密度较高。

[0178] 表9检测数据

[0179]

批次	样本浓度 (pg/mL)	平均值	标准差	变异系数%
1	40	40.82	2.08	9.99
	200	205.28	58.67	11.85
	1	1027.53	201.57	9.75
2	40	39.14	1.97	10.29
	200	203.79	65.86	13.07
	1000	1036.79	124.75	6.12
3	40	40.98	1.08	5.15
	200	203.25	64.97	12.66
	1000	1041.03	207.75	10.18
三批批次	40	40.31	2.98	14.67
	200	204.11	73.86	14.65
	1000	1018.45	186.87	9.12

[0180] 4) 回收率

[0181] 取三批次浓度为5000pg/mL的PLGF校准品,分别加入到浓度接近于0的阴性样本中,其中所加入的PLGF校准品与阴性样本的体积比为1:9,重复测定3次,计算回收率。三批样本校准品回收率的结果分别为97.97%、105.98%、98.92%,回收率均在90%-110%之间,说明测定结果符合标准。

[0182] 附:所需溶液配置

[0183] (1) 0.2M磷酸盐缓冲溶液

[0184] $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$ 5.24g;

[0185] $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ 28.83g;

[0186] 纯化水定容至1000mL;

[0187] (2) 硼酸-硼砂缓冲溶液

[0188] 硼砂 19.07g;

[0189] 硼酸 12.37g;

[0190] PEG2000 5~30g;

[0191] 纯化水定容至1000mL。

[0192] 以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。




图1




图2A




图2B

四参数Logistic曲线拟合

方程: $y = (A - D) / [1 + (x/C)^B] + D$

A = 2.89456
B = -0.42776
C = 342.30159
D = 0.17369
r^2 = 0.99947

X	Y-反应值	Y-平均值 CV(%)	Y-计算值	Y-残差
0.0000	0.1744		0.1737	-0.0007
10.0000	0.6534		0.6655	0.0121
40.0000	0.9755		0.9500	-0.0255
200.0000	1.3546		1.3784	0.0238
1000.0000	1.8535		1.8407	-0.0128
5000.0000	2.2356		2.2387	0.0031

数据个数 6
残差平方和 0.00154




图3

四参数Logistic曲线拟合

$$\text{方程: } y = (A - D) / [1 + (x/C)^B] + D$$

A = 2.48108
 B = -0.58869
 C = 114.77101
 D = 0.17003
 r² = 0.99839

X	Y-反应值	Y-平均值	CV(%)	Y-计算值	Y-残差
0.0000	0.1676			0.1700	0.0024
10.0000	0.6355			0.6139	-0.0216
40.0000	0.9356			0.9781	0.0425
200.0000	1.5566			1.5128	-0.0438
1000.0000	1.9453			1.9761	0.0308
5000.0000	2.2654			2.2550	-0.0104

数据个数 6

残差平方和 0.00526




图4

四参数Logistic曲线拟合

$$\text{方程: } y = (A - D) / [1 + (x/C)^B] + D$$

A = 2.53080
 B = -0.65031
 C = 97.29026
 D = 0.16797
 r² = 0.99794

X	Y-反应值	Y-平均值	CV(%)	Y-计算值	Y-残差
0.0000	0.1568			0.1680	0.0112
10.0000	0.6553			0.6063	-0.0490
40.0000	0.9535			1.0172	0.0637
200.0000	1.6536			1.6212	-0.0324
1000.0000	2.1054			2.1051	-0.0003
5000.0000	2.3547			2.3615	0.0068

数据个数 6

残差平方和 0.00767




图5

四参数Logistic曲线拟合

方程: $y = (A - D) / [1 + (x/C)^B] + D$

A = 2.40675

B = -0.72229

C = 99.43733

D = 0.17841

r² = 0.99863

X	Y-反应值	Y-平均值CV(%)	Y-计算值	Y-残差
0.0000	0.1645		0.1784	0.0139
10.0000	0.5789		0.5347	-0.0442
40.0000	0.8956		0.9388	0.0432
700.0000	1.5745		1.5679	-0.0066
1000.0000	2.0764		2.0529	-0.0235
5000.0000	2.2654		2.2825	0.0171

数据个数 6

残差平方和 0.00490




图6

专利名称(译)	一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡及其制备方法		
公开(公告)号	CN110514828A	公开(公告)日	2019-11-29
申请号	CN201910918350.9	申请日	2019-09-26
[标]发明人	林斯 张衡 肖燧		
发明人	林斯 张衡 肖燧		
IPC分类号	G01N33/558 G01N33/533 G01N33/543		
CPC分类号	G01N33/533 G01N33/54313 G01N33/558		
代理人(译)	李岩		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明涉及一种快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡，包括试纸条，包括试纸条，所述试纸条包括检测线及质控线，所述检测线上包被有一株鼠抗人PLGF单克隆抗体，所述质控线上包被有羊抗兔多克隆抗体。本发明所提供的快速检测孕妇胎盘生长因子的免疫层析检测卡，其可用于血清、血浆和全血的检测，以用于预测子痫前期相关疾病的诊断。

