

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4102835号
(P4102835)

(45) 発行日 平成20年6月18日(2008.6.18)

(24) 登録日 平成20年3月28日(2008.3.28)

(51) Int.Cl.	F I
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 O 1 D
GO 1 N 21/78 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 1 1 P
GO 1 N 33/545 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 7 5
GO 1 N 33/53 (2006.01)	GO 1 N 21/78 C
GO 1 N 33/547 (2006.01)	GO 1 N 33/545 A
請求項の数 60 (全 28 頁) 最終頁に続く	

(21) 出願番号 特願2006-73617(P2006-73617)
 (22) 出願日 平成18年3月17日(2006.3.17)
 (62) 分割の表示 特願平8-531161の分割
 原出願日 平成8年4月10日(1996.4.10)
 (65) 公開番号 特開2006-234824(P2006-234824A)
 (43) 公開日 平成18年9月7日(2006.9.7)
 審査請求日 平成18年3月22日(2006.3.22)
 (31) 優先権主張番号 08/420,726
 (32) 優先日 平成7年4月10日(1995.4.10)
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(73) 特許権者 506092123
 キュビキオッティ, ロジャー, エス
 アメリカ合衆国、07042 ニュージャ
 ー州、モントクレア、ミッドランド・ア
 ベニュー 258
 (74) 代理人 100102978
 弁理士 清水 初志
 (72) 発明者 キュビキオッティ, ロジャー, エス
 アメリカ合衆国、07042 ニュージャ
 ー州、モントクレア、ミッドランド・ア
 ベニュー 258

審査官 宮澤 浩

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フィコビリソーム、誘導体およびその使用

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

フィコビリソームヘテロ抱合体を含む組成物であって、該ヘテロ抱合体は互いに共有結合した2つの化学種を含有し、第1の該化学種はフィコビリソームであり、第2の該化学種は、リガンド、レセプタ、信号発生分子、部位特異的分子、および製造された固体サポートからなる群より選択される、組成物。

【請求項2】

フィコビリソームが固体サポートに固定化されている、請求項1記載の組成物。

【請求項3】

固定化したフィコビリソームが安定化しており、安定化されたフィコビリソームが以下の性質を有する、請求項2記載の組成物。

吸光係数： $> 4AU_{545}/mg$

蛍光信号(666nm)： $> 10^4 cps(1ng/ml$ 当り；545nmで励起)

蛍光比： $666/573nm$ 放射比 $> 3.0(545nm$ で励起)

【請求項4】

固定化したフィコビリソームが、規定された方向で固体サポートに固定化されている、請求項2記載の組成物。

【請求項5】

固定化したフィコビリソームが少なくとも1つのロッドを含む、請求項2記載の組成物。

【請求項6】

10

20

固定化したフィコビリソームが、共有結合を介して所望の化学成分により修飾されている、請求項2記載の組成物。

【請求項7】

化学成分が、固定化したフィコビリソームの特定のタンパク質に結合している、請求項6記載の組成物。

【請求項8】

固定化したフィコビリソームが、リガンド、レセプタ、および信号発生分子からなる群より選択される分子種に結合している、請求項2記載の組成物。

【請求項9】

分子種が、フィコビリソームを構成するタンパク質の1つの型に結合している、請求項8記載の組成物。

10

【請求項10】

分子種が、フィコビリソームを構成するタンパク質の1つの型に、多価リガンドまたは多価レセプタを介して結合している、請求項9記載の組成物。

【請求項11】

分子種が、固定化したフィコビリソームに共有結合している、請求項8記載の組成物。

【請求項12】

フィコビリソームが、末端アクセプタの波長において主要な放出ピークを保持している、請求項2記載の組成物。

【請求項13】

20

フィコビリソームヘテロ抱合体が固体サポートに固定化されている、請求項1記載の組成物。

【請求項14】

フィコビリソームヘテロ抱合体が安定化しており、安定化されたフィコビリソームが以下の性質を有する、請求項1記載の組成物。

吸光係数： $> 4AU_{545}/mg$

蛍光信号（666nm）： $> 10^4 cps (1ng/ml \text{ 当り} ; 545nm \text{ で励起})$

蛍光比： $666/573nm \text{ 放射比} > 3.0 (545nm \text{ で励起})$

【請求項15】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、規定された方向で固体サポートに固定化されている、請求項1記載の組成物。

30

【請求項16】

フィコビリソームヘテロ抱合体が少なくとも1つのロッドを含む、請求項1記載の組成物。

【請求項17】

第2の化学種がフィコビリソームに共有結合している、請求項1記載の組成物。

【請求項18】

第2の化学種が特定のフィコビリソームタンパク質に結合している、請求項17記載の組成物。

【請求項19】

40

第2の化学種が、フィコビリソームを構成するタンパク質の1つの型に結合している、請求項18記載の組成物。

【請求項20】

第2の化学種が、フィコビリソームを構成するタンパク質の1つの型に、多価リガンドまたは多価レセプタを介して結合している、請求項19記載の組成物。

【請求項21】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、フィコビリソームヘテロ抱合体に特異的に結合する多特異性リガンドまたは多特異性レセプタに非共有結合により結合している、請求項1記載の組成物。

【請求項22】

50

フィコビリソームヘテロ抱合体が、単離されたフィコビリタンパク質、単離されたリンカータンパク質、またはその混合を含む混合物から再構成されている、請求項1記載の組成物。

【請求項23】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、信号発生系に対するエネルギードナーまたはアクセプタである、請求項1記載の組成物。

【請求項24】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、突然変異種、ハイブリッド、およびフィコビリソーム構成要素を発現可能な遺伝子組換え種からなる群より選択される藻類より得られる少なくとも1つのタンパク質を含む、請求項1記載の組成物。

10

【請求項25】

分析物を含むサンプルを特異結合相手に接触させ、特異結合相手に特異的に結合する能力によってサンプル中に存在する分析物の量を測定する特異結合アッセイを実施するための方法であって、アッセイ成分が、検出可能なようにラベル付けされており、該アッセイ成分は、特異結合相手、特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子、および分析物と同じ結合特異性を有する試薬分子からなる群より選択され、検出可能なラベルは、請求項1記載のフィコビリソームヘテロ抱合体を含む信号発生系であることを特徴とする、方法。

【請求項26】

フィコビリソームヘテロ抱合体が特異結合相手に結合している、請求項25記載の方法。

20

【請求項27】

フィコビリソーム抱合体が、アッセイ成分に特異的に結合するリガンドまたはレセプタに結合している、請求項25記載の方法。

【請求項28】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、非共有結合的手段でアッセイ成分に結合している、請求項25記載の方法。

【請求項29】

フィコビリソームヘテロ抱合体が、共有結合によりアッセイ成分に結合している、請求項25記載の方法。

【請求項30】

アッセイが、結合済みの特異結合相手を、未結合の特異結合相手から分離せずに、特異結合相手に対する分析物の結合を測定する均質アッセイである、請求項25記載の方法。

30

【請求項31】

信号発生系が2つまたはそれ以上のフィコビリソームヘテロ抱合体を含む、請求項25記載の方法。

【請求項32】

フィコビリソームヘテロ抱合体がエネルギードナーまたはアクセプタである、蛍光エネルギー移動をさらに含む請求項25記載の方法。

【請求項33】

使用目的で、フィコビリソームヘテロ抱合体を凍結または脱水により調製する、請求項25記載の方法。

40

【請求項34】

分析物を含むサンプルを特異結合相手に接触させる段階と、特異結合相手に特異的に結合する能力によってサンプル中に存在する分析物の量を測定する段階とを含む、特異結合アッセイを実施するための方法であって、検出可能なように、フィコビリソームのヘテロ抱合体を含む信号発生系によってアッセイ成分がラベル付けされており、該フィコビリソームはフィコビリタンパク質とリンカータンパク質とが自ら組み合わさってできており、そのフィコビリソームの各々は少なくとも1つのロッドを含み、該アッセイ成分は、特異結合相手、分析物と同じ結合特異性を有する試薬分子、および特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子からなる群より選択される、方法。

50

【請求項35】

特異結合相手、分析物と同一の化学的性質を有する試薬分子、および特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子からなる群より選択されるアッセイ成分が固相に結合している、請求項34記載の方法。

【請求項36】

固相が、合成膜、ポリマー、ポリマー性ビーズ、ポリマー性母材、微粒子、およびガラスからなる群より選択される、請求項34記載の方法。

【請求項37】

分析物が、核酸、薬剤、リガンド、抗原、ハプテン、抗体、および炭水化物からなる群より選択される、請求項34記載の方法。

10

【請求項38】

信号発生系が2つまたはそれ以上のフィコビリソームを含む、請求項34記載の方法。

【請求項39】

フィコビリソームが安定化している、請求項34記載の方法。

【請求項40】

以下の段階を含む、請求項1記載のフィコビリソームヘテロ抱合体の組成物を調製する方法：

- a. フィコビリソームがフィコビリソーム内の架橋により安定化する、フィコビリソームを架橋する段階、および
- b. 安定な可溶性のフィコビリソームヘテロ抱合体を単離する段階。

20

【請求項41】

フィコビリソームヘテロ抱合体が共有結合架橋領域により安定化している、請求項40記載の方法。

【請求項42】

架橋が消光により停止される、請求項41記載の方法。

【請求項43】

フィコビリソームヘテロ抱合体が二官能性多部位結合架橋試薬により安定化している、請求項41記載の方法。

【請求項44】

フィコビリソームヘテロ抱合体がグルタルアルデヒドとの架橋により安定化している、請求項41記載の方法。

30

【請求項45】

フィコビリソームヘテロ抱合体がホルムアルデヒドとの架橋により安定化している、請求項41記載の方法。

【請求項46】

分析物を含むサンプルを特異結合相手に接触させ、特異結合相手に特異的に結合する能力によってサンプル中に存在する分析物の量を測定する特異結合アッセイを実施するための方法であって、アッセイ成分が、検出可能なようにラベル付けされており、該アッセイ成分は、特異結合相手、特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子、および分析物と同じ結合特異性を有する試薬分子からなる群より選択され、検出可能なラベルが、フィコビリソームを含む信号発生系であることを特徴とする、方法。

40

【請求項47】

フィコビリソームが特異結合相手に結合している、請求項46記載の方法。

【請求項48】

フィコビリソームが、アッセイ成分に特異的に結合するリガンドまたはレセプタに結合している、請求項46記載の方法。

【請求項49】

フィコビリソームが、非共有結合的手段でアッセイ成分に結合している、請求項46記載の方法。

【請求項50】

50

フィコビリソームが、共有結合によりアッセイ成分に結合している、請求項46記載の方法。

【請求項51】

アッセイが、結合済みの特異結合相手を、未結合の特異結合相手から分離せずに、特異結合相手に対する分析物の結合を測定する均質アッセイである、請求項46記載の方法。

【請求項52】

信号発生系が2つまたはそれ以上のフィコビリソームを含む、請求項46記載の方法。

【請求項53】

フィコビリソームがエネルギードナーまたはアクセプタである、蛍光エネルギー移動をさらに含む請求項46記載の方法。

【請求項54】

使用目的で、フィコビリソームを凍結または脱水により調製する、請求項46記載の方法。

【請求項55】

分析物を含むサンプルを特異結合相手に接触させる段階と、特異結合相手に特異的に結合する能力によってサンプル中に存在する分析物の量を測定する段階とを含む、特異結合アッセイを実施するための方法であって、検出可能なように、フィコビリソームを含む信号発生系によってアッセイ成分がラベル付けされており、該フィコビリソームはフィコビリタンパク質とリンカータンパク質とが自ら組み合わさってできており、そのフィコビリソームの各々は少なくとも1つのロッドを含み、該アッセイ成分は、特異結合相手、分析物と同一の化学的性質を有する試薬分子、および特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子からなる群より選択される、方法。

【請求項56】

特異結合相手、分析物と同一の化学的性質を有する試薬分子、および特異結合相手に特異的に結合するために分析物と競合する試薬分子からなる群より選択されるアッセイ成分が固相に結合している、請求項55記載の方法。

【請求項57】

固相が、合成膜、ポリマー、ポリマー性ビーズ、ポリマー性母材、微粒子、およびガラスからなる群より選択される、請求項55記載の方法。

【請求項58】

分析物が、核酸、薬剤、リガンド、抗原、ハプテン、抗体、および炭水化物からなる群より選択される、請求項55記載の方法。

【請求項59】

信号発生系が2つまたはそれ以上のフィコビリソームを含む、請求項55記載の方法。

【請求項60】

フィコビリソームが安定化している、請求項55記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

発明の背景

フィコビリソームは、青緑藻類や紅藻類において主たる発色アンテナとして機能する、フィコビリタンパク質と無色のポリペプチドの錯体である（非特許文献1）。これら錯体の機能の健全性についての主な基準は、これらが、例えばPorphyridium cruentum フィコビリソームにおいて、フィコビリタンパク質成分の間で、フィコエリスリン（PE）からフィコシアニン（PC）、そして最終的にはアロフィコシアニン（APC）への高度に効率的なエネルギー伝達を示すことである。無色のポリペプチドは、適切な安定とエネルギー伝達のため、フィコビリソームの中でフィコビリタンパク質の組立と位置設定に關与する。

【0002】

フィコビリソームは、種々の有機体から得たものでも、共通の性質を多数有する：（1

10

20

30

40

50

) 「錯体分子量」即ち、多数の分子から成るフィコビリソーム錯体 1 モルの重量が非常に大きい ($5 \times 10^6 \sim 2010^6$)、; (2) 電磁波の可視領域において多数の極大吸収を示す; (3) モル吸光係数が高い ($\epsilon > 10^7 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$); (4) フィコビリタンパク質の間、通常 1 またはそれ以上の感知性の種から蛍光を発する最終的なアクセプタへの指向性を持った振動エネルギー伝達の効率が高い ($> 90\%$); (5) 単離したフィコビリタンパク質に対するストークシフトが大きい; (6) フィコビリタンパク質の量子収率が高い; (7) 水性緩衝液への溶解度が高い; および (8) アロフィコシアニンを含有する核構造である。

【0003】

単離したフィコビリソームは、ほぼ最適な条件下で、容易に遊離フィコビリタンパク質および種々のフィコビリタンパク質錯体に解離する。温和なイオン強度が低く ($< 0.5 \text{ M}$ リン酸塩)、フィコビリソーム濃度が低く ($< 1 \text{ mg/ml}$)、そして温度が低いと、フィコビリソームが解離する (非特許文献 2 ; 非特許文献 3)。また、藻類を凍結しても、フィコビリソームを崩壊させることが報告されている (非特許文献 4)。

10

【0004】

形態学的には、フィコビリソームは、「ロッド(rods)」と呼ばれる順序よく積み上げられたスタック(stacks)に配置されるオリゴフィコビリタンパク質ディスクの錯体複合体である。一般に、数本のアーム状ロッドが、同じくロッドから形成される核となる部分から放射状に外に延び出る。異なる有機体から採取されたフィコビリソームは、これを構成するフィコビリタンパク質とロッドの数と型が種々異なり、形態学的にもまた科学量論的にも多様である。一般に、周辺部のロッドは、フィコエリスロシアニン、フィコエリスリン、および/またはフィコシアニンから構成され、核の部分はアロフィコシアニンとこれに連なるリンクタンパク質から構成される。

20

【0005】

単離されたフィコビリタンパク質は、フィコビリソームの蛍光タンパク質成分であるが、イムノアッセイにおける指標(ラベル)として用いられてきた(例えば特許文献 1 参照)。しかし、無傷のフィコビリソームを単離して処理することが困難であるため、従来はこれらの巨大分子複合体が同様に利用できるとは考えていなかった。フィコビリソームが与えることのできる信号は、理論的には、単離されたフィコビリタンパク質より大きいため、業界では、アッセイのホストや他の用途のために検出可能なマーカとして利用できるよう、フィコビリソームの処理方法を求める声がある。

30

【0006】

【特許文献 1】米国特許第 4,520,110 号 (Stryer 外) および Kronick 外 (1983 年) 「Clinical Chemistry」第 29 巻, 第 1582 ~ 1586 頁

【非特許文献 1】Gantt (1975 年) 「Phycobilisomes: light harvesting pigment complex」BioScience, 第 25 巻, 第 781 ~ 788 頁

【非特許文献 2】Kato, (1988 年) 「Methods in Enzymology」, 第 162 巻, 第 313 ~ 318 頁

【非特許文献 3】Gantt 外, (1979 年) 「Plant Physiology」, 第 63 巻, 第 615 ~ 620 頁

40

【非特許文献 4】Gantt 外, (1972 年) 「Journal of Cell Biology」, 第 54 巻, 第 313 ~ 324 頁

【発明の開示】

【0007】

発明の概要

本発明の目的は、特異結合アッセイ用ラベルとして有用な可溶性フィコビリソームを提供することである。

【0008】

本発明のもう一つの目的は、リガンド、レセプタその他の有用な分子に共有結合したフィコビリソームを含むフィコビリソーム抱合体を提供することである。

50

【0009】

本発明はさらに、特異結合アッセイで使用するのに適した不動性フィコビリソームを提供することも目的とする。

【0010】

また、本発明は、フィコビリソームを検出可能なラベルとして用いてアッセイを行う方法も提供することを目的とする。

【0011】

本発明のこれら及び他の目的は、以下に記載する一またはそれ以上の態様によって具体化される。本発明の一態様によれば、単離された可溶性の安定化された均質なフィコビリソームが提供される。このフィコビリソームは、 $1 \times g$ の加速度下では、24時間以内には沈降しない。さらに、遠心分離によって5分間 $1000 \times g$ の加速度にしても、55%を超える量が上澄み液に残る。

10

【0012】

本発明のもう一つの態様によれば、特異的な分子種に共有結合したフィコビリソームが提供される。この分子種は、リガンド、レセプタおよび信号生成分子からなる群より選ばれる。

【0013】

本発明のさらに他の態様によれば、多特異的な多価リガンドまたはレセプタに非共有結合した単離フィコビリソームが提供される。

【0014】

本発明のさらに他の態様によれば、固体サポート上で不動化された官能基が損なわれていない単離フィコビリソームが提供される。

20

【0015】

本発明のさらに他の態様によれば、分析物が特異的な結合相手（リガンドまたはレセプタ）に特異的に結合する能力によって測定される特異結合アッセイを行う方法が提供される。この分析においては、フィコビリソームは、分析物の類似体あるいはその分析物の特異的な結合相手をラベルするために用いられる。

【0016】

本発明によるこれらおよび他の態様は、分析物のアッセイにおいて、非常に感度のよい、非等方性の検出手段を与える。しかし、酵素的なラベルと違って、フィコビリソームは、副基質、色素原、補因子、あるいは計時的な培養なしに、定量的に検出することができる。

30

【0017】

好ましい態様の詳細な説明

フィコビリソームが、種々のアッセイやフォーマットで無傷のまま使用できるよう、安定化、抱合化、そして修飾できるというのは、本発明者の発見である。フィコビリソームは、構成要素たるフィコビリタンパク質の高い量子収率に加えて、とりわけその大きな分子量、吸光係数およびエネルギー移動効率のため、高感度なラベルとなる。フィコビリソーム内での方向性のあるエネルギー伝達は、一またはそれ以上の検知性のある種から末端のアクセプタにかけて起こる。検知性のある種は、第2の（「アクセプタ」あるいは「エミッタ」）発蛍光団を励起させる放出ピークを有する第1の発蛍光団である。このようなエネルギー伝達は、均質な特異結合アッセイと不動性のフィコビリソームを含むトランスデュースに適用することができる。

40

【0018】

本発明によれば、均質な単離・可溶性・安定化フィコビリソームを製造する方法も提供される。フィコビリソームの均質性は、 $1 \times g$ の加速度下においては、24時間の培養中に沈降がないという事実によって示される。溶解度は、遠心分離によって評価することができる。「可溶性のフィコビリソームとは、5分間 $1000 \times g$ の遠心分離下で、55%を超えるフィコビリソームが上澄み液に残留するものをいう。そして、そのような遠心分離の後でも65%、75%、85%、さらには90%のフィコビリソームが上澄み液に残

50

留することが望ましいが、本発明の方法によれば、このような残留率も可能である。フィコビリソームは、典型的には、ホルムアルデヒドやごく低濃度のグルタルアルデヒドで温和な架橋処理を施すことによって安定化される。他の中間的な、短い、あるいはほとんど長さがゼロの架橋剤も使用することができる。安定化したフィコビリソームは、天然のフィコビリソームとは対照的に、希釈したイオン強度 ($< 0.5 \text{ M}$) およびタンパク質濃度 ($< 1 \text{ mg/ml}$) の下でも安定である。さらに、グリセロール、スクロースおよびポリエチレングリコールの存在下でも安定である。機能的に損なわれていないフィコビリソームは、末端アクセプタの波長において主たる放出 (発色) ピークを有する。

【0019】

フィコビリソームには、シスチン、リジン、グルタミン酸、グルコーサミンなどを含むがこれらに限定されるものではない適当な物質と安定化反応を抑えることによって、特異的な化学基も付加することができる。このような化学基は、レセプタ、リガンドあるいは信号生成分子などの分子種をさらにフィコビリソームに結合する際に有用である。付加された官能基は、フィコビリソームを安定化された単離可能な複合体として用いるため、フィコビリソームを二量体化または重合するのにも用いることができる。

【0020】

結合した分子種は、必ずしも必要ではないが、付加された化学基を介してフィコビリソームに抱合させることもできる。あるいはまた、安定化反応の際に、直接ホルムアルデヒドやグルタルアルデヒドなどと結合させることもできる。その他、結合した分子種は、特定の分子種とフィコビリソームの間の空間的あるいは立体化学的關係を変更するため、異なるスペーサーを介して結合させることもできる。リガンドには、作用薬、拮抗薬、ハプテン、抗原、薬剤、ホルモントランスミッタ、補因子、ビタミン、毒素、オリゴヌクレオチドおよび、これらの分子を第二の分子に結合させて形成される抱合体が含まれるが、これらに限定されるものではない。レセプタには、抗体、抗体断片、抗体擬体、分子認識単位、付着分子、可溶性レセプタ、核酸、膜レセプタ、細胞レセプタ、および薬剤レセプタが含まれるが、これらに限定されるものではない。信号生成分子は、フィコビリタンパク質、染料分子、コロイド、発蛍光団、酵素、燐光化合物、酸化・還元化合物、および他のフィコビリソームが含まれるが、これらに限定されるものではない。

【0021】

特定分子種のフィコビリソームは、本発明の光収集特性を実現するため、部位特異的、すなわちフィコビリソームの特定の部分へ結合する。これは、なかんずく、フィコビリソームのタンパク質成分の一つに特異的な抗体のような多価レセプタを介して行われる。多価レセプタは、リガンドとの結合部位を二ないし三個有する。本発明で用いる多価レセプタは、多特異的、すなわち二ないし三個のリガンドに対する結合部位を有する。このため、この多特異的なレセプタは、フィコビリソームをもう一つの分子種に結合させるのに用いることができる。フィコビリソームはまた、タンパク質抱合化の当業者には周知のいろいろな方法で、レセプタまたはリガンドに共有結合させることができる (Tijssen¹, Wong², Pierce³ その他これらに記載された文献参照)。

¹Tijssen, P. (1985年), 「Practice and Theory of Enzyme Immunoassays」; R.H. Burdon and P.H. van Knippenberg 編, Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular biology, 第15巻, Elsevier, New York. ²Wong, S.S. (1991年), 「Chemistry of Protein Conjugation and Crosslinking」, CRC Press, Boca Raton.

³Pierce Catalog & Handbook (1994年), Cross-linking/Protein Modification, 第155 ~ 200頁.

【0022】

フィコビリソームはまた、微量滴定皿、微粒子、ポリマー性ビーズ、ポリマー性母材、合成膜、リボソームなどの固体サポートに固定 (不動化) することもできる。このような不動化は、脂腺膜における特定のレセプタを介して生理学的に生じるフィコビリソームの脂腺膜への固定は含まない。フィコビリソームはまず藻類の細胞から単離され、ついで固体サポートに結合するか、またはこの結合の前に、修飾、抱合化または安定化する。結合

10

20

30

40

50

は、共有結合でも非共有結合でもよいし、また特異的でも非特異的でもよい。結合の方法は、フィコビリソームを固体表面に対して好ましい方向に向けられるように最適なものにする。フィコビリソームタンパク質のただ一つある型は、リンク材としてのタンパク質にせよフィコビリタンパク質にせよ、固体サポートへの結合成分として用いることができる。いくつかの適用例においては、フィコビリソームは、グリッドや他のパターンのような整然とした配列に結合させるのが望ましい。

【 0 0 2 3 】

本発明に係るフィコビリソームは、特異結合アッセイに用いるのに特に適している。この特異結合アッセイには、免疫アッセイ、免疫組織化学、血球計算、細胞の仕分け、リガンドまたはレセプタ結合アッセイ、タンパク質 - 蛋白質結合アッセイ、タンパク質核酸結合アッセイ、そして核酸 - 核酸結合アッセイなどがある。フィコビリソームは、典型的には、アッセイにおいて、特異結合の相手の一つをラベル付けするのに用いられる。例えば、フィコビリソームは、アッセイにかける分析物に特異的に結合するリガンドまたはレセプタをラベル付けするのに用いられる。その他、フィコビリソームは、その特異的な結合相手をめぐって分析物と競合するリガンドまたはレセプタである試薬分子をラベル付けするのにも用いられる。ラベル付けは、フィコビリソームが分析物に特異的に結合するかまたは競合する第1のリガンドまたはレセプタに結合する直接型でもよいし、またフィコビリソームが第1のリガンドまたはレセプタに特異的に結合するかまたは競合する第2のリガンドまたはレセプタに結合する間接型でもよい。フィコビリソームの特異的な結合相手への結合は、共有結合でもよいし非共有結合でもよい。フィコビリソームはまた、他の発蛍光団がフィコビリソームからの方向性エネルギーの伝達と同時に光を発する信号生成系の一部となる。フィコビリソームは、特異的な結合相手に結合する前に安定化することもできるし、これに直接抱合させることもできる。この他、フィコビリソームの調製手段には、凍結、凍結乾燥、および他の脱水方法がある。フィコビリソームの凍結は、0.1 ~ 1 Mのスクロースを存在させて行うのが望ましい。砂糖、塩、ポリマーおよび補助溶媒など他の安定化剤も使用することができる。特に有用な安定化剤は、トレハロース、ソルビトールおよびデキストランである。

【 0 0 2 4 】

特異結合アッセイに使用する場合は、フィコビリソームは、リガンド、レセプタ、および/または信号生成分子に、一段階、二段階あるいは多段階方法で抱合させる。一段階グルタルアルデヒド法は、精製工程に介入することなく、フィコビリソームをシーケンス的に安定化かつ抱合させるのに、効果的かつ簡便であることが分った。

【 0 0 2 5 】

業界で知られているアッセイフォーマットは、均質アッセイ、非均質アッセイ、競合アッセイおよびサンドイッチアッセイを含めて、どのようなものでも使用することができる。均質アッセイにおいては、二つの結合相手同士（例えばリガンドとレセプタ）の結合は、ラベルの作用に影響を及ぼし、結合済みの試薬と未結合の試薬の分離は必要でない。他方、非均質アッセイにおいては、生じた結合の量を測定するため、結合済みの試薬と遊離した試薬の分離が必要となる。そのようなアッセイの制限は、測光手段、蛍光分析手段、あるいは光電子手段によって達成できる。その他、定量的結果は、目視検査によって得られる。天然のフィコビリソームは、普通の抱合・アッセイ条件下では自発的に解離するため、通常のアッセイフォーマットの場合は、使用前に安定化させなければならない。

【 0 0 2 6 】

非均質特異結合アッセイにおいては、反応混合物は、液状の媒体を、特異的な結合相手に結合したフィコビリソームを含むラベル付けした抱合体に接触させることによって得られる。そのラベル付けした抱合体の結合相と遊離相が形成される。二つの相におけるラベル付けした抱合体の相対的な比率は、液状媒体中のリガンドの有無およびその存在量の関数である。ついで、結合相と遊離相は分離される。液状媒体中のリガンドは、結合相または遊離相中のフィコビリソームを検出ないし測定することによって定量される。

【 0 0 2 7 】

10

20

30

40

50

均質特異結合アッセイの方法はまた、容易に実行することができる。好ましい方法においては、フィコピリソームでラベル付けしたリガンドまたはレセプタを、第2の発蛍光団でラベル付けした特異的結合の相手と組み合わせて使用する。フィコピリソーム内でのエネルギー伝達は指向性があることから、フィコピリソームは、そのような蛍光エネルギー伝達アッセイにおいて、効率的なフォトンドナーあるいはアクセプタとして使用することができる。

【0028】

フィコピリソームを使ったアッセイは、蛍光測定法だけでなく、電気化学的に検出することもできるため、電流計を使ったイムノセンサにおいて広く用いられている酵素電極に替わるフィコピリソーム電極の有効性をも示唆する。さらに、フィコピリソームは微小電子装置（例えばフォトダイオード、電荷結合素子）に指向性のある均質な結合をさせることができるため、ミクロンより小さいオーダーで効率的な光電子信号変換の手段ともなる。本発明においては、不動化された構造的に配向性をもつフィコピリソームからの指向性をもった光エネルギー伝達に应答する光電子コンバータ、トランジスタ、スイッチおよび増幅器のような「微小化された「バイオトランスデューサ」を企図している。

【0029】

本発明に係る可溶性の安定化フィコピリソームは、特異結合をする相手への抱合化が不要な多数の用途をもつ。例えば、このフィコピリソームは、希釈や灌流の研究において感応性のあるトレーサとして使用したり、分析の際分子サイズのマーカとして使用できる。好ましい態様においては、これらは、危険性のあるこぼれ液を検出するのに用いる。フィコピリソームは、この最終濃度を約10ppmより小さくするため、使用前に危険性のある物質と混合することができる。次いで、フィコピリソームは、危険な物質が事故でこぼれたり、その適当な位置から除かれたときには検出される。検出可能なフィコピリソームが存在した場合は、液がこぼれたことを示す。

【0030】

本発明によれば、フィコピリソームは、フィコピリタンパク質と少なくとも一本のロッドを含むリンカー(linker)タンパク質が自ら組み合わさってできる複合体である。本発明のフィコピリソームは、原核生物の青緑色細菌門(青緑藻類)または真核生物の紅藻類から得られる。藻類は、野生種、突然変異種、ハイブリッド(雑種)、あるいはフィコピリソーム構成要素を発現可能な遺伝子組替え種のいずれでもよい。また、藻類は、自然(野生)の環境から採取してもよいし、人工的に制御した条件下で成長させてもよい。このような人工的な条件は、天然の環境を模したものでもよいし、例えばフィコピリソームの組成を替えて色彩を所望のものに誘導するよう設計したものでもよい。人工的な条件は、独立栄養体、混合栄養体、従属栄養体のいずれかによる成長をさせるものでなければならない。

【0031】

フィコピリソームは、細胞が崩壊する前にその場で(in situ)、または細胞崩壊後の細胞に拘束された形態で安定化された後、これを生成する有機体から単離される。さらにまた、フィコピリソームは、生体外(in vitro)安定化、抱合化または不動化の前に、無傷の状態でも単離することもできる。他のモードにおいては、フィコピリタンパク質とリンカータンパク質は、フィコピリソームを生成するため生体外で単離・再構成される。

【0032】

本発明で採用する安定化の方法としては、非共有結合によるものだけでなく、共有結合によるものも含まれる。共有結合による方法には、少なくとも二つのフィコピリソームタンパク質に跨がるポリマーの架橋および多点での結合が含まれる。架橋剤は、長さがゼロ(間に立つスペーサ原子なしに二つのフィコピリソーム基が直接結合する場合を含む)であるか、または種々の長さのスペーサアームを含む。非共有結合による安定化は、塩や砂糖などの補助溶媒や、ある種のポリマーや多価レセプタなどとの親和性に基づく相互作用、または凍結もしくは脱水のような物理状態の変化を利用して行う。

【0033】

フィコピリソームの他の分子種への抱合を行うには、業界で知られた抱合化法が用いられる。直接的な結合でもよいし、スペーサーアームや担体分子のような副次的な物質を介させてもよい。

【0034】

フィコピリソームの固体サポートへの固定（不動化）は、共有結合または非共有結合を利用して行う。非共有結合による方法には、受動吸収、親和性に基づく方法、カプセル化、補足および制御した付着などがある。不動化を行うと、構造が規則正しい生成物が得られる。フィコピリソームは、特別な方法によって、固体サポートに対して一定方向に配向される（例えば「コアアップ(core up)」あるいは「コアダウン(core down)」）。その他、固体サポート上でのフィコピリソーム間の間隔は、例えば二次元のアレーまたはグリッドを形成すべく区画ないしパターン化される。

10

【0035】

本発明による特異結合アッセイは、定量的なものでも定性的なものでもよい。また分析物は小分子（特異結合がただ一個のものを含む）でも大分子（1個を超える結合部位を有するものを含む）でもよい。結合アッセイの結果を測定するための検出手段は、目視、光測定、蛍光測定あるいは電気化学的手段などがある。

【0036】

フィコピリソームの単離

フィコピリソームを広範な単細胞藻類から単離する際の一般的な手法は、例えば Gantt 外(1979年), 「Plant Physiology」, 第63巻: 第615-620 頁に記載されている。フィコピリソームは、Gantt および Lipschultz(1972年), 「Journal of Cell Biology」, 第54巻: 第313-324頁に記載された方法に変更を加えたものによって、紅藻類（例えば *Porphyridium cruentum*）および青緑藻類（例えば *Anabaena variabilis*, *Spirulina plantensis*）から単離される。バイオマスは、湿潤重量で 24 g までは、最終的なスクロース勾配超遠心分離工程において、SW 27 ロータを 6 本の 35 ml 遠心分離管を使って手軽に扱うことができる。フィコピリソームの回収率は、最初のバイオマスの 0.1 ~ 1.0 % のオーダーである。

20

【0037】

紅藻類および青緑藻類からの勾配超遠心分離を使ったフィコピリソームの単離

培養仕立てないし凍結仕立て（-20 ないし -70 ）の藻類を、40 ~ 500 リットルの攪拌タンク中で独立栄養方式で培養し、連続的に蛍光を照射して遠心分離により収穫する。*Porphyridium cruentum* (*P. cruentum*) は、塩化ナトリウム、Tadros Metals、即席海洋および *Dunaliella* ビタミンを含む人工的な海水媒体（pH 8.0）中で 20 ~ 22 で成長させることができる。また *Anabaena variabilis* は、塩化ナトリウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、塩化カルシウム、クエン酸、クエン酸アンモニウム第二鉄、A5 Metals (pH 7.8) を含む二重強度の BG-11 媒体中で 25 で成長させることができる。

30

【0038】

本明細書では特に断らない限り、調製に係る全工程は室温（20 ~ 23 ）下で、0.05 % のアジ化ナトリウムを含む 0.75 M リン酸カリウム（pH 7.0-7.2; KPi 緩衝液）中で行われる。24 g（正味重量）の袋詰めした細胞を、48 ml 緩衝液中に再懸濁させる。次に、PMSF（1 mM）、ベンズアミジン（5 mM）および DNase I（10 U/μリットルの RNase 遊離ストックを 10 μリットル）を添加する。懸濁は 4 回 15 ml ずつ、1000 ~ 1250 p.s.i で稼働させたフランス製の圧力セル（Aminco）に通す。Triton X-100（2%）を添加して、崩壊した細胞混合物を 20 分間攪拌する。粒子状物は、SS 34 ロータを内蔵した Sorvall RC-5B1 冷蔵超高速遠心分離機を使い、15,000 rpm の遠心分離に 45 分間かけて取り除く。上澄み液は、浮遊するクロロフィル分画の下からシリンジで吸い取った。（下層から上層に向けて）2 M のスクロース（4 ml）、1 M のスクロース（8 ml）、0.5 M のスクロース（7 ml）および 0.25 M のスクロース（7 ml）（すべて 0.75 M KPi 溶液）の段階的な勾配をもつスクロース緩衝液 6 つのそれぞれに、最上層として、約 9 ml の層が形成されていた。勾配液は、SW 27 ロータを使って、12 ~ 18 時間 25,000 rpm の遠心分離に

40

50

かけた。遠心分離後は、緑色、褐色、赤褐色、赤紫、紫および透明の各層（上層から下層に向けて）が種々の分離度で識別された。このうち、赤紫色帯（ロッドとフィコピリタンパク質凝集体）と紫色帯（フィコピリソーム）だけを取り出した。赤紫色帯は、パスツールピペットを使って吸引により取り出し、2～8で貯蔵した。安定化と抱合化したロッドは、この分画から調製し、ゲルクロマトグラフィーで精製し、不動化した。1.0 Mスクロース層における紫色のフィコピリソーム帯は、抽出して一時貯蔵し、K P i 緩衝液で4倍に希釈してから40分間SS34ロータを使って15,000rpmの回転数で遠心分離する。得られた上澄み液は、ペレット化された沈殿物（存在する場合）と分離し、2時間VTi50ロータを使って30,000rpmの回転数で遠心分離する。最終的な上澄み液を迅速かつ注意深く吸引すると、フィコピリソームを含むペレットが最小限のK P i 緩衝液に再懸濁する。タンパク質の濃度は、Lowry 外（1951年）の方法によって測定される。タンパク質の測定は、スクロースとTriton X-100の干渉に対する適当な比較例としてウシの血清アルブミンを用い、Folin フェノール試薬（「J.Biol.Chem」, 第193 巻：第265-275 頁）を使って行う。吸収スペクトルは、島津モデルUV-160記録装置付きスペクトロフォトメータで測定する。蛍光スペクトルは、4 mlの石英製キュベット内のものを、Compudyne PCに接続されたSpex FluoroMaxフルオロメータを使って、室温で記録する。

【0039】

一般に、フィコピリソームの放射スペクトルは、フィコピリソームを、遠方側のフィコピリタンパク質の吸収極大（例えばP. cruentum B-PEにあつては545nm）で励起することによって得られる。フィコピリソームは、通常以下の特徴を有する：1）タンパク質1mg当りの極大吸収（例えばP. cruentum B-PE にあつては、1mg当りAU₅₄₅）、2）所定濃度当りの蛍光信号（例えば無傷のフィコピリソーム10ng/ml についてのE_{max}における1秒当りの計数(cps)）、3）フィコピリタンパク質間エネルギー伝達の効率を反映する一またはそれ以上の蛍光比（例えばAPC/B-PE結合の指標としてのP. cruentum B-PE にあつては、666nmと573nm）。

【0040】

勾配超遠心分離によらないフィコピリソームの大規模な単離

公知の方法（例えばGantt とLipschultz（1972年）前掲およびGantt外（1979年）前掲）によるフィコピリソーム単離の簡便性、規模およびコストパフォーマンスには、勾配超遠心分離との対比によって厳しい基準がある。フィコピリソームの大規模で経済的な生産を可能ならしめるため、フィコピリソームを、種々の有機体から、勾配超遠心分離によらずに単離する手順が開発された。Triton X-100による安定化とPEG による沈殿を使ってAnabaena variabilis のフィコピリソームを単離する方法は、他の有機体、特にP. cruentumからは、無傷のフィコピリソームを得ることはできなかった。Triton X-100とPEG の除去中にP. cruentumのフィコピリソームを保護するためには、さらに処理工程が必要である。スクロースあるいはホルムアルデヒドのどちらを処理する方法も有効であることが分った。以下に要点を示したのは、スクロースの処理手順である。これは、修正を加えれば、rhodophytes（例えばP. cruentum）とcyanophytes（例えばAnabaena variabilis, Spirulina platensis）の両方に有効であることが分った。調製の規模は、遠心分離機とロータの組み合わせを選択し、容積を調整すれば、容易に変更できる。

【0041】

細胞は、その湿潤重量1 g 当り0.75 MのK P i (pH 6.8) 溶液5 mlに懸濁させた。PMSFとベンズアミジンを、それぞれ最終濃度が1 mMと5 mMになるように添加し、懸濁液を1000-1250p.s.i. のフレンチ圧力セルに3回通した。細胞膜に関連するフィコピリソームは、0.75 MのK P i (PH 6.8) 溶液中で、2%のTriton X-100とともに20分間攪拌しながら処理することによって溶解する。崩壊した細胞を調製するには、細胞膜の断片と粒子状の屑を除去するため、SS34ロータを備えたSorval RC-5B冷蔵超高速遠心分離機を使い、15,000rpmの回転数で20分間遠心分離する。上澄み液は、浮遊するクロロフィル層の下から、吸引によって収集する。ペレットは廃棄する。ついで、ポリエチレングリコール8000を、濃度が15%（重量/容量）となるまで、先の上澄み液に添加する。この混合物は1時

間攪拌し、SS34ロータを使い、15,000rpmの回転数で20分間遠心分離する。そして、上澄み液は廃棄する。ペレットは、0.75MのKPi中で穏やかに渦巻きを描きながら、2Mのスクロースをスクロースの最終濃度が1.5Mとなるまで添加することによって再懸濁させる。スクロースの添加後30分したら、懸濁液を、0.75MのKPi (PH6.8)で約4倍に希釈し、VTi50ロータを使ったBexkman L8-M超遠心分離装置を用いて回転数40,000rpmで3時間(20)遠心分離に付ける。上澄み液は廃棄する。ペレットは、最小量の0.75MのKPi (pH6.8)溶液に再懸濁するが、タンパク質、吸光および蛍光をそれぞれ測定して同定し(前掲参照)、フィコビリソームの供給源に応じて、冷蔵下または室温下で貯蔵する。

【0042】

フィコビリソームの安定化

公知の文献(例えばKatoh(1988年)「Phycobilisome stability」,「Methods in Enzymology」,第167巻,第313~318頁,Academic Press;およびGantt外(1979年)前掲書)によれば、単離されたフィコビリソームは、不安定で、タンパク質濃度とイオン強度が減少していく。フィコビリソーム内エネルギー伝達は、濃度に関連した545nmの励起線による666/573nm蛍光放出比の減少によって示されるように、蛋白質または(約1mg/ml以下)の緩衝液(約0.5M KPi以下)希釈後の数分間に中断される。

【0043】

公知の特異結合アッセイに用いるフィコビリソームでラベル付けした安定なリガンドとレセプタを何度も調製できるようにするためには、まずフィコビリソームを安定化する：1)共有結合による安定化は、好ましくはタンパク質修飾の分野でよく知られた(例えばWong(1991年)「Chemistry of Protein Conjugation and Crosslinking」,CRC Press)長さが短いかゼロの二官能基性試薬を使って、フィコビリソーム内(サブユニット間)の架橋によって達成される。2)共有結合による安定化はまた、炭水化物、脂質、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ペプチド、ポリアミノ酸、無秩序または秩序立ったアミノ酸のコポリマー、ヌクレオシド、砂糖または他の小さな有機分子などの天然または合成ポリマーを多部位結合させることによって達成される。このフィコビリソームのサブユニット間を共有結合させて相互に連結する方法は、一工程でも二工程でも行うことができる。3)非共有結合による安定化は、フィコビリソームの解離を熱力学的に好ましくないものにする補助溶媒、洗剤あるいは他の緩衝添加剤を使って行うことができる。4)非共有結合、すなわち親和力に基づいた安定化はまた、少なくとも二つのフィコビリソームサブユニットに跨る官能基結合部位に対して確固たる親和力を有する分子または分子群を使って行うことができる。適当な親和力を有する分子は、天然の、修飾したあるいは合成した抗体または抗体断片、オリゴヌクレオチド、ペプチド、タンパク質、レクチン、炭水化物または小さな有機分子のポリマーの、ランダムなふるい分けあるいは組み合わせによって選択される。

【0044】

フィコビリソームは、長さが短か目から中位の架橋剤を使い、一工程反応によって安定化させることができる。試薬と反応条件は、フィコビリソーム間重合よりもフィコビリソーム内架橋にとって好ましいものとなるよう選択する。鎖長が中位のホモ二官能基性ジアルデヒドであるグルタルアルデヒド(GA)ならびに鎖長が短いモノアルデヒドであるホルムアルデヒド(FA)は、両方とも、希釈によって誘発されるエネルギー伝達の寸断からフィコビリソームを保護するのに効果がある。GAを使った場合はフィコビリソームの安定化の程度が最大になるが、このときは一部が溶解しない。この事実は遠心分離あるいは長期の格納後に明らかになる。GAを使ったときの不溶解現象は、GAとフィコビリソームの濃度と反応時間とともに最適にすれば最小限にとどめることができる。その他、条件は、8000gで2分間遠心分離をしたとき、沈降物を完全に分離しながら、GAで安定化されたフィコビリソームは均質な懸濁状態にとどめたまま得られるよう、調整することができる。GAの安定化効果は、フィコビリソームを、GA/フィコビリソームの重量比が低い状態(たとえば0.027%のGA/0.727%のフィコビリソーム)から、GAで緩衝し

10

20

30

40

50

た反応混合物で希釈してGA/フィコビリソームの重量比を高める(たとえば0.10%のGA/0.10%のフィコビリソーム)よう、順序立てて処理することによって改善することができる。GAで処理する場合とは対比的に、鎖長が短い架橋剤(例えばFA)で安定化する場合、効果が最大になるのは、可溶性のフィコビリソームが凝集体や沈殿したりすることのないときである。

【0045】

フィコビリソーム調製物のサイズ分布と浮力密度への安定化および抱合化処理の効果を測定するため、フィコビリソーム単離時に用いたものに似た不連続なスクロース勾配について、反応前駆体および反応生成物の挙動を評価した。リジンで反応を終了させGAで安定化させたフィコビリソーム、未精製のフィコビリソーム抗体抱合体および未修飾のフィコビリソームをそれぞれ0.5mg、0.75MのKPi(pH 7.35)中に2.0M、1.0M、0.5Mおよび0.25Mのスクロースを含むそれぞれ2.5mlの溶液からなる10mlのスクロース勾配に適用した。核勾配は、70.1Tiロータ中で回転数50,000rpmの下に20時間(18)遠心分離にかけた。未修飾のフィコビリソーム勾配の上半分には、赤紫色の帯(ロッドとB-PE凝集体)が現れたが、これは天然のフィコビリソームがこれまでの条件下で一部分解したことを示している。GAで安定化させたフィコビリソームとフィコビリソーム抗体の抱合体勾配は、これとは対比的に、1.5Mスクロース域に単一の帯を形成した。これらの結果は、1)GAで安定化処理すると、超遠心分離中のフィコビリソームの解離を防止することができる;2)GAによる一工程での安定化/抱合化プロセスは、フィコビリソームあるいは抱合体の制御不能な重合を引き起すことはない;3)安定化したフィコビリソームおよび抱合体は、上述の共有結合による架橋の後も可溶性のままとどまる。

【0046】

修飾したフィコビリソームのラテックス微球体への不動化

リジンで消光させ、ケルクロマトグラフィーで精製された、FAで処理したフィコビリソームとフィコビリソーム抗体抱合体(「修飾したフィコビリソーム」)は、共有結合または受動吸収によって均一なラテックス粒子に不動化される。培養はすべて、室温で回転させながら行う。蛍光性および非蛍光性のカルボキレートで修飾したラテックス微粒子(粒径0.03~1μm)は、1~10mg/mlの最終濃度で使用した。

【0047】

微粒子への受動吸収は、20~200μg/mgの不動化率(μg(タンパク質/mg(粒子))の下、100mMのリン酸塩溶液(pH 7.2)中で1~16時間かけて行った。修飾したフィコビリソームとラテックスの懸濁液は、150mMの塩化ナトリウムを含む100mMのKPi中で8000gの加速度の下に、遠心分離を繰り返して洗浄した。

【0048】

共有結合による不動化は、100mM MES(pH 6.8)中で1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)-カルボジイミド(EDAC)を用いる一工程手順においても、同じタンパク質/粒子比の下に行われる。修飾したフィコビリソームは、攪拌しながら、粒子懸濁液の中に一気に注ぎ、1~2時間反応させた後、遠心分離で洗浄する。

【0049】

長期にわたって保存する場合には、不動化したフィコビリソームは、1%FAで後処理を施し、リジンで消光させ、ナトリウムシアノボロヒドリドで還元させた後、150mMの塩化ナトリウムと0.05%のアジ化ナトリウムを含む100mM KPiで洗浄した。

【0050】

抗原と抗体の常磁性粒子への不動化

不動化は、以下のプロトコルに従って室温下で行った。

アミンで修飾したBioMag(高磁性体)を、10mMのリン酸ナトリウム(NaPi; pH 7.35)の激しい渦巻き流中で5回洗浄し、粒子濃度が5~10mg/mlとなるように磁性体を分離した。最終洗浄の後、湿潤下ケーキは、6.25%のGA(Sigma)中で25mg/mlの濃度に再懸濁させ、室温下で3時間攪拌する。このGAで処理した粒子はNaPi中で6回洗浄

10

20

30

40

50

した。洗浄を終えた、G Aで活性化させた粒子は、タンパク質を含むP B S (pH 7.2-7.4)で、3 ~ 10 mg/mlに不動化させ、BioMag 1mg当り100 ~ 160 μ gタンパク質を産生すべく、再懸濁させた。B S Aは、BioMag粒子上のイムノ反応体間の間隔を調整するドーピング剤として含有させる。タンパク質溶液の一部は、不動化効率を測定するために保存しておく。タンパク質と粒子を含むスラリーは、室温で16 ~ 24時間攪拌する。粒子は、磁気を使って分離する。上澄み液はデカントし、残留するタンパク質の推測を行うために保存しておく。未反応のG A基は、粒子を、1Mのグリシン(pH 8.0)中で約10 mg/mlの濃度に再懸濁させることによって消光させ、その後1時間攪拌した。消光させた粒子はP B S (pH 7.4)中で2度洗浄し、2 mg/mlのB S Aを含むP B S中で2 ~ 4時間攪拌して粘着させた。粘着させた粒子は、1 mg/mlのB S Aを含むP B S中で3度洗浄し、粒子濃度が10 mg/mlとなるまで再検索させ、2 ~ 8 で保存した。一方、使用する方は、不動化させた試薬を長期にわたる保存中の浸出から保護するため使用する前に、粒子濃度が約1 mg/mlのアッセイ緩衝液中で激しい渦巻き流により3回洗浄した。

10

【0051】

抗原と抗体の微小滴定溜めへの不動化

タンパク質は、以下のプロトコルに従って、表面を修飾したポリスチレン製微小滴定プレートに受動吸収される。抗原と抗体は、ホウケイ酸ガラス管または50 mlのポリプロピレン製遠心分離管において、50mMのカーボネート緩衝液(pH9.6)または10mMのリン酸ナトリウム (Ph 7.4) 中で、使用の直前に2 ~ 20 μ g/mlに希釈した。透明なポリスチレン製のImmulon 4(商品名)または白色のMicrolite 2(商品名) (平底の微小滴定プレ(Dynatec h))を、1皿当り100 μ リットルの割合で、37 で2時間、室温(20 ~ 23)で4時間、または2 ~ 8 で15 ~ 24時間かけて、抗原・抗体を塗布した。プレートはデカントし、洗浄緩衝液(B S Aを1 mg/ml含むP B S (pH 7.4))を充填して1度だけ洗浄した後、またデカントした。プレートは、1時間かけて、2 mg/mlのB S Aを含むP B S 200 μ リットルでブロッキングを施し、さらに洗浄緩衝液で5回洗浄した。

20

【0052】

実施例

実施例1：非共有結合によるフィコビリソーム - 抗体抱合体特異結合アッセイ

未修飾のフィコビリソームは、特異結合試薬の調製と使用に用いる典型的な条件下では急速に解離するため、非共有結合によるフィコビリソーム抱合体は、プロセスの各工程において、フィコビリソームの濃度と反応条件に注意が必要であった。0.5 ~ 20 IgG2b/フィコビリソームのモル比を得るため、IgG2b サブタイプ(Sigma Chemical Company 製造)のネズミのモノクローナル抗体による抗フィコエリスリン抗体を、激しく攪拌しながら、2.5 mg/mlのB S Aを含む0.6 MのK P i (pH 7.2)中のP.cruentumのフィコビリソーム(5.6 mg/ml)に滴下した。反応は、室温下で30分間進行させた。免疫学的抱合体形成は、常磁性粒子上に不動化されたヤギ抗マウスIgG2b抗体を使うと、IgG2b-フィコビリソーム複合体が特異的に補足されることによって示される。50 μ リットルのBioMag-IgG2b(1%のB S Aを含む0.75M KPiで洗浄され、濃度は30mg/ml)を、200 μ gのフィコビリソームを含む40 μ リットルの抱合体混合物に添加した。補足試薬を添加した後、アッセイ混合物は、6.7 mg/mlのB S Aを含む0.66 MのK P i中に拘束されたIgG2bとともにまたはこれなしで、2.2 mg/mlのフィコビリソームを含む。この混合物は、室温下で30分間培養し、磁気を帯びたプレート(Corning社製)上に分離した。そして、0.75 MのK P i中で40倍に希釈した上澄み液を使って、545 nmにおける吸光度を測定した。IgG2bを増加させると、その投与量に応じて吸光度が減少した。これは、BioMag-IgG2bを介して特異結合によりフィコビリソーム-IgG2b複合体が生じたことを示している。特異結合が最大(26%)になるのは、IgG2bが1 ~ 3 μ gのときで、これを超えると、固体相の容量が不足するため結合割合は減少する。

30

40

【0053】

実施例2：ホルムアルデヒドを用いた安定なU Sフィコビリソーム試薬の調製

フィコビリソームを検出する試薬として使用する場合は、このフィコビリソームは通常

50

、構造的には無傷（「非解離状態」）にとどまらなければならない。非均質の特異結合アッセイ（測定前は、結合した首都遊離した種は無傷のまま分けてられていなければならない）に使用するには、フィコビリソームは、縫合、精製、アッセイならびに製品の製造、輸送および貯蔵の間、自発的な解離を防ぐため、安定化されていなければならない。共有結合による安定化方法は、フィコビリソームが、溶解度を損なうことなく、エネルギー結合および/または構造的な一体性を保存するように開発された。制御なく重合や中和を行ったときに生ずる沈殿を防ぐため注意深く最適化した条件の下では、架橋剤を使用した。最適化の際重要なパラメータには、架橋剤の型と反応性、絶対試薬と相対試薬ならびにフィコビリソームの濃度、反応時間、pHならびに反応終結と精製の方法が含まれる。P.cruentumのフィコビリソームを用いて例示したホルムアルデヒドによる安定化は、以下のように行った。

10

【0054】

単離したフィコビリソームは、0.05%のアジ化ナトリウムを含む0.75MのKPi(pH 7.2)中におけるタンパク質濃度を8.0mg/mlに調整した。最終的な濃度が1.0%になるよう、FA(0.75H KPi 中で11%)を攪拌しながら滴下した。反応混合物は、室温下で18時間放置し、1MのL-リジンで消光させた。そして、長期保存するため、FAで処理したフィコビリソームをナトリウムシアノボロヒドリドで還元し、150mMの塩化ナトリウムと0.05%のアジ化ナトリウムを含む100mMのKPi(pH 7.2)で平衡させたセファローズCL-6Bで精製した。

【0055】

20

フィコビリソームの希釈後における解離のしやすさは、希釈後の時間と量に応じたFA処理を施すことによって防止した。種々のFA濃度で18時間処理した調製物を、吸光度と蛍光を測定する前に(545nm励起、0.75M KPi(pH7.2)中で、65µg/mlと0.6µg/mlの濃度に分けて、2時間かけて培養した。

【0056】

【表1】

[FA](%)	AU ₅₄₅	蛍光放射(0.6µg/ml)		比
(x18hr)	(65µg/ml)	E ₆₆₆ (cps x 10 ⁻⁶)	E ₅₇₃ (cps x 10 ⁻⁶)	E ₆₆₆ /E ₅₇₃
0 比較例	0.302	1.07	1.22	0.88
(FA control)				
0.015	0.326	1.26	1.14	1.11
0.05	0.359	1.38	0.63	2.19
0.15	0.338	1.43	0.40	3.58
0.50	0.368	1.45	0.38	3.82
1.00	0.357	1.46	0.36	4.06

30

40

【0057】

エネルギー伝達が最適に保持されたのはFA濃度が1%のときであった。FA濃度を2%にして処理した場合も、ほぼ同程度の保持が得られた。

【0058】

イオン強度が低くした緩衝液中でフィコビリソームが解離しないよう安定化させるためにも、同じようなFA処理条件が必要であった。FAで処理したフィコビリソームは、0.1MのKPi中で約0.75µg/mlに希釈し、40時間室温下で放置した。時間間隔

50

を増大させるため1%のFAで処理した調製物の蛍光に関するデータを以下のように要約した。

【0059】

【表2】

- 蛍 光 -

処理時間 (時間)	(cps x 10 ⁻⁶ ; 0.75 μg/ml)		
	E ₆₆₆	E ₅₇₃	比 E ₆₆₆ /E ₅₇₃
0	0.45	6.25	0.07
2	1.88	1.02	1.84
5	2.06	1.00	2.06
18	2.31	0.91	2.54

10

【0060】

FAの安定化効果が架橋フィコビリソームの大きな不溶性のポリマーが形成によるものであるかどうかを調べるため、FAを使った調製物を遠心分離で推定した。フィコビリソームは、濃度が3.0%までのFAを使って処理した。反応は、室温下で2~18時間かけて行った。そして、可溶性の修飾済フィコビリソームの回収率を、十分に混合した調製物の545nmにおける吸光度を、8000gでの遠心分離を2分間行って得られた上澄み液のものと比較して推定した。沈殿の相対的な%割合は、FAで処理した調製物の回収率(%)を未処理の比較例のものから差し引いて測定した。高いFA濃度で長時間処理したものだけが、十分な沈殿を生起した。

20

【0061】

【表3】

[FA](%)	回収率 (%)			相対沈殿比 (%)		
	処理時間			処理時間		
	2時間	5時間	16時間	2時間	5時間	16時間
0 比較例	95.7	96.0	95.4	0	0	0
0.5%	93.5	-	97.0	2.2	-	0
1.0%	93.7	96.6	94.6	2.0	0	0.8
2.0%	-	92.4	-	-	3.6	-
3.0%	92.0	78.6	40.1	3.7	17.4	55.3

30

40

【0062】

FAで修飾したフィコビリソーム(2%のFAで5時間処理)は、室温下で18週間放置しても、沈殿が生じなかった。さらに、FAで処理したフィコビリソームは、攪拌の有無にかかわらず、回収率、抱合効率およびイムノアッセイの成果において、違いが見られなかった。これらの結果は、FAで処理したフィコビリソーム調製物が、タンパク質の修飾、精製、イムノアッセイおよび長期保存に適する均質な溶液のごとき挙動をしたことを示している。

50

【 0 0 6 3 】

F Aで処理したフィコビリソームは、通常の条件に従い、室温下で貯蔵した。一方、参照試料は、安定性の比較のため、2 ~ 8 で冷蔵した。F Aで安定化させたフィコビリソームの吸光度および蛍光は、島津モデルUV-160記録計付きスペクトロメータおよびSPEX FluoroMaxフルオロメータを使って測定した。

【 0 0 6 4 】

実施例 3 : グルタルアルデヒドを用いた安定な修飾済フィコビリソーム試薬の調製

フィコビリソームは、0.05% のアジ化ナトリウムを含む0.75M KPi (pH 7.3)を用いて、濃度を2 ~ 10 mg/ml、好ましくは約8 . 0 mg/mlに調整する。ついで、G A (0.75M KPi 中で0.2-1.0%)を、その容量の10 ~ 50 %を2分間かけて滴下するか、あるいは3時間 10
までかけてさらに3 ~ 6分画を追加した。F Aの添加後、反応混合物を室温下で1 ~ 18時間放置した。修正した一工程G A法による抱合化に先立って設計した好ましい安定化プロトコルにおいては、7 . 27 mg/mlのフィコビリソームと0.023%のG Aを含む反応混合物は、第一アミンを含むリガンド(例えば抗原)またはレセプタ(例えば抗体)の添加前に、室温下で3時間培養する。あるいは、G Aによる安定化反応は、過剰の第一アミン(例えば100 mMのリジン、アルギニン、グリシン、シスチンまたはグルタミン酸)を添加すれば終結する。G Aによる安定化の好ましいプロトコルにより、遊離アルデヒド以外の基を介して抱合化または不動化をする前に、フィコビリソーム(7 . 27 mg/ml)をまず1 ~ 2時間かけて0.023%のG Aに使うて安定化し、ついで、0 . 05 ~ 0 . 15 %のG 20
Aを先の5 ~ 10 %の容量を使用し1 ~ 4時間かけて培養を行った。反応は、100 mMのリジン、グリシン、シスチン、グルタミン酸または他の第一アミンを含有する消光剤を添加して終結させた。G Aで安定化されたフィコビリソームは、未修飾のフィコビリソームとF Aで安定化したフィコビリソームについて用いた方法により、吸光係数と蛍光を測定することによって同定した。P. cruentumから得た安定化フィコビリソームは、以下の性質について再現性があった：

- 吸光係数： > 4 AU₅₄₅/mg (平均は約5 . 0)
- 蛍光信号(666nm)： > 10⁴cps(1 ng/ml当り ; 545 nmで励起)
- 蛍光比： 666/573nm 放射比 > 3.0 (545 nmで励起)

【 0 0 6 5 】

G Aの安定化効果は、以下のように滴定した。10 mg/mlのフィコビリソームと0.003- 30
0.3%のG Aを含む反応混合物を得るため、G A (0.75M kpi中での濃度が0.03-3.0%)を、0.75M KPi中のフィコビリソームに攪拌しながら滴下した。室温で12時間経過したら、反応混合物を100 mMのグリシンで消光させ、滴定前に2週間室温下で貯蔵した。

【 0 0 6 6 】

希釈に対する安定性は、得られた調整物を、0 . 75 MのK P i (PH7.2)中において10 µg/mlの濃度で種々の時間培養することによって測定した。濃縮したフィコビリソーム貯蔵物は、一気に10 µg/mlまで希釈した。希釈した調整物の545 nmで励起したときの放射スペクトルは、種々の時間間隔で記録した。蛍光データは、E₆₆₆/E₅₇₃比で表した。直後(希釈後30秒)の比は、未処理の比較例では平均2 . 10であるのに対し、0 . 03 %のG Aで処理したフィコビリソームにあっては3 . 21であり、これは比較例において、大幅な希釈によって30秒以内に解離が生じたことを示している。 40

【 0 0 6 7 】

【表4】

処理方法	結果	吸収;		希釈後の		
		主なピーク	A U ₅₄₅ (10 μ g/ml)	E ₅₆₆ /E ₅₇₃ 比	1hr後	12hr後
G A が 0 比較例	均質な 紫色の液体	545>565	0.053	1.04	0.70	-33%
0.003%の G A で処理	明瞭な 変化なし	545>565	0.049	1.31	0.70	-25%
0.01%の G A で処理	明瞭な 変化なし	545>565	0.051	2.05	0.70	-16%
0.03%の G A で処理	わずかに かすみ、 微量な沈殿	545>565>350	0.055	3.04	0.70	-1%
0.10%の G A で処理	凝集体の ため濁る	545>350	0.051	3.41	0.70	-5%
0.30%の G A で処理	沈殿、脱色	550>350	0.033	N D	N D	N D

* N D : 検出せず

【0068】

G A の沈殿物中の濃度によって減少したイオン強度に対する安定化は、脱イオン水と0.75M KPi の種々の混合物を希釈した後に、比較例と0.03%のG A で処理したフィコピリゾームの蛍光スペクトルを監視することによって評価した。0.03%のG A で処理したことによる安定化効果は、希釈後1時間以内に顕著に明らかになった。

【0069】

【表5】

545nm で励起した後の

フィコビリソームの蛍光発光

 $(E_{666} \times 10^{-7} \text{ cps})$

<u>[KPi](mM)</u>	<u>未処理</u>	<u>GAで処理</u>
750	1.68	1.69
250	1.68	1.67
100	1.68	1.68
30	1.68(肩状)	1.66
10	1.68(ピークなし)	1.61
0.75(水で希釈)	1.68(ピークなし)	1.56

10

20

【0070】

GA(およびFA)による安定化プロセスにおける消光、還元および精製工程の詳細は、用途によって異なる。アルデヒドで処理したフィコビリソームの性質は、消光反応に使用するアミノ酸(例えばグリシン、D-アルギニン、L-リジン)によって変化する。さらに、適当な消光剤(例えば、チオール基の導入にはL-シスチン、糖基の導入にはグルコサミン)を選択することによって、新しい化学基を好便に導入することができる。例えば、フィコビリソームは、0.023%のGAで処理し、10mMのL-シスチンで消光し、その後の使用に備えて貯蔵しても、あるいは以下のように還元、精製および抱合してもよい。シスチンで消光しGAで処理したフィコビリソームは、30mMのジチオエリスリトールで還元し、100mMのNaCl(pH 7.4)を含む100mMのKPiで平衡化したSephacryl CL-6Bで精製した。100mMのリソ酸ナトリウム(pH 7.4)に溶解したSPDPを用いる確立した方法によって、ピリジルで誘導したストレプトタビジンと調製した(SPDPとストレプトタビジンのモル比は10)。生成物は、同一緩衝液中で透析によって精製し、ストレプトタビジンとフィコビリソームのモル比が2~10の範囲で、チオレート化フィコビリソームと反応させた。ストレプトタビジンとフィコビリソームの抱合体は、Sephacryl CL-6Bで精製した。ピオチンと特異的な結合をしたことは、補足剤としての常磁性粒子上に不動化したピオチン化したBSAを用いて示した。

30

40

【0071】

実施例4: フィコビリソームおよび修飾済フィコビリソームの脱水形での貯蔵

試薬追加工程を除去する手段として多くの診断テストやキットに用いる際には、再現性を改善し、また寿命を延ばすためには、乾燥試薬の形が好ましい。試薬を長期保存のため乾燥するには、凍結乾燥が一般的な方法である。文献によれば、フィコビリソームは凍結に対して不安定である(例えばGanttとLipschultz(1972年)「Phycobilisomes of Porphyridium Cruentum」, J. Cell Biol. 第54巻, 第313-324頁; Canani 外(1980年)「Reassembly of Phycobilisomes from Allophycocyanin and a Phycocyanin-Phycocerythrin Complex」, FEBS Letters, 第115(2)巻, 第225-229頁)。フィコビリソームと抱合体の凍結乾燥は、乾燥試薬フィコビリソーム製品フォーマットの実現可能性を確立するために行った。

50

【 0 0 7 2 】

フィコビリソームは、0.75M KPi 中に 8 . 8 ~ 9 . 5 mg / ml 存在する P. cruentum から単離した。このうち 2 ~ 3 ml (4 5 ~ 1 9 0 μ g) を瞬間凍結し、微小滴定用の液体溜め中で真空蒸発させた。乾燥したフィコビリソームは、0 ~ 4 週間室温下で貯蔵し、再懸濁、希釈して、吸光度と蛍光を測定するため、3 ml のキュベットに移した。緩衝液中に貯蔵しておいたフィコビリソーム (0.05% のアジ化ナトリウムを含む 0.75M KPi 中に 8.8-9.8 ml / ml 存在する) は、参照例として使用した。

【 0 0 7 3 】

結果をみると、吸光度は影響されなかったが、蛍光の放射についてはわずかに影響があった。未修飾のフィコビリソームは、凍結乾燥と 4 週間の貯蔵に耐え、吸光度に変化はなかった。しかし、蛍光の強度と E_{666} / E_{573} の放射比は、未処理の比較例と比べると、凍結乾燥と 4 週間の貯蔵の後には、15 ~ 20 % 減少した。凍結乾燥した沈殿物における蛍光強度が大きく減少したのは、0 ~ 1 週間であった。そして、1 ~ 4 週間の貯蔵中は、大きな変化はなかった。

【 0 0 7 4 】

共有結合により安定化したフィコビリソーム (フィコビリソーム - 抗体抱合体) は、150 mM の塩化ナトリウムと 0.05% のアジ化ナトリウムを含む 100 mM の KPi 中で凍結乾燥した直後に、相当程度分解する。666 nm における蛍光の放出は約 60 % 減少し、 E_{666} / E_{573} 比も 5 分の 1 に減少した。そして吸収スペクトルはかき乱れた。凍結乾燥の前に 1 M のスクロースを添加したところ、分解の徴候が緩和した。スクロースを補充した K P i 中の凍結乾燥した抱合体には、4 週間たっても、液体比較例または瞬間凍結乾燥した抱合体と比べ、蛍光と吸光度特性には顕著な変化は見られなかった。

【 0 0 7 5 】

実施例 5 : フィコビリソーム - 抗体抱合体の調製

すべての工程は、室温下 (2 0 ~ 2 3) で行った。P. cruentum から単離したフィコビリソームは、アジ化ナトリウム (2 mM) を含む 0.75M KPi (pH 7.35) 中で、濃度 8 mg / ml に規格化した。そして、GA 濃度が 0.023% でフィコビリソーム自身の濃度が 7 . 2 7 mg / ml の反応混合物を生成させるため、その 10 % の容量の GA (0 . 2 5 %) を、攪拌しながら 2 分間にわたって滴下した。反応混合物は、2 時間放置した。親和力で精製した Fc に特異的なヤギの抗マウス Ig G (GAM ; OEM 概念 ; 10 mM リン酸塩で緩衝した 0.1% のアジ化ナトリウムを含む等張生理食塩水 2 mg / ml) を、GAM / フィコビリソームのモル比が 12 : 1 (フィコビリソーム 1 mg に対して GAM が 128 μ g) となるよう、攪拌しながら滴下した。4 時間の培養後、その 10 % の量の 1.1M L - リジンを添加して反応を終結させた。消光した反応物は、回転させながら 1 時間にわたって混合した。この反応混合物の 5 容量 % に当る新しく調製したばかりのホウ化水素ナトリウム (Aldrich ; 0.1mM の NaOH 中で濃度 5mg / ml のもの) を、攪拌しながら反応混合物に加え、さらに 5 分後に同じ溶液を 10 容量 % 加えた。ホウ化水素塩で還元した反応混合物は、遠心分離または、好ましくは 150 mM の NaCl と 0 . 0 5 % の $NaNO_3$ を含む 100 mM の K P i (pH 7.35) で平衡化した Sephacryl S300 もしくは Sepharose CL-6B (Pharmacia 社製) ゲルクロマトグラフィーで精製するまで 2 ~ 8 で貯蔵した。

【 0 0 7 6 】

抱合体は、回収率 (フィコビリソーム出発物質に対する % 割合で示す可溶性フィコビリソーム抱合体の収率 ; 反応進行中の損失を計算する) ; 吸光計数 (AU / mg) ; 蛍光強度 (濃度を規格化した上での放出強度 ; ピーク比) および、固体相補足試薬として BioMag- M IgG を用いた競合的なフルオロイムノアッセイにおける特異結合に基づいて評価した。

【 0 0 7 7 】

超遠心分離で精製した抱合体の評価材料となる可溶性材料の収率は、72 ~ 100 % 、平均で約 90 % であった。単一口ットのフィコビリソームから調製した 12 の抱合体の E_{666} / E_{573} 比は、2 . 9 2 ~ 3 . 5 5 (平均 3 . 1 6) であった。規格化した蛍光強度 (入力を固定したときの E_{666}) は、平均で $4 . 1 5 \times 10^6$ (抱合体の濃度は 1 μ g / ml) で

あった。

【0078】

抱合体のBioMag-MIgG に対する特異結合の60%までは、疑似過剰（完全な飽和はなされていない）状態において、固相試薬によって示すことができた。代表的な結合データは下記の通りである。50μリットルのフィコビリソーム-GAM抱合体（80μ/ml）を、50μリットルの緩衝液を収め、MIgGに100μリットルのBioMag-MIgG（試験1回につき1mg）を加えたものを入れたかまたは入れない試験管に添加した。アッセイ用の試験管は攪拌し60分間室温で培養した。蛍光は、磁気による分離後取り出した160μリットルのアッセイ用上澄み液を使って、3mlに対して行った。

【0079】

【表6】

MIgG (重量/試験)	上澄み液のE ₆₆₆	結合率 (%)	MIgGによる阻害 (cps x 10 ⁻⁵)
0	22.44	42.1	
1 ng	27.91	28.0	5.47
10 ng	38.77	0.0	16.33

【0080】

G Aはまた、GAM抗体をFAで安定化したフィコビリソームに抱合させるのにも用いた。フィコビリソームは、2%のFAで4時間処理し、1MのL-リジンで消光し、さらにSephrose CL-6B によってクロマトグラフィーにかけた。気泡を生じた安定化させたフィコビリソームは、GAで処理し、抗体と12:1のモル比で一晩反応させた。リジンによる消光、ホウ化水素塩による還元および精製を、すでに述べたGAによる抱合化方法に従って行った。得られた抱合体は、E₆₆₆/E₅₇₃比が3.0を超え、60%がBioMag-MIgG に特異結合していた。10mMのKPiをベースとするアッセイ用緩衝液中で使用濃度で一晩室温で貯蔵しても、また100mMのKPiをベースとするアッセイ用緩衝液中で1週間貯蔵しても蛍光強度(E₆₆₆)またはイムノ反応性（特異結合の%割合）には顕著な減少は見られなかった。

【0081】

実施例6：光度計で検出する競合的イムノアッセイ

50μリットルの試料（アッセイ緩衝液）マウスのイムノグロブリン(MIgG)の濃度は変化させてもさせなくてもよいを、側方引き出し磁気ベース（Corning社製）を備えたMagic™セパレータに配置した12×75mmのガラス製試験管に添加した。粒子濃度が0.3~10mg/mlで洗浄したばかりのBioMag-MIgG を100μリットル添加した。試験管は攪拌し、50μリットルのフィコビリソーム-GAM抱合体（GAM/フィコビリソームのモル比は1.5~18）を、1~100μg/ml（5~500mAU/ml）のフィコビリソーム濃度で添加した。反応混合物は攪拌し、室温で1時間培養した。粒子は、Magic™ラックをその磁気ベースに5分間乗せたところ、分離された。アッセイ用の上澄み液160μリットルを、12×75mmのガラス製試験管に移し、ついで100mMのKPi（pH 7.35）で希釈し、光度計を使うアッセイ用には1mlを、蛍光計を使うアッセイ用には3mlを用意した。

特異結合の%割合は、粒子濃度を増加させたところ、急激に増加した。

【0082】

10

20

30

40

【表 7】

		上澄み液 の吸光度 (mAU/ml)			BioMag 濃度 による 結合割合 (%)		
PB-GAM*	MIgG*	BioMag =30*	BioMag =100*	BioMag =300*	30*	100*	300*
40	10	210	212	213			
40	0	210	200	173	0.0	4.7	18.8
12	10	66	68	66			
12	0	63	54	44	4.5	20.6	33.3
3	10	12	12	12			
3	0	12	10	4	0.0	16.7	66.7

* 単位はすべて $\mu\text{g}/\text{試験}$

【0083】

これとは別の実験において、抱合体と固体相の濃度を10倍にしてみたところ、抱合体の結合は、急激に増加した。アッセイの感度は、100ng/ml MIgG 以下と測定された。

【0084】

実施例7：蛍光検出による競合的イムノアッセイ

アッセイは、実施例6の方法に従って行った。ただし、試薬の濃度は、蛍光検出に適するように変えた。下に示すデータは、1回の試験当たり250ngのフィコビリソーム-GAM抱合体と、1回の試験当たり250ngのBioMag-MIgGを使用して得たものである。蛍光は、545nmで励起して記録した。

【0085】

【表 8】

[MIgG] (ng/試験)	E_{666} (cps $\times 10^{-5}$)	結合率 (%)	阻害 (cps $\times 10^{-5}$)
0	3.74	24.3	-
1	4.00	19.0	0.26
10	4.39	11.1	0.65
100	4.90	0.8	1.16
1000	4.94	0.0	1.20

【0086】

実施例8：不動化した抗原に予備結合したフィコビリソーム抱合体を用いた変位アッセイ

洗浄したBioMag-ウサギIgG (BioMag-RIgG) を、フィコビリソーム-GAM抱合体 (GAM/フィコビリソームのモル比が5/1) で、攪拌しながら室温下で2時間予備処理した。予備結合した試薬混合物は、アッセイ緩衝液で3回洗浄し、粒子濃度が400 $\mu\text{g}/\text{ml}$ と

なるように再懸濁させた。予備結合した試薬 500 μ リットルを、12 \times 75 mmの試験管に注入した。アッセイは、50 μ リットルの試料を混合物に添加し、攪拌して60分間室温で培養することにより行った。磁気を使った分離後、500 μ リットルの上澄み液を、蛍光測定のため、2.5ml の0.1M KPiに移した。

【0087】

【表9】

[MIgG] (ng/試験)	蛍光(cps $\times 10^{-5}$)		最大変位に対する
	E_{666}	変位	割合(%)
0	10.53	-	
1	10.72	0.19	6.1
10	10.85	0.32	10.4
100	11.62	1.09	35.3
1000	12.46	1.93	62.5
10000	13.62	3.09	100.0

【0088】

RlgGを塗布した液体溜め(20 μ g/ml)に予備結合した同じフィコビリソーム-GAM抱合体を用いた変位フォーマットにおいて、微小滴定用プレートを使ったアッセイを行ったところ、同じような結果が得られた。より低い変位可能な信号は、微小滴定用液体溜めの固体相における結合容量が常磁性粒子のものより低いことに起因する。

【0089】

【表10】

[MIgG] (ng/試験)	蛍光(cps $\times 10^{-5}$)		最大変位に対する
	E_{666}	変位	割合(%)
0	3.43	-	
1	4.11	0.68	36.8
10	4.78	1.35	73.0
100	5.25	1.82	98.4
1000	5.28	1.85	100.0

【0090】

実施例9：サンドイッチ(免疫計)イムノアッセイ

MIgGをフィコビリソーム-GAM抱合体を使って予備培養し、ついでフィコビリソームGAM-MIgG複合体をBioMag-ウサギの抗マウス抗体(BioMag-RAM)で補足すること

によって、逆サンドイッチアッセイを行った。このプロトコルは、主な（動的）イムノ反応を溶液中で進行させ、アッセイ動態を完全に立体障害を最小にすることによって、アッセイの感度を最大にする。一方、フィコビリソーム - G A M 抱合体は、以下のように、不動化したウサギのIgG(RIgG)に結合したモノクローナル抗体を検出するラベルを付した第2の抗体として使用することができる。

【0091】

50 μ l の緩衝液またはマウスの抗ウサギ抗体 (M A R) を、50 μ l のフィコビリソーム - G A M 抱合体 (20 ~ 80 μ g/ml) とともに30分間予備培養した。免疫複合体は、粒子濃度10 mg/mlにおいて、洗浄したばかりのBioMag - R IgGを100 μ lを加えて補足した。反応は、磁気を使った分離の前に、60分間進行させた。蛍光測定は、160 μ lのアッセイ用上澄み液を2.84 mlの0.1 M KPi に希釈/移し替えした後に行った。

【0092】

【表11】

[MAR] (ng / 試験)	1 μ g / 試験		2 μ g / 試験		4 μ g / 試験		
	E ₆₆₆ ($\times 10^{-6}$)	結合率 (%)	E ₆₆₆ ($\times 10^{-6}$)	結合率 (%)	E ₆₆₆ ($\times 10^{-6}$)	結合率 (%)	
0	1.483	0	2.400	0	4.147	0	20
0.1	1.392	6.1	2.322	3.3	4.196	0	
1.0	1.142	23.0	1.786	25.6	3.430	17.3	
10	0.823	44.5	1.289	46.3	2.107	49.2	
100	0.697	53.0	0.992	58.7	1.709	58.8	
1000	0.615	58.5	0.967	59.7	1.511	63.6	30

【0093】

実施例10：目視検出による微小滴定に基づくイムノアッセイ

競合アッセイ：白色のポリスチレンMicrolite™ 2 微小滴定プレート (Dynatech 社製) に、10 mM のリン酸ナトリウム (pH 7.35) 中に2 - 20 μ g/ml 溶解したMIgGを、2 ~ 8 で15時間、受動吸収によって塗布した。上澄み液は吸引した。微小滴定用の液溜めは、200 μ g/l のブロック緩衝液 (100 mM のリン酸カリウム (pH 7.35)、2 mM のアジ化ナトリウムおよび2 mg/ml のB S Aを含む10 mM のリン酸塩で緩衝した等張生理食塩水 (P B S, pH 7.4)) で、60分間室温で培養し、250 μ リットルの洗浄緩衝液 (1 mg/ml のB S Aを含むP B S) で6回洗浄した。最後の洗浄後、プレートはペーパータオルの上に逆さまに置き、しっかりと水をふき取った。各液溜めには、50 μ l のフィコビリソーム - G A M を各液溜めにつき0.5 ~ 10 μ g の濃度で添加した後、50 μ l のアッセイ用緩衝液 (100 mM のリン酸カリウム (pH 7.35) を含むP B S) 、2 mM のアジ化ナトリウムおよび1 mg/ml のB S A、あるいはMIgG (各液溜めのアッセイ用緩衝液中に10-1000ng 含有させる) を添加した。プレート (液溜め) は、室温下で1時間攪拌しながら培養した後デカントし、アッセイ用緩衝液で3回洗浄する前と後で検査を行った。不動化したMIgGに結合したフィコビリソーム - G A M 抱合体は以下の条件下においては、プレートの底部および下方側壁において紫がかかったピンク色の塗膜として、目視で識別できる (プレート洗浄の前も後も)。

1. MIgGの塗布濃度が0.5 μ g/液溜めより大きいこと；
2. フィコビリソーム - G A M 抱合体の濃度が1 μ g/液溜めより大きいこと；

10

20

30

40

50

3. 競合する可溶性MIgGの濃度が10 ng/液溜めより小さいこと。

【0094】

洗浄したプレートにおいては、非特異的な結合（可溶性MIgG1 µg/液溜め当りの呈色）は、フィコビリソーム - G A M濃度が最も高いときでも、目視では明らかではなかった。目視で検出可能な特異結合（MIgGが±1 µg/液溜めでの色差）は、コーティングと抱合体の濃度を最も高くして（コーティングが10～20 µg/ml、フィコビリソーム - G A M Uが5～10 µg/液溜め）処理した液溜めにおいて、最も顕著であった。これらの条件下で、MIgGの目視による検出限界は、 10^{-12} ～ 10^{-13} モル（MIgGが約 10^{-9} M）に対応して、10～100 ngであった。

【0095】

サンドイッチアッセイ： 白色のポリスチレンMicrolite™2微小滴定プレート（Dynatech社製）に、10 mMのリン酸ナトリウム（pH 7.35）中に2～20 µg/mlの親和精製したRAM（H+L）を、2～8で15時間かけて塗布した。上澄み液は吸引した。微小滴定用の液溜めは、200 µg/lのブロック緩衝液（前述の競合アッセイと同じもの）を使って、60分間室温で培養し、ついで250 µリットルの洗浄緩衝液（1 mg/mlのBSAを含むPBS）で6回洗浄した。最後の洗浄後、プレートはペーパータオルの上に逆さまに置き、しっかりと水をふき取った。各液溜めには、100 µlのアッセイ用緩衝液またはMIgG（各液溜めのアッセイ用緩衝液中に10-1000ng含有させる）を添加し、室温下で1時間培養した後吸引した。液溜めは、250 µg/lの洗浄用緩衝液で3回洗浄した。フィコビリソーム - G A M抱合体は、100 µlのアッセイ用緩衝液に、1回の試験当たり0.5～10 µgを添加した。そして、室温下で2時間攪拌しながら培養した後デカントし、アッセイ用緩衝液で3回洗浄する前と後で検査を行った。洗浄を行っても行わなくても、結合したフィコビリソーム - G A M抱合体は、以下の条件下においては、MIgGに曝された液溜め内において、目視で識別することができた。

1. RAMの塗布濃度が0.2 µg/液溜めより大きいこと；
2. MIgGの濃度が10 ng/液溜めより大きいこと；
3. フィコビリソーム - G A M抱合体の濃度が、RAMとMIgGの濃度に対応して、1.5～10 µg/液溜めであること。

【0096】

洗浄の前に、10ng/mlのMIgGに曝した液溜めを、アッセイ用緩衝液と目視で見分けるのは余計なことであった。洗浄しても、解像度はわずかしが改善しなかった。固体相の結合能力や抱合体濃度の増加、より高い親和力トレーサ抗体の選択、アッセイプロトコルまたは緩衝液の組成の変更、あるいは紫外線照射下での結合した固体相検査用の好ましい条件決定など、免疫測定用の微小滴定アッセイにおける目視検査の限界を最適なものにするための工夫は、特に行わなかった。

【0097】

実施例11：目視検査を行うイムノクロマトグラフィー用の計量棒

競合アッセイの方法： MIgGを、以下のようにして、アルデヒドで処理した修飾済ポリスルホン膜上の局所領域に共有結合で不動化させた。有効孔径0.8 µMのUltrabind™ US800不支持膜（Gelman Sciences社製）を20 cm×6 cmに切断した。MIgG（10mMのリン酸塩で緩衝した等張る生理食塩水（PBS）中に2～10 mg/ml溶解したもの；pH 7.2；アジ化ナトリウムを0.1%含む）を、先細りのキャピラリーピペット（Drummond Scientific社製）を使い、先の切断片の中段（各縁から3 cm）に鉛筆で引いた線に沿って1 cm当たり4 µlの量だけ、手でスポットを垂らした。30分間風乾した後、膜は、10mMのPBS（pH 7.4）中に1%のBSAを含むブロック緩衝液50 ml中で、穏やかに攪拌しながら1時間室温下で培養し、0.1%のBSAを含む100 mlのPBS（pH 7.4）で2度すすぎ、3時間風乾した。すすぎと乾燥を終えた膜はついで、0.2%のTween 20を含むPBS（pH 7.2）中で、1時間攪拌しながら洗浄し、室温で一晩乾燥させた。

【0098】

フィコビリソーム - G A M抱合体は、以下のようにしてMIgGで修飾した膜に適用した。

乾燥し、洗浄した膜の切断片を20個の1×6cmの細片に切断した。0.1Mのスクロースを含む0.5M KPi(pH 7.35)中に約0.5mg/mlの安定化したP.cruentumフィコビリソームと10μg/mlの免疫学的に活性なGAMを含むフィコビリソーム-GAM抱合体(2.5 AU₅₄₅/ml)10μリットルを、各1×6cm細片において、不動化したMIgGを垂らした中央横断線と細片の一端の間の中間部分における約1cm²に適用した。抱合体で処理した細片は、使用前に30分間空気乾燥させた。

【0099】

イムノクロマトグラフィーに用いるMIgG計量棒は、抱合体で処理した乾燥した細片の両端部を緩衝液(1mg/mlのBSAを含むPBS(pH 7.4))またはMIgG(緩衝液中の濃度が1μg/ml)に接触させ、試料を毛管減少によって細片に染み上がらせて使用した。液体の前端が緩衝液で処理した細片を3.5cm上昇したところで(約10分後)、紫がかったピンクの帯が不動化したMIgGの線(3cm)に現れた。帯が緩衝液で完全に飽和されるにつれて(約20分かかる)、徐々に明瞭になった。MIgGを含む緩衝液に曝された細片には帯は現れず、フィコビリソーム-GAMの不動化したMIgGへの特異結合が可溶性MIgGによってかなり阻害されたことを示している。

10

【0100】

細片を暗室で腸は長の紫外線(365nm)に当てて検査したところ、MIgGで処理した細片には局所的なフィコビリソーム-GAM蛍光は探り当てることができなかった。一方、緩衝液で処理した細片においては、不動化したMIgGに結合したフィコビリソーム-GAMが、暗青色の背景に対して強い蛍光を放つ赤い帯として明瞭に識別された。この蛍光帯は、細片を空気乾燥させたところ、消失した。緩衝液で処理し乾燥させた細片に現れた帯に水をかけたところ、強い局所的な赤色(フィコビリソーム)と動的なオレンジ色(B-PE)の蛍光相が観察された。これは、GAで処理し乾燥と再湿潤を行ったフィコビリソームが一部解離したことを示唆している。凍結乾燥の前と後でフィコビリソーム-GAM抱合体を蛍光計で評価したときも、同様の結果が得られた。545nmの光で励起したときのE₆₆₆/E₅₇₃の放出比は、乾燥と再構成のため顕著に減少した。これは、抱合体がスクロースまたは他の保護基で前処理されないときは、蛍光エネルギーの伝達が行われなかったことを示唆している。単離したB-PEは、APC(P.cruentumフィコビリソームの末端アクセプタ)より強い蛍光体であるため、抱合体結合工程と検出工程の間に起こるフィコビリソームの解離は、蛍光信号を増幅し、アッセイ感度を増加させる手段を提供することになる。

20

30

【0101】

サンドイッチアッセイの手順：親和力を利用して精製したRAM抗体((H+L鎖)に特異的な結合をする；OEM概念)を除いて、競合アッセイにおける細片の調製とほぼ同じ方法によって、免疫測定用のMIgG片を調製する。1cm当り10μlのRAM(2mg/ml)を、10×6cm膜片の幅方向にスポットをつくるのに用いた。このMIgG片はついで、スポットの拡大を抑え、すすぎと洗浄をし、さらにMIgG不動化膜のような1×6cmの細片に切断した。0.2Mのスクロースを含む0.5M KPi(pH7.35)に溶解した約1mg/mlの安定化P.cruentumと20μg/mlの免疫学的に活性なGAMを含む10μlのフィコビリソーム-GAM抱合体(5.1 AU₅₄₅/ml)を、競合アッセイにおける細片と同じように不動化したRAM線と細片端の間の中間箇所適用し、この細片を使用前に空気乾燥した。

40

【0102】

サンドイッチアッセイ用のMIgG細片は、MIgG(1μg/ml)とともに、あるいはMIgGなしで、抱合体で処理した端部をPBS-BSA緩衝液に接触させ、毛管作用によって細片を試料で飽和させる(約20分かかる)ことによって評価した。MIgGで処理した細片には、不動化したRAM線に明瞭な紫-ピンクの帯が形成されたが、緩衝液で処理した比較例には現れなかった。これらの結果は、免疫測定において、6×10⁻⁹Mの検出限界以下でも、可溶性フィコビリソーム抱合体が特異的な結合することを示している。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
G 0 1 N 33/53 M
G 0 1 N 33/547

(56)参考文献 特開昭58-160866(JP,A)
米国特許第04542104(US,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G 0 1 N 3 3 / 5 4 3
G 0 1 N 2 1 / 7 8
G 0 1 N 3 3 / 5 3
G 0 1 N 3 3 / 5 4 5
G 0 1 N 3 3 / 5 4 7

专利名称(译)	藻胆体，其衍生物和用途		
公开(公告)号	JP4102835B2	公开(公告)日	2008-06-18
申请号	JP2006073617	申请日	2006-03-17
[标]申请(专利权)人(译)	CUBICCIOTTI ROGER小号		
申请(专利权)人(译)	队列锯奥蒂，罗杰，ES		
当前申请(专利权)人(译)	队列锯奥蒂，罗杰，ES		
[标]发明人	キュビキオツティロジャーエス		
发明人	キュビキオツティ,ロジャー,エス		
IPC分类号	G01N33/543 G01N21/78 G01N33/545 G01N33/53 G01N33/547 G01N33/532 C07K14/405 C07K16/14 C12P21/00 C12R1/89 G01N33/533 H04M11/00		
CPC分类号	C07K14/405 C07K16/14 G01N33/533 Y10S435/963		
FI分类号	G01N33/543.501.D G01N33/543.511.P G01N33/543.575 G01N21/78.C G01N33/545.A G01N33/53.M G01N33/547		
F-TERM分类号	2G054/AB04 2G054/CA22 2G054/CE02 2G054/EA03 2G054/GA04 2G054/GB02		
代理人(译)	清水初衷		
审查员(译)	宫泽浩		
优先权	08/420726 1995-04-10 US		
其他公开文献	JP2006234824A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)	重量(試験)	工能の概率(%)	相対率 (%)	ミグロによる阻害 (cps x 10 ⁻⁵)
要解决的问题：提供使用修饰或完整的藻胆体的方法和组合物，这些藻胆体是敏感监测试剂盒中非常有效的标记物（例如用于血液污染），特异性结合分析（例如视觉，光度和荧光免疫分析）和光电器件（例如生物传感器，光电传感器）。ZSOLUTION：该组合物包含藻胆体异型缀合物，杂合物含有两种共价化学物质。第一种化学物质是藻胆体，第二种化学物质是选自自由配体，受体，信号产生分子，位点特异性分子和制造的固态支持物组成的组中的组合物。Z	0	22.44	42.1	
	1 ng	27.91	28.0	5.47
	10 ng	38.77	0.0	16.33