

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公表特許公報 ( A ) (11)特許出願公表番号

特表2003 - 515313

(P2003 - 515313A)

(43)公表日 平成15年5月7日(2003.5.7)

| (51) Int.Cl <sup>7</sup> | 識別記号 | F I            | テ-マコード ( 参考 ) |
|--------------------------|------|----------------|---------------|
| C 1 2 N 15/09            | ZNA  | A 6 1 P 7/02   | 2 G 0 4 5     |
| A 6 1 K 38/00            |      | 9/10           | 4 B 0 2 4     |
| A 6 1 P 7/02             |      | C 0 7 K 14/705 | 4 C 0 8 4     |
| 9/10                     |      | G 0 1 N 33/15  | Z 4 H 0 4 5   |
| C 0 7 K 14/705           |      | 33/50          | Z             |

審査請求 未請求 予備審査請求 ( 全 30数 ) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000 - 616343(P2000 - 616343)

(86)(22)出願日 平成12年4月25日(2000.4.25)

(85)翻訳文提出日 平成13年11月7日(2001.11.7)

(86)国際出願番号 PCT/EP00/03683

(87)国際公開番号 W000/068377

(87)国際公開日 平成12年11月16日(2000.11.16)

(31)優先権主張番号 99109094.5

(32)優先日 平成11年5月7日(1999.5.7)

(33)優先権主張国 欧州特許庁(EP)

(71)出願人 メルク パテント ゲゼルシャフト ミツト ベシュレンクテル ハフトング  
 MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHR  
 AENKTER HAFTUNG  
 ドイツ連邦共和国 デー - 64293 ダルムシュタット  
 フランクフルター シュトラッセ 250

(72)発明者 クレメントソン、ケネス、ジェイ .  
 スイス国 シーエイチ - 3065 ベルン フルラクカー 29

(74)代理人 弁理士 金田 暢之 ( 外 2 名 )

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 組換え血小板コラーゲン受容体糖タンパク質 V I およびその薬学的使用

(57)【要約】

本発明は、糖タンパク質 V I ( G P V I )、その単離、精製および組換え製造法に関する。特に、本発明は、血栓症的疾患および心臓血管疾患などの血液凝固異常に直接的または間接的に相関する異常および病理学的事象の処置における G P V I、好ましくは組換え G P V I、の使用に関する。この細胞外組換えタンパク質はまた、栓球および血小板がそれぞれコラーゲンに結合することを阻害する、膜結合型 G P V I の潜在的な阻害剤を見出すスクリーニングアッセイを確立するためにも使用することができる。G P V I の変化は、血栓症的疾患および心臓血管疾患に対する血小板の老化および露出をモニターするために使用することができる。

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 糖タンパク質V Iまたはその生物学的活性フラグメントをコードするDNA。

【請求項2】 図2の配列の一部または全体を含む請求項1に記載のDNA。

【請求項3】 図2の配列を有するDNA。

【請求項4】 図1 aおよび図1 bのアミノ酸配列を含む糖タンパク質V Iをコードする請求項1から3に記載のDNA。

【請求項5】 図1 bのアミノ酸配列を含む、医薬品としての組換えヒト糖タンパク質V I。

【請求項6】 請求項5に記載されるタンパク質と、それに対する薬学的に許容される希釈剤、担体または賦形剤とを含む医薬組成物。

【請求項7】 薬理的に活性な化合物をさらに含む医薬組成物。

【請求項8】 血小板 - コラーゲン間の相互作用の特異的な阻害剤を検出するためのスクリーニングツールにおける組換えG P V Iの使用。

【請求項9】 血小板 - コラーゲン間の相互作用に関連する血栓症のおよび心臓血管系の事象および異常の治療分野における医薬品を製造するための組換えG P V Iの使用。

【請求項10】 血栓症のおよび心臓血管系の状態または事象に対する血小板老化および血小板露出のマーカースとしてのG P V Iにおける変化の使用。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

本発明は、糖タンパク質V I ( G P V I )、その単離、精製および組換え製造法に関する。特に、本発明は、血栓症的疾患および心臓血管疾患などの血液凝固異常に直接的または間接的に相関する異常および病理学的事象の処置におけるG P V I、好ましくは組換えG P V Iの使用に関する。この細胞外組換えタンパク質は、血小板およびコラーゲンの相互作用を阻害するための、膜結合型G P V Iの潜在的な阻害剤を見出すスクリーニングアッセイを確立するためにも使用することができる。血小板表面のG P V Iは、血小板の寿命期間中に生体内で変化を受け、従って血小板老化プロファイルのマーカールとして使用することができる。

## 【0002】

糖タンパク質V Iは、F c の共通したサブユニットと一緒に複合体を形成する62 / 65 k D a (それぞれ、非還元 / 還元型)の血小板膜糖タンパク質である。G P V Iサブユニットはコラーゲン結合部位を含有し、F c サブユニットはシグナル伝達に参与している。この複合体は、コラーゲンに応じて血小板の活性化に重要な、血小板表面の主要なコラーゲン受容体の1つを形成している。コラーゲン上の認識配列は( G l y P r o H y p )<sub>n</sub>の配列からなる。G P V Iの遺伝子的欠損を有する患者が日本から知られている。その患者らは軽度の出血の問題を有しており、患者の血小板は、おそらくは他の受容体を介して、コラーゲンに弱く応答するだけである。非常に多くことが、G P V Iから出発するシグナル伝達カスケードについて突き止められており、このシグナル伝達カスケードは、T細胞受容体、B細胞受容体およびナチュラルキラー細胞受容体を含む免疫受容体に由来するシグナル伝達カスケードと著しく類似している。これらのカスケードには、p 7 2<sup>SYK</sup>と同様にF y nおよびL y nなどのs r cファミリーのチロシンキナーゼ、ならびに多くの他のチロシンキナーゼおよびホスファターゼ、およびL A Tなどのアダプタータンパク質が含まれる。これらのカスケードの主要な標的は、リン脂質を切断して二次メッセンジャーのジアシルグリセロールおよびI P<sub>3</sub>を生じさせるホスホリパーゼC 2の活性化である。G P V Iは、損傷を受けた血管壁に対する血小板接着における主要な役割を有する血小板インテ

グリニン<sub>2</sub><sub>1</sub>の活性化に関与していると考えられる。Fcサブユニットが「ノックアウト」されたマウスは、コラーゲンに対する応答を依然として示す血小板を有する。このことは、<sub>2</sub><sub>1</sub>の休止状態もまたGPVI/Fc複合体によって調節されているかもしれないことを意味している。

#### 【0003】

血小板のコラーゲン受容体GPVIは、FcRと同様に、p58KARファミリーのナチュラルキラー活性化受容体に非常に関連している。

#### 【0004】

循環している休止血小板の血管傷害部位における接着および活性化は、止血栓に伝達される血栓が形成されるプロセスの第1段階である。コラーゲンは、血小板の活性化に関わる血管壁の主要な成分の1つである。コラーゲンには多くのタイプが存在し、これらのうちの7つが内皮下層で見出されている。コラーゲンに対するいくつかの異なる受容体が血小板において同定されているが、主要な受容体は、現在、インテグリン<sub>2</sub><sub>1</sub>および非インテグリンのGPVIであると見なされている。<sub>2</sub><sub>1</sub>は十分な特徴付けが行われ、そして両方のサブユニットが数年前にクローン化および配列決定されたが、GPVIの構造は、いくつかの特徴が同定されているにもかかわらず、解明されないままである。GPVIは、分子量が60kDa~65kDaの範囲にあり、酸性のpIを有する主要な血小板糖タンパク質であることが約20年前に明らかにされた。推定的なコラーゲン受容体としてのその役割は、血小板がコラーゲンへの応答の特異的な欠如を示し、この受容体を有しない、軽度の出血異常患者が日本で確認された後に確立された。この患者はその不完全な受容体に対する自己抗体をも発達させていたので、この自己抗体を使用してこの分子の特徴付けがさらに行われた。より近年には、GPVIが、複合体のシグナル伝達部として作用する共通のFcサブユニットと非共有結合的に会合していることが明らかにされた。GPVIに対するコラーゲン上の認識配列がコラーゲンの三重らせん構造内の反復したGly-Pro-Hypトリプレットであること、そしてこの構造に基づく合成ペプチドがGPVIに対する特異的なアゴニストとして使用され得ることもまた明らかにされた。GPVI/Fc複合体は、p72<sup>SYK</sup>の活性化を含み、キナーゼ/ホスファターゼ

ノアダプタータンパク質の相互作用のカスケードによりPLC 2を活性化させ、従って顆粒の放出および血小板の凝集に至る免疫受容体様の機構によって血小板内部にシグナル伝達することが明らかにされた。この分子を特徴付けることにおけるさらなる段階は、熱帯ガラガラヘビ*Crotalus durissus terrificus*から得られたヘビC型レクチンのコンブルキシン(*convulxin*)が、多量体相互作用によりGPVIをクラスター化することによって血小板を活性化し得るということが明らかにされたことであった。コンブルキシンは、GPVIに特異的に結合することを示し、確立された方法と組み合わせることでこの受容体を精製する方法を提供する。

#### 【0005】

従って、GPVIは、とりわけコラーゲン-血小板の相互作用に依存する血液凝固事象に、直接的または間接的に関連する適用に関する多くの治療分野において、非常に興味深い化合物であると考えられることは先行技術から明らかである。従って、GPVIを組換え形態で提供し、かつ直接的な治療標的としてのその効力、または小さな化合物、特に、自然のコラーゲン-血小板相互作用を阻害または阻止する能力を有する化学合成化合物または化学合成可能な化合物、をスクリーニングするためのツールとしてのその効力を示すことは本発明の目的であった。

#### 【0006】

本発明はまた、コラーゲンに結合する、という生物学的活性を保持しているGPVIタンパク質の一部またはフラグメントに関する。

#### 【0007】

本発明は、予備的な特徴付けおよびペプチドの配列決定に十分な量のGPVIを精製することに成功した。その配列を使用して、DNAライブラリーにおける陽性配列を同定するためのPCR用プライマーを設計した。このDNA配列は、その後、ほぼ完全なcDNA配列をライブラリーから単離するためのプローブとして使用され、そして足りない5'-配列が、血小板のcDNAライブラリーからRACE法を使用して得られた。

#### 【0008】

本発明はまた、例えば、損傷を受けた血管壁を有する患者において投与されたときに、コラーゲンに結合し、従って、膜結合型G P V Iを有する血小板が前記コラーゲンに結合しないようにし得る治療に適用可能な化合物として、組換えG P V Iが使用されることを示すことにも成功した。G P V Iのこの組換え可溶性細胞外ドメインは、コラーゲン結合部位を含有し、コラーゲンによる血小板の活性化を妨げることができる。従って、このドメインは、アテローム硬化性斑破裂などの、コラーゲンにより増大した血小板活性化を含む疾患状態の処置に、あるいは不安定狭心症などの疾患において、あるいは血管壁に対する相当の損傷および血小板の大きな活性化を生じさせ、そして多くの場合には血管の再開鎖を後で生じさせる、バルーンカテーテルの膨張によって動脈が再開通される経皮冠動脈管腔拡張術(P T C A)などの手術的処置のときに適用することができると考えられる。組換えG P V Iフラグメントの利点は、現在の処置法と比較した場合、フラグメントが、G P I I b - I I I aアンタゴニストによる凝集などの血小板活性化後の事象を抑制することによるのではなく、むしろ血小板の活性化を妨げるか、または血小板の活性化を低下させることによって、より早い段階で作用するということである。従って、より少ない量の血小板顆粒内容物が放出される。これには、外傷修復だけでなく、平滑筋遊走による血管壁の再構築、およびアテローム性動脈硬化症の一因であることが知られている単球などの食細胞の引き寄せにも関与している増殖因子およびケモカインが含まれる。G P V Iに対するヒト化マウスモノクローナル抗体のF a bフラグメントは、上記のような類似する適用で血小板表面のG P V Iを阻止するために類似した効果で使用することができる。

#### 【0009】

本発明による組換えG P V Iはまた、この相互作用を阻害することができ、かつコラーゲン-血小板相互作用の阻害剤である治療化合物を開発するために使用され得る(例えば、コンビナトリアルライブラリーの)小さな分子をスクリーニングするために、コラーゲンに対する結合アッセイにおいて使用することができる。好適な誘導体化により、これらの化合物は経口的に利用することができる。再度ではあるが、主要な目的は、G P V I - コラーゲンの相互作用を低下させ、

従って、血小板がコラーゲンと接触する状況で血小板の活性化を低下させる化合物を調製することである。そのため、本発明において使用されているスクリーニング技術自体は、先行技術において十分に確立されている。そのようなスクリーニングアッセイにより、本発明は、血小板表面に存在する天然の膜結合型G P V Iをコラーゲンアンタゴニストとして阻害し得る新しい標的の発見および開発を可能にする。小さな化学物質分子であり得るそのような標的は、その後さらなる発明の基礎となり得る。

#### 【0010】

G P V IおよびG P V Iの特定ドメインを認識する試薬の別の主要な適用は、血小板の老化および機能性のマーカーとしての適用である。若い血小板は、一般に、老化した血小板よりも活性であり、かつ機能的であると考えられる。若い血小板は、G P V Iに特異的なヘビ毒液C型レクチンのコンブルキシニンに結合し、かつコンブルキシニンにより活性化され、そして血小板は老化するに従って、その結合および活性化度はともに低下する。これは、循環における血小板の活性化または損傷によるG P V Iにおけるタンパク質分解的または立体配座的な変化あるいはF c とのその会合のいずれかのためであり得る。これは、医学的に管理されている患者ならびに健常者における血小板の老化プロファイルおよび機能プロファイルを測定するための有用なパラメータであり得る。血小板の老化プロファイルは、骨髄または免疫系を冒す多くの疾患において変化し、そのより良好な決定方法が得られる場合には重要な診断基準になり得る。例えば、血小板の増大した代謝回転が関与する疾患患者はより多くの若い血小板を示し、これに対して、化学療法または放射線処置を受けている患者は一様に老化した集団を示す。従って、そのような老化プロファイルは、処置の精密なモニターリングに使用することができる。正常である健康な集団では、老化プロファイル分布について、そして健康における変化を予測するものとしてのその役割についてはほとんど知られていない。G P V Iの変化が止血事象における血小板の部分的な関与であるかどうか、そして変化が広範囲の心臓血管疾患を有する患者でより顕著であり得るかどうかは知られていない。現在、チアゾールオレンジが、mRNAを含有する若い網状化血小板を検出するために使用されている。このmRNAはすぐに崩

壊し、このため、この方法は最も若い血小板のみに制限されている。そのようなアッセイにおいて使用され得る試薬には、コンブルキシンなどのG P V I 特異的なヘビ毒液タンパク質、あるいはG P V I のN末端領域を認識するモノクローナル抗体またはポリクローナル抗体、あるいは無傷の分子に存在し、かつ老化した分子には存在しない、またはその逆のN末端ドメインまたは特定の立体配置のタンパク質分解により露出した新しい部位または立体配置を認識するモノクローナル抗体、あるいは無傷のG P V I を特異的に認識する選択された小さな化学的実体またはその改変形態が含まれる。これらの試薬は、血小板の結合プロファイルを測定するために、蛍光マーカーで標識されるか、あるいは蛍光標識された二次抗体またはアフィニティ試薬と一緒にされてフローサイトメトリーにおいて使用される。代替可能な後者の段階では、血小板プロファイルの自動化された測定に基づくあまり手間のかからない測定技術を採用することができる。フローサイトメトリーまたは磁気ビーズによる細胞選別を使用することによって、若い血小板および老化した血小板を単離して、老化した血小板の循環からの除去に關与する因子を調べることが可能になるはずである。G P V I の特定の形態を認識する試薬は、そのような研究にとって重要である。

#### 【0011】

従って、糖タンパク質V I またはその生物学的活性フラグメントをコードするDNA、特に図2の配列を提供することは本発明の目的である。

#### 【0012】

図1 a および図1 b のアミノ酸配列を含む糖タンパク質V I をコードするDNAを提供することは本発明のさらなる目的である。

#### 【0013】

組換えG P V I を、薬学的に許容される希釈剤、担体または賦形剤と一緒に含む医薬組成物、ならびに血小板 - コラーゲン間の相互作用に關連する血栓症のおよび心臓血管系の事象および異常の治療分野における医薬品を製造するためのその使用を提供することは本発明の別の目的である。

#### 【0014】

本発明の別の目的は、血小板 - コラーゲン間の相互作用の特異的な阻害剤を検

出するスクリーニングツールにおける組換えG P V Iの使用である。

【0015】

本発明の別の目的は、心臓血管疾患に対する血小板の老化および露出のマーカ-としてのG P V Iの使用である。

【0016】

考えられる医学的な症状および適用にはそれぞれ、例えば、不安定狭心症、P T C A、この分野におけるステントの使用、冠状動脈血管に対する手術、血管に対する一般的な手術、股関節手術などのより大きな血管に損傷を与え得る手術がある。さらに、血管壁と、血栓形成および血管閉塞のリスクが高い凝固系との相互作用の異常によって生じる血栓塞栓性事象に関連するすべての適応症が含まれる。

【0017】

上記に示されているように、本発明によるG P V Iタンパク質またはそのフラグメントは、医薬組成物および配合物における薬学的に効果的な化合物として好適である。

【0018】

本発明による医薬配合物は必要に応じて、ヒルジンまたはヘパリンなどの抗凝固剤、あるいはプラスミノゲン活性化因子またはヘメンチンなどの血栓溶解剤、あるいはアブシキマブ(a b c i x i m a b)またはエプチフィバチドのようなG P I I b - I I I aアンタゴニストなどの他の血小板受容体に対するアンタゴニスト、あるいはクロピドグレルなどのA D P受容体アンタゴニストのようなさらなる有効成分を含むことができる。

【0019】

本発明による新規タンパク質およびその生物学的活性フラグメントは、それぞれ、任意の非毒性の有機酸または無機酸との薬学的に許容される塩を形成し得る。無機酸は、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸またはリン酸、ならびにオルトリン酸一水素ナトリウムおよび硫酸水素カリウムなどの酸金属塩である。有機酸の例には、酢酸、グルコール酸、乳酸、ピルビン酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、フマル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、マレイン酸、

ヒドロキシマレイン酸、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、フェニル酢酸、ケイ皮酸、サリチル酸などのモノカルボン酸、ジカルボン酸およびトリカルボン酸、ならびにメタンスルホン酸などのスルホン酸がある。カルボキシ末端アミノ酸残基の塩には、任意の好適な無機塩基または有機塩基によって形成される非毒性のカルボン酸塩が含まれる。これらの塩は、例えば、ナトリウムおよびカリウムなどのアルカリ金属、カルシウムおよびマグネシウムなどのアルカリ土類金属、アルミニウムを含むⅢⅢⅢA族の軽金属、ならびにトリエチルアミン、プロカイン、ジベンジルアミン、1-エテンアミン、N,N'-ジベンジルエチレンジアミン、ジヒドロアピエチルアミンおよびN-アルキルピペリジンを含む、トリアルキルアミンなどの、有機の第一級、第二級、および第三級アミンを含む。

#### 【0020】

本明細書中で使用されている用語「薬学的に許容される担体」は、活性化化合物または患者と逆に反応を起こさない、不活性で非毒性の固体または液体の充填剤材料、希釈剤材料またはカプセル化材料を意味する。好ましい液体担体はこの分野ではよく知られており、例えば、滅菌水、生理食塩水、デキストロース水溶液、糖の溶液、エタノール、グリコールおよびオイル（石油起源、動物起源、植物起源または合成起源のものを含み、例えば、ピーナッツ油、ダイズ油およびミネラルオイル）などである。

#### 【0021】

本発明による配合物は、非経口投与に関して典型的な従来の非毒性の薬学的に許容される担体、希釈剤、補助剤およびビヒクルを含有する単位用量物として投与され得る。

#### 【0022】

用語「非経口」は、本明細書中では、皮下、静脈内、動脈内および気管内への注射技術および注入技術を含む。また、経口投与および局所適用などの他の投与方法も好適である。非経口用の組成物および配合物は、最も好ましくは知られている手法により、ポーラス剤の形態でまたは一定の注入物として静脈内投与される。経口投与される錠剤およびカプセル剤は、結合剤、充填剤、希釈剤、錠剤化剤、滑沢剤、崩壊剤および湿潤化剤などの従来の賦形剤を含有する。錠剤は、この

分野でよく知られている方法に従ってコーティングされ得る。

【0023】

経口用の液体調製物は、水性または油状の懸濁物、溶液、エマルション、シロップまたはエリキシル剤の形態であり得るか、あるいは使用前に水または他の好適なビヒクルで再構成される乾燥製剤として提供され得る。そのような液体調製物は、懸濁剤、乳化剤、非水性ビヒクルおよび保存剤のような従来の添加剤を含有させることができる。

【0024】

局所適用剤は、水性または油状の懸濁物、溶液、エマルション、ゼリー、または好ましくはエマルション軟膏の形態であり得る。

【0025】

本発明による単位用量物は、本発明によるタンパク質の1日必要量、あるいは所望の用量を構成するその部分分割量を含有することができる。特定の患者（ヒトを含む哺乳動物）に対する最適な治療的に受け入れられる投薬量および投薬割合は、用いられる特定の活性物質の活性、年齢、体重、全身の健康状態、性別、食事、投与時間および投与経路、クリアランス速度、処置目的（すなわち、治療または予防）、ならびに処置される血栓症的疾患の性質、抗血小板活性または抗凝固活性などの様々な要因に依存する。

【0026】

従って、(in vivo) 処置される患者で抗凝固剤として有用な組成物および配合物において、本発明のポリペプチドの薬学的に効果的な日用量は、約0.01 mg/kg体重と100 mg/kg体重との間であり、好ましくは約0.1 mg/kg体重と10 mg/kg体重との間である。適用形態に従って、1回の単回用量物は、0.5 mgと10 mgとの間のコラーゲン阻害剤を含有することができる。体外の血液において抗凝固作用を達成するためには、本発明のペプチドの薬学的に効果的な量は、0.2 mg/1体外血液と150 mg/1体外血液との間であり、好ましくは1 mg/1体外血液と20 mg/1体外血液との間である。

【0027】

( 図面の簡単な説明 )

( 図 1 )

G P V I のタンパク質配列 ( 1 文字表記 ) を示す図である。

【 0 0 2 8 】

図 1 a : リーダー配列

図 1 b : 成熟タンパク質

オープンリーディングフレーム : 3 3 9 アミノ酸

アステリクス : グリコシル化部位

二重下線部 : 膜貫通ドメイン

下線部 : 配列決定されたペプチド

( 図 2 )

1 0 1 7 b p のオープンリーディングフレームならびに 3 ' 領域および 5 ' 領域を含む G P V I ヌクレオチド配列 ( 総数 : 1 2 4 9 b p ) を示す図である。

【 0 0 2 9 】

( 発明の詳細な説明 )

遺伝暗号における最も低い縮重度を示す 7 アミノ酸の 2 つの配列を、P C R によって G P V I の c D N A の一部を増幅するための D N A プライマーを合成するために選んだ。タンパク質内の両ペプチドの位置は全く不明であったので、そのそれぞれについて、1 つのセンスと 1 つのアンチセンスの 2 つの縮重プライマーを調製した。これらのプライマーを使用して、ヒト骨髄ライブラリーを増幅した。配列 P A M K R S L をコードするセンスプライマー 5 ' T Y A T H C C N G C N A T G A A R M G 3 ' と、D Q F A L Y K に対応するアンチセンスプライマー 5 ' T T R T A N A R N G C R A A Y T G R T C 3 ' との組合せにより、2 2 1 b p の D N A フラグメントが増幅された。選択されたペプチドに加えて、増幅された D N A は、L y s C / A s p N ペプチドの D Q L E L V A T G V F A K P S L S A Q P G P A V S S をコードした。これにより、この配列は G P V I の c D N A に明らかに連結された。

【 0 0 3 0 】

この 2 2 1 b p の D N A フラグメントを用いて骨髄ライブラリーから 6 0 0 .

000 p f u をスクリーニングすることにより、4 個の陽性 p f u が得られた。3 つは、制限酵素 S a l I または E c o R I で切断しても 1 3 5 0 b p の挿入断片を有し、I g G スーパーファミリーに属した。4 個目は、S a l I 消化による 4 . 6 k b の挿入断片を有し、E c o R I で処理したときにそれぞれ 2 3 0 0 b p および 1 3 0 0 b p の 2 つのフラグメントをもたらした。その D N A は、G P V I のアミノ酸配列決定に由来する 1 0 個のペプチドに対する配列をコードしていたが、アミノ末端に達しないところで停止していた。開始メチオニンまたはリーダー配列を見出すことができなかったが、A l u 配列で終了する、以前に配列決定された非リーディングフレーム D N A の 2 0 0 0 b p 以上が存在していた。5 ' 末端 R A C E 実験を、それらのペプチドの配列によって裏付けられた G P V I 配列の一部分内に位置するプライマーを用いて血小板のポリ A R N A に対して行った。4 番目のクローンの配列における 2 7 8 b p を含む 3 4 8 b p のフラグメント、および最初のメチオニンを含む 1 4 アミノ酸に対応する 1 9 8 7 b p に由来する新しい 7 0 b p が見出され、その後、確立された G P V I 配列に達した。従って、合計で 1 2 4 9 b p、すなわち、開始コドンの上流の 2 5 b p の 5 ' 配列、リーダー配列を含み、3 3 9 アミノ酸を有するタンパク質をコードする 1 0 1 7 b p のオープンリーディングフレーム、および停止コドンを含む 2 0 7 b p の 3 ' 領域を含有する c D N A を配列決定することができた。

#### 【0031】

血小板 G P V I をコードする c D N A が、不足する 5 ' 配列を補充するための血小板 m R N A を用いた R A C E を使用して、ヒト骨髄の c D N A ライブラリーからクローン化され、そして配列決定された。1 0 1 7 b p のオープンリーディングフレームは 3 3 9 個のアミノ酸をコードし、非翻訳 3 ' 領域を有する。アミノ酸配列の疎水性分析により、2 つの推定的な膜貫通ドメイン、推定的な 2 0 アミノ酸シグナル配列、および成熟タンパク質の残基 2 4 7 と残基 2 6 5 との間の 1 9 アミノ酸ドメインが存在することが明らかにされた。配列およびそのアミノ酸翻訳を図 2 および図 1 に示す。G e n B a n k の検索において見出された最も類似する分子のアミノ酸配列と比較することにより、G P V I は免疫グロブリンスーパーファミリーに属すること、およびその細胞外ドメインは、2 つのジスル

フィド架橋により形成された2つのIgC2ドメインループを含有することが明瞭にされる。GPVIは、N末端を外側に有する膜横断タンパク質クラス分子であり、膜を1回横断する。最も近縁の分子は、阻害タイプおよび活性化タイプの両方を含有するナチュラルキラー受容体クラスに属する。GPVIは、その機能によるだけでなく、阻害クラスとは異なり、ITIM配列をその細胞質ドメインに含有しないために活性化サブクラスに属することは明らかである。GPVIは、リン酸化に関与し得るチロシン残基を1つも含有しない。このドメインには数個のトレオニン残基およびセリン残基が存在するが、それらは、キナーゼのコンセンサス配列に対する基準を何ら満たさない。NK受容体の活性化クラスと同様に、GPVIは、Fcサブユニットとの複合体形成に関与する膜横断ドメインの3番目のアミノ酸としてアルギニン残基を含有する。細胞質ドメインは、このファミリーの他のメンバーの細胞質ドメインに対する(膜のすぐ下流の領域における)わずかな類似性のみを示す51個のアミノ酸を含有する。このことは、GPVIにおけるこのドメインは、それ以外のファミリーメンバーとは異なるタイプの細胞質分子と会合し得ることを示唆している。GPVIは、1個の推定的なN-グリコシル化部位をAsn69に含有するだけである。しかし、Igドメインのシートが終了した後の膜のすぐ上流のドメインは、GPIbおよびGPVにおいて見出されているようなO-グリコシル化部位を提供し得るトレオニン残基およびセリン残基が多い。このO-グリコシル化の主要な機能は、その嵩張ったりリガンドとの相互作用を容易にするために血小板表面から十分に広がった受容体構造体を提供することであると考えられる。GPVIはシアロ糖タンパク質としてより以前には明らかにされていたので、理論的なアミノ酸質量(37kDa)とゲル電気泳動で決定された質量(65kDa、還元)との分子量の差は、このグリコシル化のためであるに違いない。

#### 【0032】

この2つのドメインタイプのナチュラルキラー受容体の構造が、X線結晶学研究によって明らかにされ、そして2つのIgドメインが、ひじ部の外側に位置するペプチド保有HLA抗原の受容体部位とともに鋭角を形成していることが示された。HLAペプチド結合部位の構造をコラーゲンの構造と直接比較することに

より、それが含有するHLA結合部位およびペプチドの多数の -らせん構造がコラーゲンの三重らせん構造に非常に類似しているため、直ちに、なぜこれらの受容体が共通の起源を有するかが示唆される。ナチュラルキラー受容体は、ナチュラルキラー細胞が調べている細胞における2つの離れたHLA部位を認識する2つの受容体による二量体化機構によって作用することが推定される。おそらく、この二量体化は、受容体のクラスに依存した活性化機構または失活化機構の一部である。GPVIの場合、2つのGPVI分子が1つのFc<sub>γ</sub>と会合する可能性があり得る。これは、Fc<sub>γ</sub>ダイマーの各モノマーが認識部位を有するからである。しかしながら、化学量論は未だ知られておらず、そしてコラーゲンの構造、GPVIおよびコンプレキシンを介して作用するコラーゲン様ペプチドとの構造に基づいて、シグナルの強さが、一緒にクラスター化しているGPVI/Fc<sub>γ</sub>複合体の数に関連することは確からしい。このIgファミリーに属する他の血小板受容体には、ICAM-2(CD102)およびPECAM(CD31)が含まれる。

#### 【0033】

請求された発明に関連して直接的に明細書中に記載されていない微生物、細胞株、発現システム、発現宿主、プラスミド、プロモーター、耐性マーカー、複製起源、ベクターの制限部位あるいは他のフラグメントまたは部分は、すべて市販されているか、そうでなければ、一般に手に入れることができる。他の示唆が与えられていない場合、それらは例として使用されるだけであり、本発明に関して必須ではなく、従って他の好適なツールおよび生物学的材料によりそれぞれ置き換えることができる。

#### 【0034】

本発明により必須である技術は、下記および上記に詳しく記載されている。詳しく記載されていない他の技術は、当業者によく知られている、知られた標準的な方法に対応しているか、あるいは引用された参考文献および特許明細書に、そして標準的な文献(例えば、Sambrook他、1989、Molecular Cloning: A Laboratory Manual、第2版、Cold Spring Harbor; Harlow、Lane、1988、An

tibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor) にさらに詳しく記載されている。

【0035】

(実施例)

実施例1: 材料 - プロテインA - セファロース、ペルオキシダーゼ結合ヤギ抗マウス抗体およびペルオキシダーゼ結合ヤギ抗ウサギ抗体、ウシ血清アルブミン、*Crotalus durissus terrificus* 毒液、コムギ胚芽凝集素 (wheat germ agglutinin; WGA)、N-ヒドロキシスクシンイミジルクロロホルマート活性化架橋4%ビーズ状アガロースならびにトリトンX-114をSigma Chemicals Co. (St Louis, MO) から入手した。オクタノイル-N-メチルグルカミド (ONMG) およびノナノイル-N-メチルグルカミド (NNMG) をOxyl Chemie (Bobingen, ドイツ) から入手した。

【0036】

実施例2: 血小板からのGPVIの単離 - 膜糖タンパク質を、以前に記載されたようにして血小板から単離した。簡単に記載すると、血小板(40の軟膜に由来)を洗浄し、プロテアーゼ阻害剤の存在下、2%トリトンX-114中で溶解した。トリトンX-114および水相を分離し、界面活性剤相を、セファロース4Bに結合させたコムギ胚芽凝集素のカラムに負荷した。血小板糖タンパク質を、10mM Tris HCl (pH7.4)、30mM NaCl、0.2%オクタノイル-N-メチルグルカミド (ONMG) および2%N-アセチルグルコサミンにおいて溶出した。透析および濃縮を行った後、糖タンパク質の溶液を、N-ヒドロキシスクシンアミジル-p-ニトロフェニルクロロホルマート活性化架橋4%ビーズ状アガロースに結合させたコンブルキシンのカラム(1mg/ml)に負荷した。カラムを、4容量の10mM Tris HCl (pH7.4)、30mM NaCl、0.2%ノナノイル-N-メチルグルカミド (NNMG) で洗浄し、次いで4容量の10mM Tris HCl (pH7.4)、30mM NaClおよび2%NNMGで洗浄した。GPVIを、0.08%SDSを含む10mMのTris/HCl (pH7.4) で溶出した。溶液を濃縮し

、491型Prep Cell (BioRad、CA)を使用する8.5%ポリアクリルアミドの調製用ゲルに負荷した。調製用電気泳動を製造者の説明書に従って非還元条件下で行った。GPVIは65 kDaの単一バンドとして溶出した。この画分をまとめ、Centricon-30 (Amicon、Beverly、MA)で濃縮し、10mM Tris/HCl (pH7.4)および0.1%ONMGに再懸濁した。

#### 【0037】

実施例3：GPVIのアミノ酸分析 - GPVIをエンドプロテイナーゼLysCおよびエンドプロテイナーゼAspN (Boehringer Mannheim、ドイツ)で消化した。得られた10個のペプチドを逆相HPLCで分離し、120A型オンラインフェニルチオヒダントインアミノ酸分析計を備えたApplied Biosystem社の477A型パルス液相タンパク質シーケンサで配列決定した。

#### 【0038】

実施例4：GPVIの一部をコードする221bpフラグメントのgt11cDNAライブラリーからの増幅 -

ヒト骨髄ライブラリー (Clontech、Palo Alto、CA)に由来するサンプル ( $10^{10}$  pfu) (プラーク形成単位)を、4つの縮重プライマーの2つの組合せを使用して増幅した。プライマーの最終濃度は2  $\mu$ Mであり、dNTP濃度は200  $\mu$ Mであり、2U/100  $\mu$ l反応物のAmpli Taq Gold (Perkin Elmer、Rotkreuz、スイス)を使用した。PCR条件は、37 °Cでの5サイクル、その後、44 °Cでの30サイクルであった。5' TYATHCCNGCNATGAARMG3'のセンス19merおよび5' TTRTANARNGCRAAYTGRTC3'のアンチセンス20merにより、221bpのフラグメントが増幅され、これをBluescript KS<sup>+</sup> (Stratagene、La Jolla、CA)にサブクローン化し、T7 Sequenase kit (Amersham、スイス)を使用して配列決定した。

#### 【0039】

実施例5：221bpのGPVIプローブを用いたgt11cDNAライブラリーのスクリーニング - 221bpのフラグメントをプラスミドから切断し、清浄化し、High Prime Labelling kit (Boehringer Mannheim、スイス)を使用して<sup>32</sup>P-ATP(20MBq/50μl、Hartmann Analytik、Braunschweig、ドイツ)で標識した。ヒト骨髄ライブラリーを製造者の説明書に従ってスクリーニングした。陽性ファージを増殖させ、そのDNAを単離し、EcoRI部位またはSalI部位のいずれかを使用してBlueScriptにサブクローン化し、配列決定した。配列決定を、RACEのABSシステムを用いて行った。血小板のポリA RNAを、以前に記載されたようにして調製した(Power他、Cytokine、7、479~482、1995)。逆転写(30μl)を、5μgのポリA RNAを、プライマー5'TGAATGAGACGGTCAGTTCAGC3'(20μM)、dNTP(1mM)、RNAsin(40U)、1X AMV緩衝液、および20UのAMV逆転写酵素とともに使用して45℃で20分間行い、その後、52℃で20分間行った。反応混合物を2μlの6N NaOHで65℃において30分間処理し、2μlの6N酢酸で中和して、Centricon30(Amicon)で濃縮した。アンカーをAptesおよびSiebertのプロトコル(BioTechniques、15:890~893、1993)に従って第1鎖DNAに連結した。ネスティッドPCRを、アンカーに相補的なプライマーおよびプライマー5'TTGTACAGAGCAAATTGGTC3'を使用して行い(35サイクル、55℃)、その後、プライマー5'GACCAGAGGCTTCCGTTCTG3'を使用して行った(53℃で30サイクル)。最も大きなバンド(350bp)を、それよりも小さいバンドからアガロース電気泳動で分離し、BlueScriptにサブクローン化して、配列決定した。

#### 【0040】

実施例6：抗GPVIFabおよびF(ab')<sub>2</sub>の調製 - ヒトGPVIに対するポリクローナル抗血清をウサギにおいて生成させた。IgGを、ウサギ抗GPVI抗血清から、記載されたようにして精製した。Fabフラグメントを生成

させるための固定化パivain (Pierce) によるIgGの消化を供給者の標準的なプロトコルに従って行った。Fabフラグメントを、固定化プロテインA (Sigma) カラムを使用して未消化IgGおよびFcフラグメントから分離した。素通り部分を透析チューブに移し、固体のポリエチレングリコール20,000を使用して濃縮し、20mMのHepes、140mMのNaCl、4mMのKCl、pH7.4に対して徹底的に透析し、そして使用するまで4℃で保存した。F(ab')<sub>2</sub>フラグメントを、0.5M酢酸塩緩衝液(pH4.0)中における37℃で18時間にわたるIgGのペプシン消化(1:50の酵素対基質比(w/w))によって調製した。pHを希NaOHで7.4に調節し、サンプルを20mMリン酸塩(pH7.4)に対して透析し、その後、F(ab')<sub>2</sub>フラグメントを、プロテインAクロマトグラフィーを使用して未消化IgGおよびFcフラグメントから分離した。素通り部分を透析チューブに移し、固体のポリエチレングリコール20,000を使用して濃縮し、20mMのHepes、140mMのNaCl、4mMのKCl、pH7.4に対して徹底的に透析し、小分けして-20℃で保存した。洗浄した血小板をトリトンX-114中で溶解し、相分離を可溶物に対して行い、その後、トリトンX-114相と会合した膜糖タンパク質を、以前に記載されたようにしてコムギ胚芽凝集素-セファロース4Bでのアフィニティークロマトグラフィーで分離した。GPVIは血小板膜糖タンパク質プールの非常に小さな画分を示すので、本発明者らは、この受容体を分離するために、ヘビC型レクチンのコンブルキシンの特異性を使用した。セファロース4Bに結合させたコンブルキシンのアフィニティークロマトグラフィーにより、65kDaのタンパク質が主生成物として得られた。しかし、それよりも大きなMrおよびそれよりも小さなMrの両方の特徴付けられない物質がGPVIと同時に溶出し、これらはカラムの徹底的な洗浄で除去できなかった。8.5%ポリアクリルアミドでの調製用ゲル電気泳動を精製の最終ステップとして加えた。GPVIを含有する画分をまとめ、これは再分析で単一バンドを示した。精製GPVIを、コラーゲンによる血小板凝集を阻止するその能力について試験した。わずかな阻害作用が、GPVI溶液の一部を血小板懸濁液に加えたときに認められた。しかし、混合物を血小板懸濁物に加える前にGPVIをコラ

ーゲンとブレインキュベーションすることによって、凝集は用量依存的に阻害された。これらの血小板は、新たなコラーゲンが添加されたときにもやはり凝集した。非還元条件下において、この単離されたタンパク質は62 kDaのMrを有し、還元条件下ではわずかに大きなMr(65 kDa)に変化した。GPVIのアミノ末端はブロックされていることが見出されたので、タンパク質を、配列が得られる4個のペプチドおよび6個のペプチドをそれぞれもたらす酵素LysCおよび酵素LysC/AspNで消化した。これらのペプチドをC4カラムでの逆相HPLCで分離し、エドマン法を使用して配列決定した。これらのペプチドのアミノ酸配列には、翻訳されたcDNA配列(図1)において下線が引かれている。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Merck Patent GmbH

5 <120> Recombinant platelet collagen receptor glycoprotein VI  
and its pharmaceutical use

<130> GlycoproteinVI-Merck

10 <140>  
<141>  
<160> 1

15 <170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1  
<211> 1249  
<212> DNA

20 <213> Homo sapiens

<220>  
<221> CDS  
<222> (26)..(85)

25 <223> Leader sequence

<220>  
<221> CDS  
<222> (86)..(1042)

30 <223> mature GPVI protein

<400> 1  
gagctcagga cagggtgag gaacc atg tct cca tcc cgg acc gcc ctc ttc 52  
Met Ser Pro Ser Pro Thr Ala Leu Phe  
35 1 5

tgt ctt ggg ctg tgt ctg ggg cgt gtg cca gcg cag agt gga ccg ctc 100  
Cys Leu Gly Leu Cys Leu Gly Arg Val Pro Ala Gln Ser Gly Pro Leu  
10 15 20 25

40 ccc aag ccc tcc ctc cag gct ctg ccc agc tcc ctg gtg ccc ctg gag 148  
Pro Lys Pro Ser Leu Gln Ala Leu Pro Ser Ser Leu Val Pro Leu Glu  
30 35 40

45 aag cca gtg acc ctc cgg tgc cag gga cct ccg ggc gtg gac ctg tac 196  
Lys Pro Val Thr Leu Arg Cys Gln Gly Pro Pro Gly Val Asp Leu Tyr  
45 50 55

50 cgc ctg gag aag ctg agt tcc agc agg tac cag gat cag gca gtc ctc 244  
Arg Leu Glu Lys Leu Ser Ser Ser Arg Tyr Gln Asp Gln Ala Val Leu  
60 65 70

55 ttc atc ccg gcc atg aag aga agt ctg gct gga cgc tac cgc tgc tcc 292  
Phe Ile Pro Ala Met Lys Arg Ser Leu Ala Gly Arg Tyr Arg Cys Ser  
75 80 85

60 tac cag aac gga agc ctc tgg tcc ctg ccc agc gac cag ctg gag ctc 340  
Tyr Gln Asn Gly Ser Leu Trp Ser Leu Pro Ser Asp Gln Leu Glu Leu  
90 95 100 105

|    |   |      |
|----|---|------|
|    | gtt gcc acg gga gtt ttt gcc aaa ccc tcg ctc tca gcc cag ccc ggc | 388  |
|    | Val Ala Thr Gly Val Phe Ala Lys Pro Ser Leu Ser Ala Gln Pro Gly |      |
|    | 110 115 120   |      |
| 5  | ccg gcg gtg tcg tca gga ggg gac gta acc cta cag tgt cag act cgg | 436  |
|    | Pro Ala Val Ser Ser Gly Gly Asp Val Thr Leu Gln Cys Gln Thr Arg |      |
|    | 125 130 135   |      |
| 10 | tat gcc ttt gac caa ttt gct ctg tac aag gaa ggg gac cct gcg ccc | 484  |
|    | Tyr Gly Phe Asp Gln Phe Ala Leu Tyr Lys Glu Gly Asp Pro Ala Pro |      |
|    | 140 145 150   |      |
| 15 | tac aag aat ccc gag aga tgg tac cgg gct agt ttc ccc atc atc acg | 532  |
|    | Tyr Lys Asn Pro Glu Arg Trp Tyr Arg Ala Ser Phe Pro Ile Ile Thr |      |
|    | 155 160 165   |      |
| 20 | gtg acc gcc gcc cac agc gga acc tac cga tgc tac agc ttc tcc agc | 580  |
|    | Val Thr Ala Ala His Ser Gly Thr Tyr Arg Cys Tyr Ser Phe Ser Ser |      |
|    | 170 175 180 185   |      |
| 25 | agg gac cca tac ctg tgg tcg gcc ccc agc gac ccc ctg gag ctt gtg | 628  |
|    | Arg Asp Pro Tyr Leu Trp Ser Ala Pro Ser Asp Pro Leu Glu Leu Val |      |
|    | 190 195 200   |      |
| 30 | gtc aca gga acc tct gtg acc ccc agc cgg tta cca aca gaa cca cct | 676  |
|    | Val Thr Gly Thr Ser Val Thr Pro Ser Arg Leu Pro Thr Glu Pro Pro |      |
|    | 205 210 215   |      |
| 35 | tcc tcg gta gca gaa ttc tca gaa gcc acc gct gaa ctg acc gtc tca | 724  |
|    | Ser Ser Val Ala Glu Phe Ser Glu Ala Thr Ala Glu Leu Thr Val Ser |      |
|    | 220 225 230   |      |
| 40 | ttc aca aac aaa gtc ttc aca act gag act tct agg agt atc acc acc | 772  |
|    | Phe Thr Asn Lys Val Phe Thr Thr Glu Thr Ser Arg Ser Ile Thr Thr |      |
|    | 235 240 245   |      |
| 45 | agt cca aag gag tca gac tct cca gct ggt cct gcc cgc cag tac tac | 820  |
|    | Ser Pro Lys Glu Ser Asp Ser Pro Ala Gly Pro Ala Arg Gln Tyr Tyr |      |
|    | 250 255 260 265   |      |
| 50 | acc aag ggc aac ctg gtc cgg ata tgc ctc ggg gct gtg atc cta ata | 868  |
|    | Thr Lys Gly Asn Leu Val Arg Ile Cys Leu Gly Ala Val Ile Leu Ile |      |
|    | 270 275 280   |      |
| 55 | atc ctg gcg ggg ttt ctg gca gag gac tgg cac agc cgg agg aag cgc | 916  |
|    | Ile Leu Ala Gly Phe Leu Ala Glu Asp Trp His Ser Arg Arg Lys Arg |      |
|    | 285 290 295   |      |
| 60 | ctg cgg cac agg ggc agg gct gtg cag agg ccg ctt ccg ccc ctg ccg | 964  |
|    | Leu Arg His Arg Gly Arg Ala Val Gln Arg Pro Leu Pro Pro Leu Pro |      |
|    | 300 305 310   |      |
| 65 | ccc ctc ccg cag acc cgg aaa tca cac ggg ggt cag gat gga ggc cga | 1012 |
|    | Pro Leu Pro Gln Thr Arg Lys Ser His Gly Gly Gln Asp Gly Gly Arg |      |
|    | 315 320 325   |      |
| 70 | cag gat gtt cac agc cgc ggg tta tgt tca tgaccgctga accccaggca   | 1062 |
|    | Gln Asp Val His Ser Arg Gly Leu Cys Ser                         |      |
|    | 330 335   |      |

cggtcgtatc caagggaggg atcatggcat gggagggcgcac tcaaagactg gcgtgtgtgg 1122  
 agcgtggaag caggagggca gaggctacag ctgtggaaac gaggccatgc tgctcctcc 1182  
 5 tgggtttcca tcagggagcc gttcggccag tgtctgtctg tctgtctgcc tctctgtctg 1242  
 agggcac 1249

10 <210> 2  
 <211> 20  
 <212> PRT  
 <213> Homo sapiens

15 <400> 2  
 Met Ser Pro Ser Pro Thr Ala Leu Phe Cys Leu Gly Leu Cys Leu Gly  
 1 5 10 15

20 Arg Val Pro Ala  
 20

25 <210> 3  
 <211> 319  
 <212> PRT  
 <213> Homo sapiens

30 <400> 3  
 Gln Ser Gly Pro Leu Pro Lys Pro Ser Leu Gln Ala Leu Pro Ser Ser  
 1 5 10 15

Leu Val Pro Leu Glu Lys Pro Val Thr Leu Arg Cys Gln Gly Pro Pro  
 20 25 30

35 Gly Val Asp Leu Tyr Arg Leu Glu Lys Leu Ser Ser Ser Arg Tyr Gln  
 35 40 45

Asp Gln Ala Val Leu Phe Ile Pro Ala Met Lys Arg Ser Leu Ala Gly  
 50 55 60

40 Arg Tyr Arg Cys Ser Tyr Gln Asn Gly Ser Leu Trp Ser Leu Pro Ser  
 65 70 75 80

45 Asp Gln Leu Glu Leu Val Ala Thr Gly Val Phe Ala Lys Pro Ser Leu  
 85 90 95

Ser Ala Gln Pro Gly Pro Ala Val Ser Ser Gly Gly Asp Val Thr Leu  
 100 105 110

50 Gln Cys Gln Thr Arg Tyr Gly Phe Asp Gln Phe Ala Leu Tyr Lys Glu  
 115 120 125

Gly Asp Pro Ala Pro Tyr Lys Asn Pro Glu Arg Trp Tyr Arg Ala Ser  
 130 135 140

55 Phe Pro Ile Ile Thr Val Thr Ala Ala His Ser Gly Thr Tyr Arg Cys  
 145 150 155 160

60 Tyr Ser Phe Ser Ser Arg Asp Pro Tyr Leu Trp Ser Ala Pro Ser Asp  
 165 170 175



【図1】

**Figure 1.**(1a)

1 20  
 MSPSP~~TALFC~~ LGLCLGRVPA

(1b)

1  
 QSGPLPKPSL QALPSSLVPL EKPVTLCQG PPGVDLYRLE KLSSSRYQDQ (50)  
AVLFIPAMKR SLAGRYRCSY QN\*GSLWSLPS DQLELVATGV FAKPSLSAQP (100)  
GPAVSSGGDV TLQCQTRYGF DQFALYKEGD PAPYKNPERW YRASFPITV (150)  
 TAAHSGTYRC YSFSSRDPYL WSAPSDPLEL VVTGTSVTPS RLPTEPPSSV (200)  
 AEFSEATAEL TVSFTNKVFT TETSR~~SITTS~~ PKESDSPAGP ARQYYTKGNL (250)  
VRICLGAVIL IILAGFLAED WHSRRKRLRH RGRAVQRPLP PLPPLPQTRK (300)  
 SHGGQDGGRO DVHSRGLCS (319)

## 【图2】

Figure 2:

GAGCTCAGGA CAGGGCTGAG GAACCA**ATG**TTC TCCATCCCCG ACCGCCCTCT (50)  
 TCTGTCTTGG GCTGTGTCTG GGGCGTGTGC CAGCGCAGAG TGGACCGCTC (100)  
 CCCAAGCCCT CCCTCCAGGC TCTGCCCAGC TCCCTGGTGC CCCTGGAGAA  
 GCCAGTGACC CTCCGGTGCC AGGGACCTCC GGGCGTGGAC CTGTACCGCC (200)  
 TGGAGAAGCT GAGTTCCAGC AGGTACCAGG ATCAGGCAGT CCTCTTCATC  
 CCGGCCATGA AGAGAAGTCT GGCTGGACGC TACCGCTGCT CCTACCAGAA (300)  
 CGGAAGCCTC TGGTCCCTGC CCAGCGACCA GCTGGAGCTC GTTGCCACGG  
 GAGTTTTTGC CAAACCCTCG CTCTCAGCCC AGCCCCGCCC GGCGGTGTGC (400)  
 TCAGGAGGGG ACGTAACCCT ACAGTGTGAG ACTCGGTATG GCTTTGACCA  
 ATTTGCTCTG TACAAGGAAG GGGACCCTGC GCCCTACAAG AATCCCGAGA (500)  
 GATGGTACCG GGCTAGTTTC CCCATCATCA CGGTGACCGC CGCCACAGC  
 GGAACCTACC GATGCTACAG CTTCTCCAGC AGGGACCCAT ACCTGTGGTC (600)  
 GGCCCCCAGC GACCCCTGG AGCTTGTGGT CACAGGAACC TCTGTGACCC  
 CCAGCCGGTT ACCAACAGAA CCACCTTCCT CGGTAGCAGA ATTCTCAGAA (700)  
 GCCACCGCTG AACTGACCGT CTCATTCACA AACAAAGTCT TCACAAGTGA  
 GACTTCTAGG AGTATCACCA CCAGTCCAAA GGAGTCAGAC TCTCCAGCTG (800)  
 GTCTTGCCCG CCAGTACTAC ACCAAGGGCA ACCTGGTCCG GATATGCCTC  
 GGGGCTGTGA TCCTAATAAT CCTGGCGGGG TTTCTGGCAG AGGACTGGCA (900)  
 CAGCCGGAGG AAGCGCCTGC GGCACAGGGG CAGGGCTGTG CAGAGGCCGC  
 TTCCGCCCTT GCCGCCCTC CCGCAGACCC GGAAATCACA CGGGGGTCAG (1000)  
 GATGGAGGCC GACAGGATGT TCACAGCCGC GGGTTATGTT CAT**G**ACCGCT  
 GAACCCAGG CACGGTCGTA TCCAAGGGAG GGATCATGGC ATGGGAGGCG (1100)  
 ACTCAAAGAC TGGCGTGTGT GGAGCGTGGG AGCAGGAGGG CAGAGGCTAC  
 AGCTGTGGAA ACGAGGCCAT GCTGCCTCCT CCTGGTGTTC CATCAGGGAG (1200)  
 CCGTTCGGCC AGTGTCTGTC TGTCTGTCTG CCTCTCTGTC TGAGGGCAC (1249)

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | International Application No<br>PCT/EP 00/03683   |
| <b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b>  |  |   |
| IPC 7 C12N15/12 C07K14/705 A61K38/17 G01N33/68  |  |   |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC   |  |   |
| <b>B. FIELDS SEARCHED</b>   |  |   |
| Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>IPC 7 C07K C12N  |  |   |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched   |  |   |
| Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)<br>EPO-Internal, BIOSIS, STRAND, WPI Data, CHEM ABS Data   |  |   |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>   |  |   |
| Category *  | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No.   |
| X   | GIBBINS JONATHAN M ET AL: "Glycoprotein VI is the collagen receptor in platelets which underlies tyrosine phosphorylation of the Fc receptor gamma-chain."<br>FEBS LETTERS,<br>vol. 413, no. 2, 1997, pages 255-259,<br>XP002143941<br>ISSN: 0014-5793 | 1   |
| A   | the whole document<br>---<br>-/--  | 2-9   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.  |
| * Special categories of cited documents:  |  |   |
| "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br>"E" earlier document but published on or after the international filing date<br>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)<br>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed |  | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention<br>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone<br>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.<br>"&" document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search<br><br>1 August 2000  |  | Date of mailing of the international search report<br><br>21/08/2000  |
| Name and mailing address of the ISA<br>European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo.nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016  |  | Authorized officer<br><br>Gurdjian, D   |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 00/03683

| C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Category *   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  | Relevant to claim No. |
| X  | JANDROT-PERRUS MARTINE ET AL: "Adhesion and activation of human platelets induced by convulxin involve glycoprotein VI and integrin alpha-2-beta-1."<br>JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY,<br>vol. 272, no. 43, 1997, pages 27035-27041,<br>XP002143942<br>ISSN: 0021-9258  | 1                     |
| A  | the whole document  | 2-9                   |
| X  | GIBBINS JONATHAN M ET AL: "The p85 subunit of phosphatidylinositol 3-kinase associated with the Fc receptor gamma-chain and linker for activator of T cells (LAT) in platelets stimulated by collagen and convulxin."<br>JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY,<br>vol. 273, no. 51,<br>18 December 1998 (1998-12-18), pages<br>34437-34443, XP002143943<br>ISSN: 0021-9258 | 1                     |
| A  | the whole document  | 2-9                   |
| L  | WO 95 11259 A (THROMBOSIS RES INST ;JEHANLI AHMED MOHAMMED TAKI (GB); PATEL GEETA) 27 April 1995 (1995-04-27)<br>abstract; claims 1-25  | 1                     |
| P,X  | CLEMETSON JEANNINE M ET AL: "The platelet collagen receptor glycoprotein VI is a member of the immunoglobulin superfamily closely related to FcalphaR and the natural killer receptors."<br>JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY,<br>vol. 274, no. 41,<br>8 October 1999 (1999-10-08), pages<br>29019-29024, XP002143944<br>ISSN: 0021-9258                                | 1-5                   |
| P,X  | MIURA Y: "Platelet glycoprotein VI"<br>EMBL DATABASE ; ACCESSION NUMBER<br>AB035073,<br>14 January 2000 (2000-01-14), XP002143945<br>the whole document   | 1-5                   |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No  
PCT/EP 00/03683

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
| NO 9511259 A                           | 27-04-1995       | AU 701576 B             | 04-02-1999       |
|  |                  | AU 7946594 A            | 08-05-1995       |
|  |                  | EP 0724599 A            | 07-08-1996       |
|  |                  | JP 9506863 T            | 08-07-1997       |
|  |                  | NZ 275492 A             | 27-05-1998       |
|  |                  | US 6001802 A            | 14-12-1999       |
|  |                  | US 5952304 A            | 14-09-1999       |

---

## フロントページの続き

| (51)Int.Cl. <sup>7</sup>        | 識別記号  | FI  | テ-マ-ト (参考)   |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| G 0 1 N 33/15<br>33/50<br>33/53 |   | G 0 1 N 33/53<br>C 1 2 N 15/00<br>A 6 1 K 37/02 | D<br>Z N A A |
| (81)指定国                         | E P ( A T , B E , C H , C Y ,<br>D E , D K , E S , F I , F R , G B , G R , I E , I<br>T , L U , M C , N L , P T , S E ) , O A ( B F , B J<br>, C F , C G , C I , C M , G A , G N , G W , M L ,<br>M R , N E , S N , T D , T G ) , A P ( G H , G M , K<br>E , L S , M W , S D , S L , S Z , T Z , U G , Z W<br>) , E A ( A M , A Z , B Y , K G , K Z , M D , R U ,<br>T J , T M ) , A E , A L , A M , A T , A U , A Z ,<br>B A , B B , B G , B R , B Y , C A , C H , C N , C<br>R , C U , C Z , D E , D K , D M , E E , E S , F I<br>, G B , G D , G E , G H , G M , H R , H U , I D ,<br>I L , I N , I S , J P , K E , K G , K P , K R , K<br>Z , L C , L K , L R , L S , L T , L U , L V , M A<br>, M D , M G , M K , M N , M W , M X , N O , N Z ,<br>P L , P T , R O , R U , S D , S E , S G , S I , S<br>K , S L , T J , T M , T R , T T , T Z , U A , U G<br>, U S , U Z , V N , Y U , Z A , Z W |   |              |
| (71)出願人                         | Frankfurter Str. 250,<br>D - 64293 Darmstadt, Fed<br>eral Republic of Ge<br>rmany   |   |              |
| (72)発明者                         | クレメトソン、ケネス、ジェイ。<br>スイス国 シーエイチ - 3065 ベルン フ<br>ルラクカー 29  |   |              |
| Fターム(参考)                        | 2G045 AA24 AA25 AA40 BA13 CA24<br>DA12 DA13 DA14 DA36 DA44<br>DA77 FA36 FA37 FB03 FB05<br>FB06 FB07<br>4B024 AA01 AA11 BA80 CA02 HA01<br>HA11<br>4C084 AA07 BA01 BA22 BA23 CA62<br>NA14 ZA36 ZA54<br>4H045 AA10 AA30 BA10 CA40 DA50<br>EA20 EA50  |   |              |

|             |   |         |            |
|-------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译)     | 重组血小板胶原受体糖蛋白VI及其药物用途  |         |            |
| 公开(公告)号     | <a href="#">JP2003515313A</a>   | 公开(公告)日 | 2003-05-07 |
| 申请号         | JP2000616343  | 申请日     | 2000-04-25 |
| 申请(专利权)人(译) | 默克专利GESELLSCHAFT手套Beshurenkuteru Hafutongu  |         |            |
| [标]发明人      | クレメトソンケネスジェイ  |         |            |
| 发明人         | クレメトソン、ケネス、ジェイ.   |         |            |
| IPC分类号      | G01N33/50 A61K38/00 A61K38/17 A61P7/02 A61P9/10 C07K14/705 C07K14/755 C12N15/09 C12N15/12 G01N15/00 G01N33/15 G01N33/53 G01N33/68 G01N33/86   |         |            |
| CPC分类号      | A61K38/00 C07K14/70503 C07K14/755 C07K16/2803 C07K2317/54 C07K2317/55 G01N33/86 G01N2015/0084 G01N2333/4728 G01N2333/78 G01N2500/02 G01N2800/222 C07K14/745 C07K16/28 C07K2317/20 C07K2317/76   |         |            |
| FI分类号       | A61P7/02 A61P9/10 C07K14/705 G01N33/15.Z G01N33/50.Z G01N33/53.D C12N15/00.ZNA.A A61K37/02  |         |            |
| F-TERM分类号   | 2G045/AA24 2G045/AA25 2G045/AA40 2G045/BA13 2G045/CA24 2G045/DA12 2G045/DA13 2G045/DA14 2G045/DA36 2G045/DA44 2G045/DA77 2G045/FA36 2G045/FA37 2G045/FB03 2G045/FB05 2G045/FB06 2G045/FB07 4B024/AA01 4B024/AA11 4B024/BA80 4B024/CA02 4B024/HA01 4B024/HA11 4C084/AA07 4C084/BA01 4C084/BA22 4C084/BA23 4C084/CA62 4C084/NA14 4C084/ZA36 4C084/ZA54 4H045/AA10 4H045/AA30 4H045/BA10 4H045/CA40 4H045/DA50 4H045/EA20 4H045/EA50 |         |            |
| 优先权         | 1999109094 1999-05-07 EP  |         |            |
| 其他公开文献      | JP5480457B2   |         |            |
| 外部链接        | <a href="#">Espacenet</a>   |         |            |

摘要(译)

本发明涉及糖蛋白VI ( GPVI ) , 其分离, 纯化和重组生产方法。特别地, 本发明涉及GPVI, 优选重组GPVI, 在治疗与血液凝固性疾病例如血栓性和心血管疾病直接或间接相关的疾病和病理事件中的用途。该细胞外重组蛋白还可用于建立筛选试验, 以发现潜在的膜结合GPVI抑制剂, 它们分别抑制血小板和血小板与胶原蛋白的结合。GPVI的变化可用于监测血小板衰老以及血栓形成和心血管疾病的暴露情况。

| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |  |
|---|--|--|
| Category*   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No.  |
| X   | GIBBINS JONATHAN M ET AL: "Glycoprotein VI is the collagen receptor in platelets which underlies tyrosine phosphorylation of the Fc receptor gamma-chain." FEBS LETTERS, Vol. 413, no. 2, 1997, pages 255-259, XP002143941 | 1  |
| A   | the whole document --- ---   | 2-9  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of list C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in seven.  |  |  |
| * Special categories of cited documents:<br>"A" documents defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br>"E" regular document for publication or after the international filing date<br>"L" documents which may throw doubt on priority, distinctness or which is cited to establish the prior art status of an invention or other special reason (as specified)<br>"O" document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br>"P" document published prior to the international search date but later than the priority date claimed |  |  |
| Date of the initial completion of the international search: <b>1 August 2000</b>  |  |  |
| Name and mailing address of the ISA<br>European Patent Office, P.O. Box 1818 Patentlaan 2<br>NL - 2200 PH Rijswijk<br>Tel (+31 - 70) 546-2560, Tx. 31 651 6900<br>Fax (+31 - 70) 546-3016   |  | Date of mailing of the international search report: <b>21/08/2000</b><br>Authorized officer:<br><b>Gurdjian, D</b> |