(19)日本国特許庁 (J P)

(12) **公表特許公報** (A) (11)特許出願公表番号

特表2003 - 517295

(P2003 - 517295A)

(43)公表日 平成15年5月27日(2003.5.27)

(51) Int. Cl ⁷	識別記号	F I	テ-マコード* (参考)
C 1 2 N 15/09	ZNA	A 6 1 K 47/48	4 B 0 2 4
// A 6 1 K 38/00		A 6 1 P 25/00	4 C 0 7 6
47/48		31/00	4 C 0 8 4
A 6 1 P 25/00		35/00	
31/00		35/04	

審査請求 未請求 予備審査請求 (全194数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 513963(P2001 - 513963)

(86) (22)出願日 平成12年7月26日(2000.7.26)

(85)翻訳文提出日 平成14年1月29日(2002.1.29)

(86)国際出願番号 PCT/US00/20397

(87)国際公開番号 W001/009156

(87)国際公開日 平成13年2月8日(2001.2.8)

(31)優先権主張番号 09/363,939

(32)優先日 平成11年7月29日(1999.7.29)

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 ギリード・サイエンシズ・インコーポレーテッド
アメリカ合衆国カリフォルニア州94404, フォスター・シティ, レークサイド・ドライブ 333

(72)発明者 パグラティス, ニコス
アメリカ合衆国コロラド州80301, ボールダー, ノース・オーチャード・クリーク・サークル 5813

(74)代理人 弁理士 社本 一夫 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 高アフィニティー T G F 核酸リガンドと阻害剤

(57)【要約】

T G F 2 に対する高アフィニティー核酸リガンドの同定及び製造の方法が記載される。本発明に含まれるのは、S E L E X法により同定される T G F 2 に特異的な R N A リガンドである。さらに含まれるのは、T G F 2 のその受容体との相互作用を阻害する R N A リガンドである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 精製及び単離された、TGF β 2に対する非天然のRNAリガンドであって、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9（配列番号21～108及び配列番号128～193）に示される配列からなる群から選択される、前記リガンド。

【請求項2】 TGF β 2核酸リガンドと、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物から構成される複合体。

【請求項3】 前記リガンドと前記非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物との間にリンカーをさらに含んでなる、請求項2に記載の複合体。

【請求項4】 前記非免疫原性の高分子量化合物がポリアルキレングリコールである、請求項2に記載の複合体。

【請求項5】 前記ポリアルキレングリコールがポリエチレングリコール（PEG）である、請求項4に記載の複合体。

【請求項6】 前記PEGが約10～80kの分子量を有する、請求項5に記載の複合体。

【請求項7】 前記PEGが約20～45kの分子量を有する、請求項6に記載の複合体。

【請求項8】 前記複合体が

【化1】

リガンド＝

rGrGrArGrGfUfUrAfUfUrAfCrArGrArGfUfCfUrGfUfUrArGfCfUrGfUfArfCfUfCfC-3'-3'-dT

（配列番号115）であって、rGが2'OHGであり、rAが2'OH Aであり、fUが2'FUであり、及びfCが2'FCである、請求項7に記載の

複合体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

発明の技術分野

本明細書に記載されるのは、ヒトトランスフォーミング増殖因子 2 (TGF 2) に結合する高アフィニティー核酸リガンドを同定及び調製する方法である。そのような核酸リガンドを同定するのに本明細書で利用される方法は、S E L E X (Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichmentの頭字語) と呼ばれる。本発明にはヒトTGF 2の高アフィニティー核酸が含まれる。さらに開示されるのはTGF 2に対するRNAリガンドである。さらに含まれるのは、ピリミジンの2'位で修飾されたヌクレオチド誘導体を含むオリゴヌクレオチドである。更に開示されるのは、血清中及び動物においてより高い安定性を有する可能性がある、2'-OCH₃プリン修飾を含む、TGF 2に対するリガンドである。本発明にはまた、TGF 2の高アフィニティー核酸阻害剤が含まれる。本発明のオリゴヌクレオチドリガンドは、TGF 2へ結合することが要求される任意の方法において有用である。これには、医薬品、診断薬、造影剤、及び免疫組織化学試薬としての使用が含まれるが、これらに限定されるものではない。

発明の背景

トランスフォーミング増殖因子 (TGF) は、インヒビン、アクチビン、骨形成因子及び骨形成タンパク質、増殖/分化因子、ミューラー管抑制物質、デカペンタプレジック (decapentaplegic) 及び60A (ショウジョウバエ)、daf-7及びunc-129 (C.エレガンス)、及びvg1 (アフリカツメガエル) を包含するタンパク質のスーパーファミリーの一部である (Schlunegger and Grutter (1992) Nature 358: 430-434)。哺乳動物には、3種のTGFのアイソタイプ、TGF 1、TGF 2及びTGF 3が存在する。哺乳動物のTGFのどのペアにも約80%の配列相同性が存在する。TGFは少なくとも5種の受容体に結合するが、そのうちの2又は3種 (I型、II型、及びおそらくはV型) だけがシグナル伝達系受容体である。TGFにより活性化される細胞内シグナル伝達経路にはSMADタンパク質が含まれ、詳細に研究されている

(Padgett et al. (1998) Pharmacol Ther 78: 47-52)。このシグナル伝達系受容体は多種多様な細胞に見出される。また、多種多様な細胞がTGFを発現する。

【0002】

TGFは、アミノ末端の潜伏関連タンパク質(LAP)とカルボキシル末端の成熟TGFから構成される前駆体として合成される。この前駆体は切断され、ホモ二量体として組立てられる。TGFは、LAP及び潜伏TGF結合タンパク質(LTBP)に結合した細胞から分泌される。潜伏TGFはLAP及びLTBPから遊離され、プラスミンによるタンパク質分解かトロンボスポンジンによる調節が関与し得る比較的特徴づけられていない機構により活性化される(Crawford et al. (1998) Cell 93: 1159-70)。遊離した成熟TGFホモ二量体は、約25000ダルトン(各モノマーにつき112アミノ酸)の複合分子量を有する。TGF1及びTGF2はヘパリンに結合し、ヘパリン結合には第26番目の塩基性アミノ酸が必要とされるという指摘がある(Lyon et al. (1997) Jour. Biol. Chem. 272: 18000-18006)。

【0003】

TGF2の構造は、X線結晶解析法を使用して決定され(Daopin et al. (1992) Science 257: 369-373; Schlunegger and Grutter (1992) Nature 358: 430-434)、TGF1の構造に非常に似ている。TGFは、血管内皮増殖因子、神経増殖因子、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン、及び血小板由来増殖因子を包含する、「システインノット」タンパク質と呼ばれる構造のタンパク質ファミリーに属する。上記のタンパク質は構造的に相同性があるが、一次配列の相同性は10~25%しか有さない。

【0004】

TGFの生物学的活性は多様である(Moses (1990) Growth Factors from Genes to Clinical Application 141-155; Wahl (1994) J. Exp. Med. 180: 1587-1590)。細胞増殖を阻害する場合もあれば(Robinson et al. (1991) Cancer Res. 113: 6269-6274)、それを刺激する場合もある(Fynan and Reiss (1993) Crit. Rev. Oncogenesis 4: 493-540)。細胞外マトリックスの形成とリモデリン

グを調節する場合もある (Koli and Arteaga (1996) *Jour. Mammary Gland Biol. and Neoplasia* 1: 373-380)。TGF はまた非常に強力な免疫抑制剤である (Letterio and Roberts (1998) *Ann. Rev. Immunol.* 16: 137-161)。TGF は、免疫系が腫瘍を拒絶しない線維症 (Fakhrai et al. (1996) *Proc. Natl. Acad. USA* 93: 2090-2914)、癌細胞増殖 (Koli and Arteaga (1996) *J. Mammary Gland Biol. and Neoplasia* 1: 373-380; Reiss and Barcellos-Hoff (1997) *Breast Cancer Res. and Treatment* 45: 81-85; Jennings and Pietenpol (1998) *J. Neurooncol.* 36: 123-140)、及び腫瘍転移において重要な役割を担うと考えられている。それはまた自己免疫疾患と感染症においても補助的な役割を有する可能性がある。発現されるアンチセンスRNAにより (Fakhrai et al. (1996) *Proc. Natl. Acad. USA* 93: 2090-2914)、及び外因性アンチセンスオリゴヌクレオチドにより (Marzo et al. (1997) *Cancer Research* 57: 3200-3207) TGF 2を阻害すると、ラットにおいて神経膠腫の形成を妨げることが報告されている。

【0005】

マウスTGF 2の遺伝子が欠失された (Sanford et al. (1997) *Development* 124: 2659-2670)。TGF 2の機能を欠くマウスは生後すぐに死亡し、心臓、眼、耳、肺、四肢、頭蓋顔面領域、脊髄、及び尿生殖路における発育障害につながる異常な上皮-間充織相互作用を有する。これらの障害は、多くの場合、TGF 1及びTGF 3のノックアウトマウスにおいて観察された異常とは重複しない。TGF はまた種々の細胞株又はトランスジェニックマウスにおいて過剰発現されており (Koli and Arteaga (1996) *J. Mammary Gland Biol. and Neoplasia* 1: 373-380; Bottinger et al. (1997) *Kidney Int.* 51: 1355-1360; Bottinger and Kopp (1998) *Miner Electrolyte Metab* 24: 154-160)、多種多様な効果を有する。

【0006】

ターゲット分子に対して高アフィニティー結合する核酸分子のインビトロ進化の方法が開発されている。この方法、即ちSELEXと呼ばれる「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法」は、「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法」と

題する、現在放棄された、米国特許出願第07/536,428号(1990年6月11日出願)、「核酸リガンド」と題する米国特許第5,475,096号、及び「核酸リガンドの同定法」と題する米国特許第5,270,163号(WO91/19813号も参照のこと)に記載されており、これらはいずれもそのまま明確に本明細書中に援用される。本明細書でS E L E X特許出願と総称される、上記出願のそれぞれは、所望のターゲット分子に対する核酸リガンドをつくるための根本的に新しい方法を説明する。

【0007】

S E L E X法は、混合物から候補オリゴヌクレオチドを選択し、同一の一般選択テーマを使用して結合、分離及び増幅を段階的に反復することを含み、結合アフィニティー及び選択性の所望される判断基準をほとんどすべて達成する。好ましくはランダム配列のセグメントを含んでなる、核酸の混合物から出発するS E L E X法には、結合に好ましい条件下でこの混合物をターゲットと接触させる工程、ターゲット分子と結合した核酸から非結合の核酸を分離する工程、この核酸-ターゲット複合体を解離させる工程、核酸-ターゲット複合体から解離した核酸を増幅させて、リガンドが濃縮した核酸の混合物を産生する工程、次いで、この結合、分離、解離及び増幅の工程を所望されるだけ多くのサイクルで繰り返し、ターゲット分子に対する高アフィニティー核酸リガンドを産生する工程が含まれる。

【0008】

基本のS E L E X法は特定の目的を達成するために改良され得る。例えば、「構造に基づいた核酸の選択法」と題する、現在放棄された、米国特許出願第07/960,093号(1992年10月14日出願)は、ゲル電気泳動と組み合わせて、折れ曲がりDNA(米国特許第5,707,796号を参照のこと)のような特定の構造的特徴を有する核酸分子を選択するためのS E L E X法の使用を説明する。「核酸リガンドの光選択」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/123,935号(1993年9月17日出願)は、ターゲット分子に結合する及び/又は光架橋する及び/又はそれを光不活性化することが可能な光反応基を含有する核酸リガンドを選択するためのS E L E Xをベースとした方法

を説明する。「テオフィリンとカフェインを判別する高アフィニティー核酸リガンド」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/134,028号(1993年10月7日出願)は、「カウンターSELEX」(米国特許第5,580,737号を参照のこと)と命名された、近縁の分子を判別し得る高度に特異的な核酸リガンドを同定する方法を説明する。「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法:溶液SELEX」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/143,564号(1993年10月25日出願;米国特許第5,567,588号も参照のこと)と「フローセルSELEX」と題する米国特許第5,861,254号は、ターゲット分子に対し高及び低アフィニティーを有するオリゴヌクレオチド間の高度に効率的な分離を達成する、SELEXをベースとした方法を説明する。「HIV-RT及びHIV-1 Revに対する核酸リガンド」と題する米国特許第5,496,938号は、SELEX法を実施した後で改善された核酸リガンドを入手する方法を説明する。「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法:ケミ(Chemi)-SELEX」と題する米国特許第5,705,337号は、リガンドをそのターゲットへ共有結合させる方法を説明する。

【0009】

SELEX法には、改善されたインビボ安定性又はデリバリーのような、改善された特性をリガンドに与える修飾ヌクレオチドを含有する高アフィニティー核酸リガンドの同定が含まれる。そのような修飾の例には、リボース及び/又はリン酸及び/又は塩基の位置での化学的な置換が含まれる。修飾ヌクレオチドを含有する、特定のSELEX法で同定された核酸リガンドが、「修飾ヌクレオチドを含有する高アフィニティー核酸リガンド」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/117,991号(1993年9月8日出願)に記載されている。これは、ピリミジンの5-及び2'位で化学的に修飾されたヌクレオチド誘導体を含有するオリゴヌクレオチド、及び2'-アミノ修飾を含有する、トロンピンに対する特定RNAリガンドについて説明する(米国特許第5,660,985号を参照のこと)。上記の米国特許出願第08/134,028号は、2'-アミノ(2'-NH₂)、2'-フルオロ(2'-F)、及び/又は2'-O-メチル(2'-OMe)で修飾された1つ又はそれ以上のヌクレオチドを含有する

高度に特異的な核酸リガンドについて説明する。「分子内求核置換による既知及び新規の2'修飾ヌクレオシドの新規製造法」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/264,029号(1994年6月22日出願)は、様々な2'-修飾ピリミジンを含むオリゴヌクレオチドについて説明する。「オリゴヌクレオチドのバイオコンジュゲーション」と題するPCT/US98/00589号(WO98/18480号)(1998年1月7日出願)は、ある分子実体を用いてその5'位だけを誘導化した核酸リガンドを含んでなる、あるターゲットに対するバイオコンジュゲートを同定する方法を説明する。

【0010】

SELEX法には、「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法：キメラSELEX」と題する米国特許第5,637,459号と「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法：混合SELEX」と題する米国特許第5,683,867号にそれぞれ記載されるように、選択されたオリゴヌクレオチドを他の選択されたオリゴヌクレオチド及び非オリゴヌクレオチドの機能ユニットと結合させることが含まれる。上記出願は、オリゴヌクレオチドの広範囲の形状や他の特性、及び効率的な増幅や複製の特性を、他の分子の所望の特性と組み合わせることを可能にする。SELEX法の定義及び説明を包含するがこれらに限定されない、上記の特許出願の全文は、そのまま本明細書中に明確に援用される。

発明の概要

本発明には、トランスフォーミング増殖因子(TGF β 2)に対する核酸リガンドを同定及び産生する方法とそのように同定及び産生される核酸リガンドが含まれる。特に、TGF β 2と特異的に結合することが可能であるRNA配列が提供される。さらに含まれるのは、ピリミジンの2'位が修飾されたヌクレオチド誘導体を含むオリゴヌクレオチドである。本発明に特別に含まれるのは、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9(配列番号21～108及び配列番号128～193)に示されるRNAリガンド配列である。本発明にはまた、TGF β 2の機能を阻害するTGF β 2のRNAリガンドが含まれる。本明細書にさらに記載されるのは、TGF β 1の2'-OMe修飾核酸リガンドである。

【0011】

本発明にさらに含まれるのは、(a)核酸の候補混合物を調製する工程、(b)この核酸の候補混合物をTGF 2と接触させる工程、(c)前記候補混合物のメンバーをTGF 2に対するアフィニティーに基づいて分配する工程、及び(d)選択された分子を増幅して、TGF 2に対する結合アフィニティーが相対的により高い核酸配列について濃縮された核酸の混合物を産出する工程を含んでなる、TGF 2に対する核酸リガンド及び核酸リガンド配列を同定する方法である。

【0012】

より特定すると、本発明には、上記の方法により同定された、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9(配列番号21～108及び配列番号128～193)に示されるリガンドを包含する、TGF 2に対するRNAリガンドが含まれる。また、上記リガンドのいずれかと実質的に相同であり、TGF 2へ結合してTGF 2の機能を阻害する実質的に同一の能力を有する、TGF 2に対する核酸リガンドが含まれる。本発明にさらに含まれるのは、本明細書に示されるリガンドと実質的に同一の構造形態を有し、TGF 2へ結合してTGF 2の機能を阻害する実質的に同一の能力を有する、TGF 2に対する核酸リガンドである。

【0013】

本発明にはまた、本明細書で同定される核酸リガンドに基づいた他の修飾ヌクレオチド配列とその混合物も含まれる。

発明の詳細な説明

本出願は、SELEXとして知られる方法を介して同定される、TGF 2に対する高アフィニティー核酸リガンドを説明する。SELEXは、「指数的濃縮によるリガンドの系統進化法」と題する、現在放棄された、米国特許出願第07/536,428号、「核酸リガンド」と題する米国特許第5,475,096号、及び「核酸リガンドの同定法」と題する米国特許第5,270,163号(WO91/19813号も参照のこと)に記載されている。これらの出願はいずれもそのまま明確に本明細書中に援用され、SELEX特許出願と総称される。TGF

に対する核酸リガンドがS E L E X法を介して同定されている。これらのT G F 核酸リガンドは、いずれも「高アフィニティーT G F 核酸リガンド及び阻害剤」と題する米国特許第5,731,144号及び米国特許出願第09/046,247号(1998年3月23日出願)、並びに「切断型S E L E X法」と題する米国特許出願第09/275,850号(1999年3月24日出願)に記載されている。これらの出願は、そのまま明確に本明細書中に援用される。

【0014】

本明細書において本発明を説明するために使用されるいくつかの用語は以下のように定義される。

本明細書で使用されるような「核酸リガンド」は、ターゲットに対して所望される作用を有する、非天然の核酸である。核酸リガンドはまた本明細書では「アプタマー」とも言われる。所望される作用には、ターゲットに結合すること、ターゲットを接触的に変化させること、ターゲット又はターゲットの機能活性を修飾/変化させるやり方でターゲットと反応すること、自殺阻害剤中のようにターゲットへ共有結合すること、及びターゲットと他の分子との反応を促進することが含まれるが、これらに限定されない。好ましい態様では、この所望される作用はターゲット分子に特異的な結合であり、そのようなターゲット分子は、ワトソン/クリック塩基対合や三重らせん結合に主に依存する機序を介して核酸リガンドに結合するポリヌクレオチド以外の3次元化学構造体であり、ここで核酸リガンドはターゲット分子により結合される既知の生理学的機能を有する核酸ではない。核酸リガンドには核酸の候補混合物から同定される核酸が含まれ、前記核酸リガンドは以下を含んでなる方法によりあるターゲットのリガンドとなる：a) この候補混合物をターゲットと接触させること、その際、候補混合物と比較しターゲットに対してより増大したアフィニティーを有する核酸が候補混合物の残りから分配され得る；b) 増大したアフィニティーの核酸を候補混合物の残りから分配すること；及びc) 増大したアフィニティーの核酸を増幅し、リガンドを濃縮した核酸の混合物を産生すること。

【0015】

「候補混合物」は、そこから所望されるリガンドを選択するための、様々な配

列をもった核酸の混合物である。候補混合物の供給源は、天然の核酸又はそのフラグメント、化学合成した核酸、酵素的に合成した核酸、又は上記技術の組み合わせにより創出される核酸から得られるものであり得る。好ましい態様では、それぞれの核酸は、ランダム領域の周囲に、増幅法を促進する固定配列を有する。

【0016】

「核酸」は、一本鎖又は二本鎖のいずれかのDNA、RNA、及びその化学修飾物を意味する。修飾には、追加の電荷、分極率、水素結合、静電的相互作用、及び流動性を核酸リガンドの塩基又は核酸リガンド全体に取込ませる他の化学基を提供するものが含まれるが、これらに限定されない。そのような修飾には、2'位の糖修飾、5位のピリミジン修飾、8位のプリン修飾、環外アミンの修飾、4-チオウリジンの置換、5-プロモ又は5-ヨード-ウラシルの置換、骨格修飾、メチル化、アイソ塩基のイソシチジン及びイソグアニジンのような稀な塩基対合の組み合わせ等が含まれるが、これらに限定されない。修飾には、キャッピングのような3'及び5'修飾も含まれる。

【0017】

「SELEX」法には、所望のやり方、例えばタンパク質への結合でターゲットと相互作用する核酸リガンドの選択に、この選択された核酸の増幅を組み合わせることが含まれる。この選択/増幅工程のサイクルを反復的に繰り返すことにより、非常に多数の核酸を含有するプールから、そのターゲットと最も強く相互作用する1つ又は少数の核酸を選択することが可能になる。選択/増幅法のサイクルは選択した目標が達成されるまで続けられる。本発明では、SELEX法を利用してTGF β 2に対する核酸リガンドを得る。SELEX法についてはSELEX特許出願に説明されている。

【0018】

「ターゲット」は、それに対するリガンドが所望される、関心対象のあらゆる化合物又は分子を意味する。ターゲットは、タンパク質、ペプチド、炭水化物、多糖類、糖タンパク質、ホルモン、受容体、抗原、抗体、ウイルス、基質、代謝物、遷移状態類似体、補因子、阻害剤、薬物、色素、栄養素、増殖因子等であり得るが、これらに限定されない。本出願では、ターゲットはTGF β 2である。

【0019】

その最も基本的な形式において、S E L E X法は以下の一連の工程により定義され得る：

1) 様々な配列の核酸の候補混合物を調製する。一般に、この候補混合物には、固定配列の領域（即ち、候補混合物のメンバーのそれぞれが同じ位置に同一の配列を含有する）とランダム配列の領域が含まれる。固定配列の領域は、a) 以下に記載の増幅工程を補助するため；b) ターゲットに結合することが知られている配列を模倣するため；又はc) 一定の構造配列をした核酸の候補混合物における濃度を高めるために選択される。ランダム配列は、全体的にランダムである（即ち、ある位置にある塩基を見出す確率は1/4である）か、又は部分的のみランダムであり得る（即ち、ある位置にある塩基を見出す確率が0～100%の任意のレベルで選択され得る）。

【0020】

2) この候補混合物を、ターゲットと候補混合物のメンバーとが結合するのに好ましい条件下で、選択されたターゲットと接触させる。上記状況下でのターゲットと候補混合物の核酸との相互作用は、ターゲットとそのターゲットに対し最も強いアフィニティーを有する核酸との核酸-ターゲット対が形成されたとみなされる。

【0021】

3) ターゲットに対し最も高いアフィニティーを有する核酸を、ターゲットに対しより低いアフィニティーを有する核酸から分離する。最高アフィニティーの核酸に相当する配列はごくわずかな数しか（1分子の核酸しかない可能性もある）候補混合物中に存在しないので、候補混合物にある有意な量（約5～50%）の核酸が分離の間に保持されるように、分離の判定基準を設定することが概して望ましい。

【0022】

4) 次いで、ターゲットに対し相対的により高いアフィニティーを有するものとして分離の間に選択された核酸を増幅し、ターゲットに対する相対的に高いアフィニティーを有する核酸が濃縮された新たな候補混合物を創出する。

【0023】

5) 上記の分離及び増幅工程を繰り返すことによって、新たに形成される候補混合物は、弱く結合する配列をどんどん少なく含有するようになり、ターゲットに対する核酸の平均アフィニティー度合いは概して増加する。極端な場合、S E L E X法は、元の候補混合物由来の核酸を代表する、ターゲット分子に対して最高のアフィニティーを有する独特な核酸を1つ又は少数含有する候補混合物を産生する。

【0024】

S E L E X特許出願は、この方法について詳述している。それには、この方法に使用され得るターゲット、候補混合物中にある核酸を分離する方法、及び分離された核酸を増幅して濃縮された候補混合物を産生する方法が含まれる。S E L E X特許出願はまた、タンパク質が核酸結合タンパク質であるか又はそうでないタンパク質ターゲットを含め、多数のターゲット種に対して得られるリガンドについても説明する。

【0025】

さらにS E L E X法には、米国特許第6,011,020号、「核酸リガンド複合体」に記載されるように、診断薬又は治療薬の複合体において、選択された核酸リガンドを親油性又は非免疫原性の高分子量化合物と組み合わせることが含まれる。「血管内皮増殖因子(V E G F)核酸リガンド複合体」と題する米国特許第5,859,228号には、診断薬又は治療薬の複合体において、ジアシルグリセロール又はジアルキルグリセロールのような親油性化合物と会合しているV E G F核酸リガンドが説明されている。さらに、「血管内皮増殖因子(V E G F)核酸リガンド複合体」と題する米国特許出願第08/897,351号(1997年7月21日出願)には、グリセロール脂質のような親油性化合物、又はポリアルキレングリコールのような非免疫原性の高分子量化合物と会合しているV E G F核酸リガンドが説明されている。さらにまた、「血管内皮増殖因子(V E G F)核酸リガンド複合体」と題するP C T / U S 9 7 / 1 8 9 4 4号(WO98/18480号)(1997年10月17日出願)には、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物と会合しているV E G F核酸リガンドが説明されている

。基本的なS E L E X法の改変を説明する上記特許出願は、いずれもそのまま明確に本明細書中に援用される。

【0026】

本発明のある態様では、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物と共有結合した、T G F 2に対する1つ又はそれ以上の核酸リガンドを含んでなる複合体を提供することが所望される。本明細書で使用されるような複合体は、非免疫原性の高分子量化合物への、T G F 2の核酸リガンドの共有結合によって形成される分子実体を説明する。非免疫原性の高分子量化合物とは、通常は免疫原性の応答を産生しない、約100Da~1,000,000Da、より好ましくは約1000Da~500,000Da、及び最も好ましくは約1000Da~200,000Daの化合物である。本発明の目的では、免疫原性の応答とは、生体に抗体タンパク質をつくらせるものである。本発明の1つの好ましい態様では、非免疫原性の高分子量化合物はポリアルキレングリコールである。最も好ましい態様では、ポリアルキレングリコールはポリエチレングリコール(P E G)である。より好ましくは、P E Gは約10~80kの分子量を有する。最も好ましくは、P E Gは約20~45kの分子量を有する。本発明のある態様では、非免疫原性の高分子化合物はまた核酸リガンドであり得る。

【0027】

本発明のもう1つの態様では、T G F 2に対する核酸リガンドと親油性化合物が含まれる複合体を有することが望ましい。親油性化合物とは、実質的に親油性成分からなる構造を含む、脂質及び/又は低い誘電率を有する他の材料又は相と会合するか又はそれへ分配される傾向を有する化合物である。親油性化合物には、脂質、及び脂質(及び/又は低い誘電率を有する他の材料又は相)と会合する傾向を有する化合物を含有する非脂質が含まれる。コレステロール、リン脂質、及びジアルキルグリセロール、ジアシルグリセロール、及びグリセロールアミド脂質のようなグリセロール脂質が、親油性化合物のさらなる例である。好ましい態様では、親油性化合物はグリセロール脂質である。

【0028】

非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物は、T G F 2に対する核酸リ

ガンドの、塩基上の環外アミノ基、ピリミジンヌクレオチドの5位、プリンヌクレオチドの8位、リン酸のヒドロキシル基、又は5'又は3'末端のヒドロキシル基又は他の基のような、TGF₂に対する核酸リガンド上の多種多様な位置へ共有結合され得る。親油性化合物がグリセロール脂質であるか、又は非免疫原性の高分子量化合物がポリアルキレングリコール又はポリエチレングリコールである態様では、好ましくは、非免疫原性の高分子量化合物はそのリン酸基の5'又は3'ヒドロキシルへ結合している。最も好ましい態様では、親油性化合物又は非免疫原性の高分子量化合物は、核酸リガンドのリン酸基の5'ヒドロキシルへ結合している。非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物の、TGF₂の核酸リガンドに対する結合は、直接的にか、又はリンカー又はスペーサーの利用によりなし得る。

【0029】

「リンカー」は、2種又はそれ以上の分子実体を共有結合又は非共有相互作用を介して連結させる分子実体であり、1種又はそれ以上の分子実体の機能特性を保存するやり方で、分子実体の空間的な分離を可能にし得る。リンカーはまたスペーサーとして知られる場合もある。

【0030】

TGF₂に対する核酸リガンドと非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物を含んでなる複合体は、さらに脂質構築体と会合され得る。脂質構築体とは、脂質、リン脂質、又はそれらの誘導体を含むし、多種多様な異なる構造配置を含んでなり、その脂質が水性懸濁液に取込まれることが知られている構造体である。これらの構造体には、脂質二重層小胞、ミセル、リポソーム、エマルジョン、脂質リボン又はシートが含まれるがこれらに限定されず、製剤的に許容されることが知られている多種多様な薬物及び成分と複合され得る。好ましい態様では、脂質構築体はリポソームである。好ましいリポソームは単層であり、200nm未満の相対サイズを有する。脂質構築体における共通の追加成分には、特に、コレステロール及び α -トコフェロールが含まれる。脂質構築体は単独で又は任意の組み合わせにおいて使用され得るが、当業者ならば特定の応用について所望される特徴を提供できることが認識されるであろう。さらに、脂質構築体とリポ

ソーム形成の技術的な側面は当該技術分野で周知であり、この技術分野で一般に実践される方法のいずれもが本発明に使用され得る。

【0031】

SELEX法は、更にターゲットに対するバイオコンジュゲートを同定することを含む。「オリゴヌクレオチドのバイオコンジュゲーション」と題する同時係属中のPCT特許出願US98/00589号(WO98/30720号)(1998年1月7日出願)は、ある分子実体を用いて5'位のみを誘導化したRNAを含んでなるバイオコンジュゲートを酵素的に合成する方法と、ある分子実体を用いて核酸リガンドの5'位のみを誘導化した核酸リガンドを含んでなる、ターゲットに対するバイオコンジュゲートを同定する方法を説明する。本明細書で使用されるような「バイオコンジュゲート」は、別の分子実体で誘導化された任意のオリゴヌクレオチドを意味する。好ましい態様では、分子実体は巨大分子である。本明細書で使用されるように、「巨大分子」は、大きな有機分子を意味する。巨大分子の例には、核酸、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ペプチド、炭水化物、多糖類、糖タンパク質、コレステロール、リン脂質、ジアシルグリセロール及びジアルキルグリセロールのような親油性化合物、ホルモン、薬物、非免疫原性の高分子量化合物、蛍光性の、化学発光性の及び生物発光性のマーカー化合物、抗体及びビオチンなどが含まれるが、これらに限定されない。ある態様では、分子実体が、RNAの疎水性を高めること、及び結合、膜分画及び/又は膜透過性を強めることのような、ある種の所望される特徴を核酸リガンドへ提供し得る。さらに、ビオチン、フルオレセイン、又は診断放射核種へ取込むためのペプチジル金属キレートのようなレポーター分子も加えられる場合があり、それにより診断薬として使用され得るバイオコンジュゲートを提供する。

【0032】

本明細書に記載の方法とそのような方法により同定される核酸リガンドは、治療と診断の両方の目的に有用である。治療用の使用には、ヒト患者における疾患又は医学的病態の治療又は予防が含まれる。治療用の使用には獣医学への応用も含まれ得る。

【0033】

診断用の利用には、インビトロ又はインビボの両方の診断応用が含まれ得る。S E L E X法全般、及び本明細書で明確に教示及び特許請求されるS E L E X法の特定の適用は、診断応用に特に適している。S E L E Xでは高アフィニティーと驚くほどの特異性でターゲットに結合し得る核酸リガンドが同定される。これらの特徴は、当然ながら、当業者が診断用リガンドにおいて求める所望の特性である。

【0034】

本発明の核酸リガンドは、当業者により又はP C T / U S 9 8 / 0 0 5 8 9号(W O 9 8 / 3 0 7 2 0号)に記載の方法により利用される任意数の技術によって、診断目的のために日常的に適用され得る。診断薬は、ある一定のターゲットの存在を特定の場所又は濃度で使用者が同定することを可能にするものである必要がある。簡略に言えば、診断目的のためにポジティブシグナルを誘発するには、ターゲットと結合対を形成する能力があれば十分であり得る。当業者ならば、核酸リガンドの存在を追跡するために標識タグを取込ませる、当技術分野で公知の方法により、任意の核酸リガンドを適応することができるだろう。そのようなタグは、数多くの診断法において使用され得る。本明細書に記載のT G F 2に対する核酸リガンドは、T G F 2タンパク質の同定のために特異的に使用され得る。

【0035】

S E L E Xは、ターゲット分子の高アフィニティーリガンドを提供する。このことは、核酸研究の分野では先例がない並外れた業績であることを意味する。本発明はS E L E X法をT G F 2の特定ターゲットへ応用する。以下の実施例では、T G F 2に対する核酸リガンドを単離及び同定するために使用される実験パラメータが説明される。

【0036】

医薬品としての使用に望ましい核酸を製造するためには、核酸リガンドが、1) ターゲットに対して所望の効果を達成し得るやり方でターゲットへ結合し；2) 所望の効果をj得るのに可能な限り小さく；3) 可能な限り安定であり；4) 選択されたターゲットに対して特異的なリガンドであり得ることが好ましい。多く

の場合、核酸リガンドがそのターゲットに対して可能な限り最高のアフィニティを有することが好ましい。

【0037】

同時係属中で、一般的に指定された米国特許第5,496,938号('938特許)には、SELEXが実施された後で改善された核酸リガンドを得るための方法が説明されている。「HIV-RT及びHIV-1 Revに対する核酸リガンド」と題するこの'938特許は、そのまま明確に本明細書中に援用される。

【0038】

本発明では、TGF β 2に対し特異的な高アフィニティを有するRNAリガンドを33、34又は40個のランダム位置(33N、34N又は40N)(表1)を含有する縮重ライブラリーから同定するために、SELEX実験を実施した。本発明には、実施例1に記載の方法により同定された、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16~表19及び図9(配列番号21~108及び配列番号128~193)に示される、TGF β 2に対する特異的なRNAリガンドが含まれる。さらに本発明は、おそらくはTGF β 2とその受容体との相互作用を阻害することによってTGF β 2の機能を阻害する、TGF β 2に対するRNAリガンドが含まれる。本発明に包含されるリガンドの範囲は、SELEX法により同定される、修飾及び非修飾の、あらゆるTGF β 2の核酸リガンドに及ぶ。より特定すると、本発明には、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16~表19及び図9(配列番号21~108及び配列番号128~193)に示されるリガンドと実質的に相同である核酸配列が含まれる。実質的に相同であるとは、70%より多い、最も好ましくは80%より多い、及びさらにより好ましくは90%、95%又は99%より多い一次配列相同性の度合いを意味する。本明細書に記載されるような相同性の比率は、比較される配列内の同一ヌクレオチド残基と並置する2種の配列のうちより小さいほうに見出されるヌクレオチドの比率として算出され、その際、10ヌクレオチドの長さには1つのギャップを導入して並置を補助してもよい。表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16~表19及び図9(配列番号21~108及び配列番号128~193)

3) に示される、TGF β 2 のリガンドの配列相同性を観察すると、ほとんど又は全く一次配列に相同性がないいくつかの配列が実質的に同一のTGF β 2 結合能力を有し得ることがわかる。これらの理由のために、本発明には、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9(配列番号21～108及び配列番号128～193)に示される核酸リガンドと実質的に同一な構造及びTGF β 2 結合能力を有する核酸リガンドも含まれる。実質的に同一なTGF β 2 結合能力とは、そのアフィニティーが本明細書に記載されるリガンドのアフィニティーの1桁又は2桁以内にあることを意味する。本明細書に明確に記載されるものと実質的に相同性のある一定の配列が実質的に同一のTGF β 2 結合能力を有するかどうかを決定することは、十分に当業者の技量の範囲内にある。

【0039】

本発明にはまた、実質的に同一な推定構造又は構造モチーフを有する核酸リガンドが含まれる。実質的に同一な構造又は構造モチーフは、Zukerfoldプログラム(Zuker (1989) Science 244: 48-52 を参照のこと)を使用する配列並置により推定され得る。当技術分野で知られているように、二次構造及び構造モチーフを予測するのに他のコンピュータプログラムも使用し得る。溶液中か又は結合した構造としての核酸リガンドの実質的に同一な構造又は構造モチーフもまた、NMR又は当技術分野で知られているような他の技術を使用して推定され得る。

【0040】

核酸の治療、予防及びインビボ診断用の使用において遭遇する1つの潜在的な問題は、オリゴヌクレオチドがそのホスホジエステルの形態では、所望の効果が現れないうちに、エンドヌクレアーゼ及びエクソヌクレアーゼのような細胞内及び細胞外の酵素により体液中で速やかに分解され得ることである。核酸リガンドのインビボ安定性を高めるか、又は核酸リガンドのデリバリーを強めるか又は仲介するために、核酸リガンドのある種の化学修飾をなし得る。例えば、「修飾ヌクレオチドを含有する高アフィニティー核酸リガンド」と題する、現在放棄された、米国特許出願第08/117,991号(1993年9月8日出願)、及び「核酸リガンド複合体」と題する米国特許第6,011,020号を参照されたい

。これらはそのまま明確に本明細書中に援用される。本発明において考慮される核酸リガンドの修飾には、核酸リガンドの塩基又は核酸リガンド全体に対して、追加の電荷、分極率、疎水性、水素結合、静電的相互作用、及び流動性を取り込ませる他の化学基を提供するものが含まれるが、これらに限定されない。そのような修飾には、2'位の糖修飾、5位のピリミジン修飾、8位のプリン修飾、環外アミンの修飾、4-チオウリジンの置換、5-プロモ又は5-ヨード-ウラシルの置換、骨格修飾、ホスホロチオエート又はリン酸アルキル修飾、メチル化、アイソ塩基のイソシチジン及びイソグアニジンのような稀な塩基対合の組み合わせ等が含まれるが、これらに限定されない。修飾には、キャッピングのような3'及び5'修飾も含まれる。

【0041】

核酸リガンドがSELEX法により抽出される場合、修飾はSELEXの前か又は後の修飾であり得る。SELEX前修飾は、そのSELEXターゲットに対する特異性と改善されたインビボ安定性の両方を有する核酸リガンドを産生する。2'-OH核酸リガンドに対してなされるSELEX後修飾は、核酸リガンドの結合能力に悪影響を及ぼすことなく、改善されたインビボ安定性をもたらし得る。本発明の核酸リガンドの好ましい修飾は、5'及び3'ホスホロチオエートキャッピング及び/又は3'末端での3'-3'逆ホスホジエステル連結である。1つの好ましい態様では、核酸リガンドの好ましい修飾は、3'末端での3'-3'逆ホスホジエステル連結である。更にヌクレオチドの一部又は全部を2'-フルオロ(2'-F)及び/又は2'-アミノ(2'-NH₂)及び/又は2'-O-メチル(2'-OMe及び/又は2'-OCH₃)修飾することが好ましい。本明細書に記載されるのは、2'-F修飾されて、SELEX法へ組み込まれた核酸リガンドである。本明細書にまた記載されるのは、SELEX法が実施された後で2'-OCH₃修飾された核酸リガンドである。

【0042】

他の修飾も当業者に知られている。そのような修飾は、SELEX後(すでに同定された非修飾リガンドの修飾)に行うか、又はSELEX法への組み込みによりなされ得る。

【0043】

上記のように、選択的にTGF- β 2へ結合するその能力のために、本明細書に記載のTGF- β 2に対する核酸リガンドは、医薬品として有用である。従って、本発明にはまた、TGF- β 2へ結合し得る核酸リガンドの投与によりTGF- β 2介在性の病理状態を治療する方法が含まれる。

【0044】

核酸リガンドの治療用組成物は注射により非経口的に投与され得るが、関節内注射、吸入ミスト、経口活性製剤、経皮イオン浸透療法又は坐剤のような他の有効な投与形態も想定される。1つの好ましい担体は生理食塩水であるが、他の製剤的に許容される担体も使用され得ることが考慮される。1つの好ましい態様では、担体とリガンドが生理学的に適合可能な徐放性製剤を構成することが想定される。そのような担体における一次溶媒は、性質において水性又は非水性のいずれかであり得る。さらに、担体は、製剤のpH、浸透性、粘度、澄明性、色、無菌性、安定性、溶解速度、又はにおいを改変させるか又は維持するための他の薬理的に許容される賦形剤を含有する場合がある。同様に、担体は、リガンドの安定性、溶解速度、放出、又は吸収を改変させるか又は維持するためのさらに他の薬理的に許容される賦形剤を含有する場合がある。そのような賦形剤は、単用量又は複数用量のいずれかの形態で非経口的に投与するための剤形を製剤化するために通常及び習慣的に利用されるような物質である。

【0045】

治療用組成物が製剤化されたならば、それは、溶液、懸濁液、ゲル、エマルジョン、固形物、又は脱水又は凍結乾燥された粉末として無菌バイアルに保存され得る。そのような製剤は、即時使用の形態か、又は投与直前に復元を必要とする形態のいずれかで保存され得る。核酸リガンドを含有する製剤を全身デリバリーのために投与するやり方は、皮下、筋肉内、静脈内、鼻腔内によるか、又は膣坐剤又は肛門坐剤であり得る。

【0046】

以下の実施例は本発明を説明及び明示するために提供され、本発明を何ら限定するものではない。実施例1は、実施例2～5に使用される様々な材料と実験法

を説明する。実施例2は、ヒトTGF β 2に結合する核酸リガンドの単離及び特徴を説明する。実施例3は、偏向ラウンド0ライブラリーを使用するSELEX法により単離された核酸リガンド、偏向SELEX法から単離されたTGF β 2核酸リガンドの配列、及び偏向SELEX法から単離された核酸リガンドの結合を説明する。実施例4は、NX22284（配列番号115）及びNX22385（配列番号189）内において2'-OHプリンを2'-OCH₃プリンで置換することを説明する。実施例5は、NX22323（配列番号121）の薬物動態特性を説明する。実施例6は、リードTGF β 1短鎖型リガンドであるCD70（配列番号216）の2'-OMe修飾を説明する。実施例7は、TGF β 1及びTGF β 2に対するTGF β アプタマーのミンク肺上皮細胞（MLEC）PAイルシフェラーゼアッセイを説明する。

【0047】

実施例

実施例1 実験方法

材料

ヒトTGF β 1、TGF β 2又はTGF β 3を認識するモノクローナル抗体及びポリクローナル抗体は、R&D Systems社（ミネアポリス、MN）から購入した。DNAオリゴヌクレオチドは、Operon社（アラメダ、CA）又はOligos社（レディングセンター、CT）から購入した。BIAcore 2000及びIAsys plusの機器は、それぞれBiacore社（パラマス、NJ）及びAffinity Sensors社（ケンブリッジ、U.K.）の製品である。ニトロセルロースフィルターと濾過マニホールドは、Millipore社（ベッドフォード、MA）から入手した。ミンク肺上皮細胞（#CCCL64）は、American Type Culture Collection（ロックビル、MD）から購入した。クローニングベクターのpCRScript及びpUC9は、それぞれ社内で、又はStratagene社（ラ・ホーヤ、CA）又はLife Technologies社（ゲーサースバーグ、MD）から入手した。大腸菌株はStratagene社から入手した。QIAprepスピンミニプレップキットは、QIAGEN社（チャツワース、CA）から入手した。BigDyeシークエンシングキット及びモデル377シークエンサーは、Applied Biosystems社（フォスターシティ、

CA) から購入し得る。T7 RNAポリメラーゼ及びThermus aquaticus DNAポリメラーゼは、それぞれEnzyco社(デンバー、CO)及びPerkin Elmer社(ノーウォーク、CT)から購入した。制限酵素はすべてNew England Biolabs社から購入した。大腸菌RNase Hは、Boehringer Mannheim社から入手した。「NX」で始まる名称を有するすべての合成核酸は、ABIモデル394 DNA/RNAシンセサイザー(Applied Biosystems社)を使用して、NeXstar Pharmaceuticals社(ボールド、CO)で合成した。酵母tRNA(X-SA型)及びブタ腸粘膜由来ヘパリン(分子量5000)は、それぞれSigma(セントルイス、MO)及びCalbiochem社(ラ・ホーヤ、CA)から購入した。

【0048】

ラウンド0核酸ライブラリーの調製

TGF₂核酸リガンドを単離するために使用される、リボ核酸分子の初期(ラウンド0)ライブラリーを以下のように産生した。2種のDNAオリゴヌクレオチド(40N7ラウンド0(R0)DNAテンプレート及び5'N7プライマー)をアニールし、クレノウでフィルインして、40N7R0 DNA転写テンプレート(表1)を産生した。Fitzwater and Polisky (1996) Meth. Enz. 267: 275-301に記載のように、T7 RNAポリメラーゼ、3mM 2-Fウリジン及びシトシン、1mM 2'-OHグアノシン及びアデニン、並びに³²P-ATPを使用してこのテンプレートを転写した。これにより、5'及び3'の「固定」領域と40塩基長のランダム配列領域を有する、以下の配列のR0 40N7核酸プールを得た:

R0 40N7核酸

5' - GGGAGGACGAUGCGG - 40N - CAGACGACUCGCCCGA - 3'

5' 固定領域 ランダム領域 3' 固定領域 (配列番号6)

A = 2'-OH A; C = 2'-F C; G = 2'-OH G; U = 2'-F U。 (表1)

スポットSELEX

「サイトカインの高アフィニティー核酸リガンド」と題する、そのまま本明細書中に援用されている米国特許第5,972,599号に記載のように、³²P-ATPを使用して内部標識された核酸を使用して、スポットSELEXを実施し

た。このSELEX実験の条件及び経過を表3に要約する。簡略に言うと、ヒトTGF β 2(又は「タンパク質なし」)を、直径13mmのニトロセルロースフィルターに付し、吸収させるが完全には乾燥しないようにした。このフィルターを、ダルベッコリン酸緩衝化生理食塩水、1mM MgCl $_2$ 中にてRNAとともにインキュベートし、次いで表3に要約されるように洗浄した。フィルターに結合し、タンパク質に結合した核酸を、Instant Imager(Packard Instrument社、ダウナーズグローブ、IL)上で可視化して定量し、タンパク質結合核酸を50%フェノール、4M尿素において、65、45分で溶出させた。溶出した核酸をエタノール沈澱させ、次いで、トリ骨髄芽球症ウイルスの逆転写酵素を使用して逆転写し、5' N7プライマー及び3' N7プライマーを使用する15サイクルのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に付した。この生じる転写テンプレートを、2'-Fピリミジンヌクレオチド、2'-OHプリンリボヌクレオチド、及び 32 P-ATPの存在下で、T7 RNAポリメラーゼを用いて転写し、次のスポットラウンドに持ち越した。初回のスポットラウンドに由来するプールはまた、表面プラスモン共鳴バイオセンサーSELEXのラウンド2における使用のために、 32 P-ATPの非存在下で上記のように転写した。

【0049】

表面プラスモン共鳴バイオセンサーSELEX

BIAcoreモデル2000機器で表面プラスモン共鳴(surface plasmon resonance)バイオセンサー技術を使用して、2-spr~9-sprラウンドを実施した。この実験には、1xDPBS、1mM MgCl $_2$ 、0.005% P20界面活性剤(カタログ番号BR-1000-54、Biacore社、ピスカタウェイ、NJ)を泳動緩衝液として使用した。Biacoreアミンカップリングキット(カタログ番号BR-1000-50、Biacore社、ピスカタウェイ、NJ)を製造業者の指示に従って使用して、CM5 BIACOREチップ(Biacore社、ピスカタウェイ、NJ)上でTGF β 2をアミンとカップルさせた。簡潔に言うと、TGF β 2のアリコート(3 μ L、100 μ g/mLの濃度で4mM HClに溶解)を30 μ Lの10mM CH $_3$ COONa(pH5.0)で希釈し、様々な容量で、25のEDC-NHS活性化チップ上に注入し、反応ユ

ニット (RU) で測定されるように様々な負荷レベルを達成した。カップリングの後で、このチップを、3 M NaCl で約 1.5 分間、10 μ L / 分で洗浄した。上記の実験条件の下で、15 RU / μ L の TGF- β 2 負荷を達成することができた。フローセル 1、2 及び 3 に TGF- β 2 を負荷し、フローセル 4 は対照及びバックグラウンドを差し引くためにブランクとした。チップは使用前に LAP 及び / 又は可溶性受容体 III (R&D Systems 社、ミネアポリス、MN) の結合を 37 $^{\circ}$ C で試験することによって活性を試験した。それぞれの試験注入の最後に、10 mM NaOH での 1 分洗浄を使用して、チップを再生させた。SELEX ラウンドのために、標識ヌクレオチドを用いないインビトロ転写により産生された RNA プールを泳動緩衝液に溶かし、5 μ L / 分、37 $^{\circ}$ C で、TGF- β 2 を負荷した CM5 チップ上に注入した。各ラウンドで使用される RNA プールの濃度及び容量は、表 4 に示される通りである。各ラウンドで、この RNA プールを 40 μ L の注入液に入れ、それぞれの注入サイクルの後に解離相が続き、そこで、DPBS、1 mM MgCl₂ を使用して 20 μ L / 分でチップを洗浄し、3 つの 100 μ L 画分 (各 5 分) を回収した。最後の注入 - 解離サイクルに続き、0.25% SDS でチップを処理し、溶出した RNA を最終画分として回収した。各注入サイクルの第 3 画分と SDS 溶出液をプールし、RT / PCR により増幅して、次回の SELEX ラウンド用のテンプレートプールを産生した。

【0050】

共鳴ミラー光学バイオセンサー SELEX

IASYS プラス共鳴ミラー (resonant mirror) 光学バイオセンサー機器を使用して、10 - rm ~ 13 - rm ラウンドを実施した。表面プラズモン共鳴 SELEX 由来の 9 - spr ラウンドを出発材料として使用した。この実験には、1 $\times$ DPBS、1 mM MgCl₂、0.005% P20 界面活性剤 (カタログ番号 BR - 1000 - 54、Biacore 社、ピスカタウェイ、NJ) を泳動緩衝液として使用した。製造業者のプロトコールに従い、CMD IASYS キュベット (Affinity Sensors 社、ケンブリッジ、UK) 上で TGF- β 2 をアミンとカップルさせた。簡潔に言うと、CMD キュベットを 0.2 M EDC、0.05 M NHS で 10 分間活性化し、35 μ L の 10 mM CH₃COONa (pH 5.5

)に溶解させた35 μ Lの0.4 μ M TGF β 2、10 mM CH₃COONa (pH 5.5)を注入することにより、TGF β 2をカップリングさせた。このカップリング反応は25 $^{\circ}$ C、約15分間であり、約2,000 Arc secのシグナルを生じた。キュベットを1 Mエタノールアミンに1~2分曝すことによつて未反応部位をキャップした。カップリング及びキャッピングの後でキュベットを3 M NaClに1~2分間曝し、使用に備えた。キュベットは、LAP及び/又は可溶性受容体III (R&D Systems社、ミネアポリス、MN)の結合を37 $^{\circ}$ Cで測定することによつて活性について日常的に試験した。それぞれの試験注入の最後に、50 mM NaCO₃で1分間洗浄して、チップを再生させた。SELEXラウンドのために、標識ヌクレオチドを用いないインビトロ転写により産生されたRNAプールを泳動緩衝液に溶かした。TGF β 2を負荷したCMDキュベットにそれらを注入し、100%ステアリング下、37 $^{\circ}$ Cで27~60分間(表6)インキュベートした。結合の後で、RNAを緩衝液で置換して、結合したRNAがキュベット表面から解離することを観察した。37 $^{\circ}$ Cで30~150分間(表6)解離させながら、緩衝液を数回交換し蒸発を避けた。解離の後で、残存するRNAをH₂O又は0.25% SDSで溶出させ、上記のようにRNAを増幅させ、次のSELEXラウンドへ持ち越した。

【0051】

フィルター分配及びポリアニオン競合を使用するSELEX

ラウンド9b~22aについては、1)非特異的に結合するリガンドを競合除外するためにヘパリン又は酵母tRNAを含めたこと、2)結合緩衝液をHBS MCK(50 mM HEPES, pH 7.4、140 mM NaCl、1 mM MgCl₂、1 mM CaCl₂、3 mM KCl)としたこと、3)多大な努力をしてフィルター結合配列を減少させたこと(溶出及び転写後に核酸をフィルター上へ前吸着させる、tRNA及びウシ血清アルブミンで分配前にフィルターをブロックし、洗浄緩衝液へ0.5 M尿素を加えること)、及び4)転写物をグアノシン:2'-フルオロヌクレオチドのモル比が5:1の混合物で開始したこと以外は、実質的にFitzwater and Polisky (1996) Meth. Enz. 267: 275-301に記載のように、フィルター分配を使用するSELEXを実施した。グアノシンを用いた

開始により、S E L E X又は放射標識しない生物活性アッセイに核酸を使用することが可能になり、核酸が結合試験のために5'末端で放射標識される場合はホスファターゼ工程が軽減される。

【0052】

表面プラズモン共鳴S E L E Xのラウンド8 - s p rを出発材料として使用した。ラウンド9 b ~ 1 4 iでは、タンパク過剰の条件を使用してS E L E X法を実施した。核酸及びタンパク質の濃度はラウンド1 5 cにおいて等モルとした。ラウンド1 6 a ~ 2 2 aは核酸過剰の条件を使用した(表2)。ラウンド9 b ~ 1 4 iでは競合剤(酵母t R N A及びヘパリン)を使用した。フィルターは、ラウンド9 b ~ 1 2 dでは1 0 ~ 1 5 m LのH B S M C K緩衝液で、ラウンド1 3 i ~ 2 2 aでは増加量(5 ~ 5 0 m L)のH B S M C K、0 . 5 M尿素で洗浄した。

【0053】

核酸リガンドプールの配列決定

核酸プールは、Fitzwater and Polisky (1996) Meth. Enz. 267: 275-301に記載の通りに配列決定した。

【0054】

リガンド特異的逆転写P C Rを使用する核酸リガンドプールのスクリーニング
様々なプール由来の核酸をクローン「特異的」プライマー(リガンド1 4 i - 1 に対してM L - 8 5 (配列番号1 6)及びリガンド2 1 a - 2 1に対してM L - 8 1 (配列番号1 8))を用いて1 2、1 5又は1 8サイクルの間、逆転写した。純粋な核酸リガンドと、1 0 %、3 %、1 %、0 . 3 %又は0 . 1 %のリガンドを含有するラウンド0の4 0 N 7核酸の混合物を同じように処理し、核酸プールのR T - P C Rからのシグナルを定量するのに役立てた。

【0055】

核酸リガンドのクローニング、スクリーニング及び配列決定

核酸リガンドは2種の方法を使用してクローニングした。1つの方法では、製造業者の教示に従いリガンドをp C R S c r i p tへ直接クローニングし、大腸菌株のX L - 1 B l u e M R F ' K a nを形質転換させた。他の方法では、プ

ライマーのML - 34 (配列番号11) 及びML - 78 (配列番号12) を使用するPCRにより二本鎖DNA転写テンプレートを増幅させ、BamHI及びEcoRI制限酵素で消化し、BamHI及びEcoRIで消化されたpUC9へクローニングした。この連結反応物で大腸菌株のDH5 α を形質転換させた。アンピシリンプレート上でコロニーを選択し、ベクター特異的プライマー(RSP1 (配列番号13) 及びFSP2 (配列番号14)) を使用するPCRにより挿入物についてスクリーニングした。典型的には、クローンの90%~100%が挿入物を有した。いくつかのコロニー又は核酸プールも、すでに単離されたものとは異なるクローンを同定する試みにおいて、14i-1、21a-4又は21a-21のリガンド特異的プライマー(それぞれ、ML-79 (配列番号17)、ML-81 (配列番号18) 及びML-85 (配列番号16)) を使用してスクリーニングされた。

【0056】

QIAprepスピンミニプレップキット(QIAGEN社、バレンシア、CA) 又はPERFECTprepプラスミドDNAキット(5'3'社、ボールダー、CO) を使用して、形質転換体由来のプラスミドミニプレップを調製した。BigDyeキット及び配列決定プライマー(RSP2) を用いて配列決定反応を実施した。この配列決定用生成物をABIモデル377シーケンサーで分析した。

【0057】

核酸リガンドの境界部分

TGF β 2に結合し得る最小リガンドの境界部分(5'及び3'末端)を実質的にFitzwater and Polisky (1996) Meth. Enz. 267: 275-301に記載の通りに決定した。用いたタンパク質の濃度は0、1 nM及び10 nMであり、核酸/タンパク質の比率は1であった。この実験に使用した結合緩衝液は、HB SMC、0.01% HSAであった。結合反応物を37 $^{\circ}$ Cで30分間インキュベートし、0.45 μ mのニトロセルロースフィルター(15 mm)を介して濾過し、次いで15 mLのHB SMCで洗浄した。フェノール-尿素抽出によりRNAを回収し、溶出されたRNAをグリコーゲンの存在下でエタノール沈澱させ、H $_2$ Oに

再懸濁し、等量の2×ホルムアミド色素を補充し、8%アクリルアミド、8M尿素配列決定用ゲル上で分析した。TGF β 2に結合した短鎖型RNAを、FUJIX BAS1000 phosphorimager (FUJI Medical Systems社、アメリカ)上で可視化して現像した。

【0058】

核酸リガンドの切断

完全長の核酸リガンドの短鎖型バージョンを、3種の方法で産生した。第1の方法では、大腸菌RNaseHとハイブリッド2'-OCH₃ RNA/DNAオリゴヌクレオチド(5' N7切断、3' N7切断;表1)を使用して、特定の部位で核酸を切断させた。切断SELEXについては、「切断SELEX法」と題される、米国特許出願第09/275,850号(1999年3月24日出願)に説明されていて、これはそのまま本明細書中に援用される。第2の方法では、所望のリガンド配列をコードする重複したDNAオリゴヌクレオチドをアニールし、クレノウDNAポリメラーゼにより伸張させ、次いで転写した。第3の方法では、所望の配列を有するリガンドを化学合成した。

【0059】

ヒトTGF β 群への核酸リガンドの結合

標識化RNAのニトロセルロース画分をタンパク質濃度の関数として使用して平衡解離定数を測定することによって、個別リガンドの結合活性を決定した。RNAは本体を標識化するか又はグアニル化して、次いで³²P ATP及びT4ポリヌクレオチドキナーゼで5'末端を標識化した。結合反応は、標識化RNAの濃度を0.1nM未満で一定に保ちながら、様々なタンパク質濃度(典型的には、3倍又は10倍の増加量)で設定し、37℃で10分間インキュベートした。ニトロセルロース/酢酸セルロース混合マトリックス(孔サイズ0.45μmのフィルターディスク、HAタイプ;Millipore社、ベッドフォード、MA)を介して結合反応物を濾過することによって、タンパク質-RNA複合体を非複合化RNAから分画して離した。濾過のためには、真空マニホールド(12穴、ミリポア、又は96穴、BRL)上にフィルターを置き、1~5mLの結合緩衝液を吸引することによって湿らせた。この結合反応物をフィルターから吸引し、1

~ 5 mLの結合緩衝液で洗浄し、シンチレーションカウンター (Beckmann) において計数した。h T G F 2 に対するRNAリガンドの単相平衡解離定数を得るには、結合反応：

(ここで、R = RNA ; P = タンパク質、及び K_D = 解離定数) を、平衡状態で結合したRNAの分画についての式へ変換する：

$$q = (f / 2 R_T) (P_T + R_T + K_D - ((P_T + R_T + K_D)^2 - 4 P_T R_T)^{1/2})$$

(ここで、q = 結合RNA画分 ; P_T = 全タンパク質濃度 ; R_T = 全RNA濃度 ; 及び f = RNA - タンパク質複合体の保持効率)。RNA - T G F 2 複合体のニトロセルロースフィルター上での平均保持効率は、0.3 ~ 0.8である。Ka leidagraphソフトウェア (Synergy Software、レディング、PA) を使用するデータ点の最小二乗フィッティングにより K_D 値を得た。

【0060】

リガンド間の競合

1 nMの濃度の³²P - 標識化試験リガンドを増加濃度の非標識NX 2 2 2 8 3 (配列番号114) と混合した。次いで、試験リガンドの K_D に近いと推定されるT G F 2 の量を加えた (NX 2 2 2 8 3では1 nM、21a - 21では1 nM、21a - 4では3 nM、及び14i - 1では10 nM)。この反応物をインキュベートし、濾過し、洗浄し、1回の結合反応について計数した。

【0061】

NX 2 2 2 8 3 のオフ (解離) 速度

1 nMの³²P - 標識化NX 2 2 2 8 3 を10 nM T G F 2 とともに混合し、5分間インキュベートしてタンパク質を核酸へ結合させ、次いで1000倍過剰 (1 μM) の非標識NX 2 2 2 8 3 を加えた。様々な時点で反応物を濾過し、洗浄して、依然として結合している³²P - 標識化NX 2 2 2 8 3 の量を測定した。

【0062】

偏向S E L E X

核酸リガンド21a - 21の34mer短鎖型 (NX 2 2 2 8 4 (配列番号11

5))の配列に基づいて、配列のライブラリーを構築した。DNAテンプレート(34N7.21a-21(配列番号7))の配列を表1に示す。ランダムな領域は34塩基の長さである。それぞれの位置で、ランダム化領域は、62.5%のNX22284配列と12.5%の他の3ヌクレオチドから構成される。このように、ランダム化領域はそれぞれの位置(37.5%)で突然変異を受けるが、同時に、NX22284の配列の方へ偏る。固定領域(5'N7、3'N7)は、一次SELEXについて使用されるのと同じであった。

【0063】

34N7.21a-21ラウンド0の核酸を産生するために、5'N7(配列番号2)及び3'N7(配列番号3)プライマー(表1)を使用するPCRによりDNAテンプレートを増幅した。このPCR産物を、上記のフィルター分画SELEXの節で述べたように転写した。これにより、表1(配列番号10)に示される配列をもった34N7.21a-21ラウンド0核酸プールを生じた。

【0064】

上記と、競合剤のない Fitzwater and Polisky (1996) (Meth. Enz. 267: 275-301)のフィルター分画を使用して、ヒトTGF β 2へ最もよく結合する核酸リガンドを濃縮した。タンパク質濃度は約150~300nMから50pMへ低下させた。核酸濃度は、1 μ Mから1nMへ低下させた。核酸/タンパク質の比は0.25~1.25の範囲であった。ラウンド5aのリガンドのプールをpUC9へクローン化し、上記のように配列決定した。

【0065】

TGF β 2核酸リガンドの生物活性

TGF β 2核酸リガンドの生物活性を、ミンク肺上皮細胞を用いて測定した。これらの細胞の増殖はTGF β 2により阻害される。ヒトTGF β 2をこの細胞で滴定し、³H-チミジンの取込みを測定した。細胞による³H-チミジンの取込みが90~100%阻害される点(典型的には1~4pM)を決定した。このTGF β 2の阻害量を様々な量の核酸リガンド(典型的には、3倍増加量の0.3又は1nMから1又は3 μ M)とともに使用した。典型的には、100 μ L MEM、10mM HEPES(pH7.4)、0.2% FBSにおいて、96穴

プレートに 1.0×10^5 / mLで、細胞をプレートした。4時間37℃のインキュベーション後に細胞がウェルの表面に十分付着したとき、以下のように核酸リガンドと一緒に又は一緒になく、TGF β 2を1~4 pMで加えた：96穴プレート全体でリガンドを3倍希釈工程で希釈し、次いでTGF β 2を、対照を除くすべてのウェルへ1~4 pMで加えた。細胞を16~18時間インキュベートした後に ^3H -チミジンを加え、次いでインキュベーションを、 $0.25 \mu\text{Ci}$ / ウェルでの ^3H -チミジン追加後、さらに20時間継続した。インキュベーション後、1% Triton X-100で細胞を溶解し、パックカード96穴プレートハーベスターにおいて、GF/Bフィルタープレート上で採取し、細胞DNAにおける ^3H -チミジン取込みを、Packard Top-CountのMicroScint (Packard、マリデン、CT)におけるシンチレーション計数により定量した。RNA濃度に対する最大 ^3H -チミジン取込みの比率としてデータをプロットし、Kaleidagraphソフトウェア (Synergy Software、レディング、PA) により式： $m_3 \cdot (m_0 + m_1 + (m_2)) - ((m_0 + m_1 + (m_2)) \cdot (m_0 + m_1 + (m_2)) - 4 \cdot (m_0) \cdot (m_2)) \cdot 0.5) / (2 \cdot (m_2))$ へ適合させた；ここで m_0 は競合剤RNAの濃度であり； m_1 はIC $_{50}$ であり、 m_2 はTGF β 2の濃度であり、 m_3 は最大 ^3H -チミジン取込み画分の安定水準値である。 K_i 値は、式： $K_i = \text{IC}_{50} / (1 + ([T] / K_{dT}))$ により、IC $_{50}$ 値から決定した（ここで、 $[T]$ はアッセイ中に存在するTGF β 2のモル濃度であり、 K_{dT} は、TGF β 2滴定実験により決定される、MLEC増殖の50%阻害を引き起こすTGF β 2の濃度である）。このアッセイはまた、RNAリガンドのアイソタイプ特異性を決定するためにも使用されたが、ここでは3種のTGF β のアイソタイプをMLEC複製の阻害剤として独立して使用した。

【0066】

NX22323 (配列番号121) の薬物動態特性

TGF β 2リガンドのNX22323の薬物動態特性をスプレーグドローラットにおいて決定した。NX22323を無菌PBSに懸濁させ、 -20°C 以下で保存した。動物への投与に先立って、NX22323を 0.925 mg/mL ($18 \mu\text{M}$ 、オリゴヌクレオチドの分子量と、オリゴ 0.037 mg/mL の吸

光係数を有する260nmでの紫外線吸収に基づく)の最終濃度になるまで無菌PBSで希釈した。スプレーグドローラット(n=2)に、尾静脈を介した静脈内ボラス注射によりNX22323の単回用量を投与した。イソフルラン麻酔下の静脈穿刺により血液サンプル(約400μL)を得て、EDTAコーティング管に入れた。このEDTA処理血液サンプルをすぐに遠心分離により処理して血清を得て、-20℃以下に保存した。血液サンプル採取の時点は5~2880分に及んだ。

【0067】

標準品と、ブランクラット血漿において調製した品質管理サンプル、及び血漿サンプルを、二重のハイブリダイゼーションアッセイにより分析した。ハイブリダイゼーション分析の血清サンプルを調製するために、血漿サンプル(又はサンプルの血漿希釈液)25μLを、4×SSC、0.5%サルコシル(sarkosyl)100μLへ加えた。次いで、25μLのアリコート用プレートを、カバー付き96穴プレートにおいて、磁気ビーズにコンジュゲートした24μM捕捉オリゴヌクレオチドとビオチンにコンジュゲートした28μM検出オリゴヌクレオチドを含有する4×SSC、0.5%サルコシル25μLと混合した。この混合液を45℃で1時間インキュベートした。非結合のオリゴヌクレオチドを除去し、ストレプトタビジンアルカリホスファターゼ0.1ng/μL NTT緩衝液(0.8M NaCl、20mM Tris pH7.5、0.5% Tween20)を各ウェルへ加えた後、室温で30分インキュベーションした。ストレプトタビジンアルカリホスファターゼを除去し、プレートをNTT緩衝液200μLで2回洗浄した。NTT緩衝液を除去し、DEA緩衝液(0.02% NaN₃、1mM MgCl₂、1%ジエタノールアミン(トロピクス社、ベッドフォード、MA)、pH10)50μLで置換し、34μL/mL 25mMアルカリホスファターゼの化学発光基質(Tropix社、ベッドフォード、MA)、及び20%サファイア(Sapphire)化学発光増幅剤(Tropix社、ベッドフォード、MA)/DEA緩衝液(50μL/ウェル)を加えた。このプレートを室温で20分間インキュベートし、ルミノメーターで読み取った。可変スロープのS字状用量応答非線形回帰式(PRISM、バージョン2.00、GraphPad、サンディエゴ、CA)を使用して、NX2

2323の標準曲線を適合させた。この標準曲線からサンプル及び品質管理の濃度を外挿し、希釈について較正した。

【0068】

各時点での平均血漿濃度を算出し、薬物動態分析に利用した。WinNonlinバージョン1.5 (Scientific Consulting社) を使用して、非区画と区画の両方の薬物動態分析を実行した。非区画分析では、以下の変数を算出した：0時間の点で外挿される最大濃度 (C_{max})、0時間から最終時点までの曲線下の面積 (AUCラスト)、0時間から無限時間までの曲線下の面積 (AUCINF)、終末相の半減期 ($t_{1/2}$)、クリアランス速度 (CI)、0～無限時間から算出される平均貯留時間 (MRTINF)、定常状態での分布体積 (V_{ss})、消失期の分布体積 (V_z)。区画分析の場合は、データを十分適合させるモノ指数式の最小数に基づいて、以下の変数を算出した：0時間の点で外挿される最大濃度 (C_{max})、0時間から無限時間までの曲線下の面積 (AUCINF)、分布相の半減期 ($t_{1/2}$)、終末相の半減期 ($t_{1/2}$)、分布相の指数定数 (A)、終末相の指数定数 (B)、クリアランス速度 (CI)、0～無限時間から算出される平均貯留時間 (MRTINF)、定常状態での分布体積 (V_{ss})。

【0069】

実施例2. ヒトTGF β 2に結合する核酸リガンドの単離

TGF β 2に関するいくつかのSELEX実験を図1に要約されるように試みた。ニトロセルロースを通す標準濾過、スポット、表面プラスモン共鳴バイオセンサー (BIAcore)、共鳴ミラーバイオセンサー (lasys)、ポリスチレンビーズ、及びポリアクリルアミドゲルシフトを含む、いくつかの分画法をSELEXの経過の様々な段階で適用した。本明細書に記載されるスポットSELEX、表面プラスモン共鳴バイオセンサーSELEX、及びフィルター分画SELEX (競合剤を含む) の組み合わせがアフィニティーにおける最良の全体的な改善 (約>1000倍) を有したので、詳しく説明する。さらに、共鳴ミラーバイオセンサー技術を利用する、このSELEXの派生法についても説明する。

【0070】

スポットS E L E X条件

ヒトTGF β 2についてのS E L E X法を開始するのにスポットS E L E Xを選択したのは、それにより多量のタンパク質及び核酸が相互作用することが可能になり得るからである。使用される条件を表3に示す。ラウンド1の結果は良好であった。バックグラウンドが非常に低く、ノイズに対するシグナルの比は5であった。この点で、第1ラウンド由来の集合物を、スポット分画法で継続することに加え、表面プラスモンS E L E Xに使用した。表3に要約されるように、10ラウンドのスポットS E L E Xを完了させ、このプールのアフィニティーの約30倍という適度な改善が観察された。これらのプールはそれ以上分析しなかった。

【0071】

表面プラスモン共鳴バイオセンサー(spr)S E L E X

表面プラスモン共鳴バイオセンサーを分画の中間として選択したのは、それにより、センサーへ結合するごく低いバックグラウンド核酸が提供され、それで高度な濃縮が獲得され得るからである。さらに、核酸の結合及び溶出がリアルタイムでモニターされ、定量され得る。

【0072】

アミンカップリング化学を使用して、BIAcoreバイオセンサーへTGF β 2をカップルさせた。このやり方でカップルしたTGF β 2は、潜伏関連タンパク質、及び組換え可溶性TGF β 受容体に結合する。図2A及び2Bは、LAP及び組換えsRIIIで得られた典型的なセンソグラム(sensogram)を示し、ここではアビド(avid)結合の指標である k_{on} 及び k_{off} 率が観察された。表4に要約されるこのS E L E X実験の間、結合シグナルは、先ずラウンド(Rd)6のバイオセンサー上で観察され、ラウンド9まで増加し、次いでラウンド10及び11で減少した。図3は、0、4-spr、6-spr、8-spr、及び9-sprでのセンソグラムを示す。図4は、競合剤tRNAの存在下及び非存在下での、spr S E L E X由来の代表的なプールについての典型的なフィルター結合曲線を示し、これらのデータから、ラウンド9は、二相性のやり方、つまり $K_d = 30$ nMの高アフィニティーと $K_d = 160$ nMの低アフィニティーで結合

するらしい。

【0073】

生物活性アッセイでは、ラウンド0プールの K_i は約 $2.6 \mu\text{M}$ で、ラウンド9 - sprプールの K_i は約 711 nM であった(以下参照)。代表的なプールの配列分析は、そのようなプールがラウンド8までは有意な複雑性を維持する一方で、ラウンド9以後は、そのようなプールが単一の配列の方へ強く偏っていることを示した。

【0074】

ラウンド8 - sprをクローン化して、分析した。51種の異なる配列を表す全部で69個のクローンを分析した。4種の配列(No. 8.2(配列番号22)、8.3(配列番号23)、8.9(配列番号27)、及び8.48(配列番号54);表5参照)が1回以上表れ、69個のクローンのうち21個を占めた。これらの4種の配列はすべてTGF β 2に結合し、フィルターSELEXから単離されるクローン(14i-1)の2又は3塩基変異体であった(以下参照)。他の23種の配列は非結合性であるか又はフィルターに結合する配列であり(表5参照)、25個のクローンについては結合性を試験しなかった。

【0075】

共鳴ミラー(rm)光学バイオセンサーSELEX

表面プラズモン共鳴バイオセンサーで選択された核酸プールのアフィニティーがラウンド9 - sprで最高だったので、共鳴ミラー(rm)光学バイオセンサー技術を試験して、それによりこの核酸リガンドのアフィニティーをさらに増進させることができるかどうかを判定した。共鳴ミラー光学バイオセンサー技術は表面プラズモンバイオセンサー技術と同一の利点を多く提供するが、さらに、その結合はフロー条件下のチップ表面全体よりは平衡条件下のキュベット内でなされる。キュベット内部では、結合を長時間の間延長し得る。従って、核酸/タンパク質の結合反応がよりストリンジェントで選択的になり得る。

【0076】

共鳴ミラーSELEXでは、アミンカップリング化学を使用して、TGF β 2を2つのバイオセンサーキュベットへカップルさせた。一方のキュベットではT

G F 2をSDS変性により不活性化し、このキュベットをバックグラウンドの評価に役立てた。活性T G F 2を含有する他のキュベットをS E L E Xに使用した。ラウンド9 - s p rから開始し、共鳴ミラー光学バイオセンサー技術を使用して5ラウンド実施した。この共鳴ミラーS E L E Xに使用した条件とその結果を表6に示す。

【0077】

各ラウンドにつきバイオセンサーシグナルを観察した。ラウンド10 - r mから12 - r mまでの核酸プールの結合を評価した(表6;図5)。プール K_d はラウンド12 - r mまでは適度に改善したが、以降のラウンドではさらなる改善はなかった。ラウンド12 - r mのプールは、それぞれ約2 nM及び約150 nMの高アフィニティー及び低アフィニティー K_d で二相的に結合する。

【0078】

生物活性アッセイでは、ラウンド13 - r mプールの K_d は約505 nMであった。サブクローニング及び配列分析にラウンド13 - r mを選択した。配列決定した15個のクローンのうち、全15個(表7)が、もとはフィルターS E L E Xから単離した(以下参照)、クローン(14 i - 1)の1~5塩基変異体であった。

【0079】

フィルター分画S E L E X

フィルターS E L E Xの出発材料としてラウンド8 - s p rを使用した。ラウンド8 - s p rの諸特性を試験し、1)有意な分画(10%)がニトロセルロースフィルターに結合すること、2)核酸過剰の条件を使用すると、T G F 2に対する有意な核酸の結合(シグナル/ノイズ>2として定義される)が検出されないこと、及び3)ポリアニオン性競合剤の存在又は非存在下では、T G F 2に対するラウンド0の結合において有意な減少があるが、ラウンド8 - s p rでは減少がないこと、が見出された。これらの知見は、以下に述べる意義を有していた。

【0080】

競合剤の使用

ポリアニオン性競合剤(酵母 tRNA)の存在下での、ラウンド 8 - s p r 核酸の T G F 2 への結合を競合剤の核酸に対する様々な比率で試験した。ラウンド 8 - s p r 核酸では 75,000 倍過剰の tRNA が結合の 50% 阻害を生じたのに対し、ラウンド 0 の核酸プールでは 6,000 倍過剰の tRNA が結合の 50% 阻害を生じた。ヘパリンも T G F 2 への結合について RNA と競合したが、T G F 2 に対する RNA の結合を、tRNA を使用して観察されるものと同じ程度まで阻害するには約 10 倍以上のヘパリンが必要とされた。T G F 2 / RNA 結合実験では、RNA に対して 100,000 倍過剰の酵母 tRNA を含ませることによって、ラウンド 0 とラウンド 8 - s p r の結合において 100 倍の違いが検出されたが、競合剤の非存在下では、3 倍の違いが観察された。このように、適量の競合剤の存在下では、選択される核酸プールの結合は影響を受けないが、ラウンド 0 核酸の結合は実質的に低下する。T G F 2 の核酸への結合を試験するとき競合剤を含めない場合、S E L E X 法を使用して選択された核酸のアフィニティーは全体に過小評価され得る。この点で、T G F 2 は、低アフィニティーの非特異的な核酸結合活性と高アフィニティーの特異的な核酸結合活性の両方を保有することにおいて、他の「専門」核酸結合タンパク質(例えば、制限酵素、ポリメラーゼ、転写因子、など)に似ている。これら 2 種の結合形式の違いは競合剤の存在下で明らかにされ得る。競合剤はしばしば転写因子の研究において使用される。例えば、ゲルシフト実験においては、ポリ [d I - d C] ポリ [d I - d C] のような競合剤を結合反応のなかに含ませなければ、転写因子を含有する粗抽出物の、そのコグネイト部位を表すオリゴヌクレオチドへの特異的な結合を検出することは困難であり得る。

【0081】

非特異的な結合により多数のタンパク質が 1 つの核酸にしばしば低アフィニティー部位で結合することで、偽の高アフィニティーの外観を与えることがあり得る。核酸又はタンパク質の集塊上にある多数の部位に 1 つのタンパク質が結合し、核酸に結合した単一タンパク質の形状になる場合もある。T G F 2 は、「粘性性」であることがよく知られている。非特異的な相互作用の競合剤の非存在下では、T G F 2 は、主に非特異的な相互作用が関わる核酸及びタンパク質の大

きなネットワーク及び複合体を形成し得る。競合剤非存在下でのTGF 2のゲルシフト分析が上記の考えを支持するのは、TGF 2がゲル中で核酸と明確な(1対1の)複合体を形成せず、その代わりゲルの頂上でウェル内に留まるか、又は大きな不均一の核酸/タンパク質複合体を表し得るスミアーを形成するかのどちらかになるからである。

【0082】

結合曲線をなすことの意義の他にも、TGF 2の核酸結合特性はSELEXについて諸々の意義を有し得る。例えば、TGF 2による核酸の高レベルの非特異結合は、特異的な相互作用を不明瞭にすること、又は特異的な結合の相互作用にのみ関わる核酸/タンパク質複合体の単離を妨げることによって、これまでのSELEXに干渉してきた可能性がある。つまり、特異的及び非特異的な核酸の相互作用の混在が形成される核酸/TGF 2複合体のなかに存在する場合、非特異的な相互作用を消失させない限りは、特異的な相互作用についての選択が困難になり得る。いくつかのこれまでのSELEX実験における進歩の不足は、特にSELEXの初期ラウンドにおいて、特異結合部位を含有するより少数(約 $10 \sim 1000$)の高アフィニティー核酸とともに非特異的な結合部位を含有する大過剰($> 10^{12} \sim 10^{14}$)の低アフィニティー核酸による効率的な競合のためであった可能性がある。

【0083】

タンパク質過剰又は核酸過剰の条件の使用

上記の考察を仮定すれば、TGF 2のようなタンパク質では、タンパク質過剰又は核酸過剰のどちらの条件がよりよいのかという疑問が生じる。タンパク質過剰の条件は、非特異的な相互作用を促進する可能性がある。しかしながら、競合剤/核酸の比が、非特異的相互作用を十分消失させるが特異的相互作用を保持するほど十分に高い限りは、このことは問題になり得ない。タンパク質過剰を使用する1つの利点は、バックグラウンドに対する結合の比率がより良好で、バックグラウンドがより低いので、より良好なレベルの濃縮を生じ得るからである。

【0084】

核酸過剰条件が非特異的な相互作用を抑制し得ないのは、SELEXに使用さ

れる核酸プールの内部では、非特異結合核酸の特異結合核酸に対する比（これは最も重要なことである）が、核酸濃度がいくらであっても同じになってしまうからである。さらに、核酸過剰は競合剤/核酸の比を低下させることになり、それにより非特異的な相互作用を高める可能性がある。上記で論じたように、tRNAの核酸に対する比は、アフィニティー濃縮が効率的であるためには、フィルターSELEXの初期ラウンドにおいて少なくとも100,000でなければならない。このことは、核酸濃度が典型的により高い場合、SELEXの初期ラウンドにおいて技術的に困難になり得る。過剰核酸を使用する1つの利点は、一定配列のより多くのメンバーが1つのプールに示される場合があることである。しかしながら、フィルターSELEXに先行して十分な濃縮があった場合（例えば、表面プラスモン共鳴SELEXのような方法を使用すること）、おそらくはある一定配列を有する多数の代表物が存在するので、このことは問題になり得ない。

【0085】

フィルターSELEX条件

フィルターSELEXの各ラウンドで使用される条件を表15に示す。核酸/タンパク質の比、競合剤/核酸の比、フィルター洗浄緩衝液、及びフィルター洗浄容量を変化させる多数（12まで）の条件を各ラウンドにおいて使用した。典型的には、最低のバックグラウンド（<1%）と有意な結合/バックグラウンド比（>2）を生じる条件を次のラウンドについて処理した。次のラウンドに使用したSELEXラウンドのデータだけを表15に示す。

【0086】

ラウンド8 - sprのTGF β 2への結合を60%阻害すると「SELEX反応」において決定された量のtRNA競合剤（100,000倍過剰）を使用してSELEXを開始した。ラウンド9b~14iについて競合剤を含むSELEX反応を実施した。ラウンド9においてもtRNAを含めることで、ラウンド8 - spr核酸のニトロセルロースフィルターへの結合は、約10~15%から約1%へと劇的に低下した。SELEX反応では、「バックグラウンド」結合が高くなるほど、最大限可能な濃縮は低くなる。従って、フィルターSELEXの初期ラウンドにtRNAを含ませることは、二重の利益をもたらす得る。それはT

G F 2の核酸への非特異結合を消失させただけでなく、バックグラウンドを低下させることによってより高い濃縮を可能にしたのかもしれない。ラウンド15cでは、より低いアフィニティーの競合剤には核酸の結合を低下させる効果がもはやないので、使用しなかった。このことは、おそらくは核酸プールが十分な特異性とアフィニティーでT G F 2に結合したためであろう。従って、ラウンド16~22では、より伝統的な核酸過剰条件を使用することによって、推定される特異核酸を互いに競合させた。

【0087】

ラウンド15c及び16aでは、許容し得ないレベルまでバックグラウンドが増加した。この時点での代替分画法としてゲルシフト分画を検討したが、有効ではなかった。洗浄条件を変更することによって、ラウンド17aではバックグラウンドが0.2%まで低下した。ラウンド18の後では、1nM未満のタンパク質濃度と核酸過剰条件の下でS E L E Xラウンドを実施することが可能になった。あるラウンドでは、1~5nM以上の核酸濃度がバックグラウンドを低下させるのに役立つことも見出された。

【0088】

要約すると、フィルターS E L E Xの間に、タンパク質の濃度は30,000倍、つまりラウンド9bの300nMからラウンド22aの10pMまで低下した。フィルターに対するバックグラウンド結合は10%から0.1%まで低下した。タンパク質過剰条件(約100個のタンパク質/1個の核酸)を使用した場合にのみT G F 2に結合した核酸プールを、高核酸/タンパク質(>100/1)又は競合剤/核酸(>10⁷/1)過剰条件下で結合させるために選択した。

【0089】

フィルターS E L E X由来の核酸プールの結合

選択された核酸プールへのT G F 2の結合は、着実に、しかしゆっくりと、かつ不規則に改善した。出発プール(ラウンド8 - s p r ; K_d = 約500nM)に比較して、ラウンド10b (K_d = 約100nM)の結合には改善があった。ラウンド11aのアフィニティーは10bと同じであり、ラウンド12dのそ

れは約40 nMまでやや改善した。ラウンド13 i及び15 cはTGF β 2とほぼ同じ(K_d =約30)に結合したが、ラウンド14 iはより悪く(K_d =約75)結合した可能性がある。ラウンド16 aの核酸(K_d =約10 nM)は、ラウンド15 cよりやや良好に結合した。ラウンド16 aから17 a(K_d =約5 nM)由来の核酸プールのアフィニティーでは約2倍の改善があった。ラウンド18 aの核酸の K_d (約5 nM)はラウンド17 aの核酸に等しかった。ラウンド18 bから19 a(K_d =約2~3 nM)でもアフィニティーにわずかな増加があった。ラウンド20 a、21 a及び22 aのアフィニティーは約1 nMで安定していた。SELEXをラウンド22 aで止めたのは、結合/バックグラウンドの比が2未満であり、ラウンド23においてタンパク質の濃度を1~3 pMへ低下させることが技術的に困難であったからである。

【0090】

要約すると、 K_d はラウンド9 bの約500 nMからラウンド21 aの約1 nMへ改善し、フィルターSELEXでは約500倍、全SELEXでは10,000倍を超える全体的な改善をもたらした。1ラウンドあたりの平均改善は約1.6倍であった。この改善速度は、表面プラズモン共鳴技術だけを使用すれば約5ラウンド、又はフィルター分画だけを使用すれば約10ラウンドを要する場合がある平均的なSELEX実験に比較すると、遅い。

【0091】

核酸プールによる生物活性の阻害

ラウンド0、9 - spr、13 - rm、14 i、18 b、19 a、及び潜伏関連タンパク質(LAP)を、ミンク肺上皮細胞において、 ^3H -チミジン取込みのTGF β 2仲介性阻害を逆転させるその能力について試験した。その結果は、ラウンド9 - sprプールの K_i が約711 nMであったということである。ラウンド14 i、18 b、19 a及び21 aプールの K_i は、それぞれ約231 nM、309 nM、154 nM及び10 nMであった。LAPの K_i は約0.5 nMであった。

【0092】

上記の結果から、TGF β 2の阻害剤がTGF β 2 SELEXの後半ラウン

ドにおいて濃縮されたと結論づけることができる。さらに、インビボで測定されたアフィニティーとインビボで測定された阻害活性の間には一貫した相関性がある：

L A P < ラウンド 1 9 a < ラウンド 1 4 i < ラウンド 1 3 - r m < ラウンド 8 - s p r < ラウンド 0 .

フィルター S E L E X から単離された核酸リガンドクローンの配列決定

いくつかの判定基準（プール K_d 、フィルター結合バックグラウンド、結合ノイズバックグラウンド、細胞アッセイにおける阻害活性、及び S E L E X の R T - P C R 工程の間に異常な生成物がないこと）に基づいて、配列分析のためにラウンド 2 1 a をサブクローン化した。ラウンド 2 1 a 由来の 4 8 種のクローンを配列決定した。クローン 2 1 a - 4（配列番号 8 6）及び 2 1 a - 2 1（配列番号 8 7）（前の数字はクローンが最初に単離された S E L E X ラウンドを意味し、後の数字はクローン番号である）により代表される 2 つのユニークな配列を同定した（表 8）。いくつかのクローンはクローン 2 1 a - 4 及び 2 1 a - 2 1 のマイナー変異（1～6 塩基異なる）であった。クローン 2 1 a - 4 及び 2 1 a - 2 1 に特異的なプライマーを使用する P C R により 1 0 0 個以上のクローンをスクリーニングした。このうち 9 0 個はクローン 2 1 a - 2 1 様であり、9 個はクローン 2 1 a - 4 様であり、1 個は第三のユニーク配列（2 1 a - 4 8）であったが、これはニトロセルロースフィルター結合性の配列であることが示された。まとめると、ラウンド 2 1 a はほとんどすべて 2 種の配列とその配列の変異体から構成される。ラウンド 2 1 a が最終ラウンド前のものであり、この核酸プールのアフィニティー全体が 1 9 a から 2 1 a でさして改善しなかったことからすれば、このことは驚くにあたらなかった。

【 0 0 9 3 】

ラウンド 2 1 a の配列多様性が制限されていたので、他の 3 ラウンド（1 4 i、1 6 a 及び 1 8 a）も配列を決定した。単離されたより新規な配列（1 4 i - 1（配列番号 7 2）及び変異体）は 1 つだけである。2 種のフィルター結合性配列も単離された（1 6 a - 1 と 2 1 a - 4 8 の変異体）。従って、ラウンド 8 - s p r、1 3 - r m、及び 2 1 a について言えば、これら 3 ラウンドも多様な T

G F 2 - 結合性核酸リガンドを含有しなかった。

【0094】

14 i - 1、21 a - 4及び21 a - 21の配列を表8に示す。ヒトTGF 2 2についての配列のアフィニティーは、それぞれ10 nM、3 nM及び1 nMである。従って、これら3種の配列はヒトTGF 2と高アフィニティーで結合するリガンドである。

【0095】

これらのリガンドを阻害性の生物活性について試験した。14 i - 1、21 a - 4及び21 a - 21の K_i は、それぞれ約200 nM、30 nM及び10 nMである。従って、これらのリガンドは阻害性リガンドでもある。これらのプールに関して言えば、結合アフィニティーは阻害活性とよく相関する。TGF 受容体結合領域のごく近傍に存在するヘパリン結合部位の近くでTGF 2リガンドが結合する可能性がある以上、このことは驚くことではない。リガンド21 a - 21の阻害活性はまた抗体のそれにも匹敵した。

【0096】

6つのラウンド(8 - spr、13 - rm、14 i、16 a、18 a、及び21 a)由来のクローンを単離し、配列を決定した。各配列のタイプの数を表9に要約する。配列決定により分析された264個のクローンとリガンド特異的プライマー(表10)を使用するPCRベースの分析により分析された100個のクローンのうち、3種のみ異なるTGF 2リガンド配列(及びマイナー変異体)が得られた。15種の配列はフィルター結合性の配列であり、36種はフィルターにもTGF 2にもあまり結合しない核酸であった。このSELEXにおいて観察される、配列多様性における制限の程度はきわめて珍しいものである。一般には、数十の異なる核酸リガンドが単離され得るものであり、通常は、高アフィニティーの1つのリガンドはその集合の10%未満であることを見出すものである。

【0097】

13ラウンドも離れているSELEXの6ラウンドを配列決定してスクリーニングしても多様な配列のセットを生じなかったので、このプールの諸特性をさら

に検討し、どこで配列多様性が制限されるのかを決定した。選択した核酸プールの配列を決定し、リガンド特異的プライマーを使用して、核酸プールについて半定量的RT-PCRを実施した。結果を(表10)に示す。配列決定の結果とともに考慮すると、このSELEX法の間で配列多様性の制限が起こった可能性があるのは、ラウンド6-spr又は7-sprの付近であるようだ。

【0098】

クローン14i-1はラウンド6-sprで最初に検出され、ラウンド14付近で最も多くなり、後期のラウンドで頻度が減少する。クローン21a-4はラウンド14iにおける配列決定により最初に検出され、ラウンド16aで最も多量になり、ラウンド21aまでに頻度が減少する。しかしながら、21a-4は先行の数ラウンドに存在し得る。(クローン21a-4に特異的なプライマーを使用する、プールのRT-PCR分析はしなかった。)クローン21a-21はラウンド14iでは稀であり(配列決定によれば、1/104クローン未満であり; RT-PCRによれば1/200~500クローン未満と推定される)、ラウンド16aにおいてより多くなり、ラウンド18b及び21aのほとんどを構成する)。

【0099】

高度な多様性制限をもたらしたのは表面プラスモンバイオセンサーSELEXであるらしいが、このことはこの技術を使用する以前にすでに観察されている。様々な後期ラウンドがほとんど1種の配列からなる理由は明らかではない。おそらく、使用した選択条件の下ではTGF β 2に結合する配列がごくわずかな数しかないからであろう。ラウンド9で競合剤を含ませること、又はラウンド16でタンパク質過剰の結合反応から核酸過剰の結合反応へスイッチすることのように選択条件を変えれば、ラウンド21aまでに優勢なクローンとしてクローン21a-21の出現を生じたいだろう。あるプールにおいて優勢なリガンドが2ラウンドでも変化しなかったのは、選択圧力が重要だったように思われる。

【0100】

核酸リガンドの集合における変化のパターンは自然選択の理論に類似して説明され得る。初期のSELEXラウンドでは、多種多様な配列が存在するものであ

る。強い選択圧力は、配列変異を著しく、単一の配列が優勢になる点まで、狭める場合がある。しかしながら、稀なりガンドも依然として存在し、将来のラウンド、又は選択圧力における有意な変化の間に選択される可能性がある。このことはどんなS E L E X実験でも正しいが、本明細書に記載のT G F 2 S E L E X実験は極端な例であるかもしれない。配列多様性に対する制限があっても、最終的にはより良好な結合リガンドが単離され得る。リガンド21a-21がラウンド16aにおける配列決定によって最初に同定されたことに注目されたい。従って、ラウンド22にあっても、正確な選択条件の下でのみ優勢になり得る、稀な高アフィニティー核酸リガンドが存在する可能性がある。そのような稀な配列を単離する1つのアプローチは、後期ラウンドのS E L E Xの既知配列を（例えば、ハイブリッド選択、P C R産物の制限酵素消化、核酸の部位特異的R N a s e H切断により）特別に枯渇させることであろう。このアプローチは、後期ラウンドにはほとんど5種だけの異なる配列（3種のリガンドと2種のフィルター結合性配列）しか存在しなかったため、このT G F S E L E Xに十分適している。1/1000クローン未満において存在する配列を単離することは、枯渇法を使用すれば容易であろうが、配列決定又はP C Rスクリーニング法を使用すれば冗長であろう。

【0101】

これらの結果から、S E L E Xがいつ完了されるのか、及びそれが完了されたことをいかに判定すべきかについての疑問が生じる。今回のS E L E Xでは、K₀改善、及びクローン又はバルク核酸プールの配列決定のような、S E L E Xがいつ完了したかを判定するための標準的な判定基準は、S E L E Xがその可能な限りまで進行したかを判定するための良好な判定基準ではないかもしれない。しばしば、いつS E L E Xを終了しなければならないかを決定する技術上の制限（バックグラウンド、反応量、大きな表面へ少量のタンパク質が損失すること）が存在するが、これらは人為的に制限している。おそらく、今日使用されている方法では単離することが困難であるリガンドの濃縮を試みるには、あらゆるS E L E Xの最後に「枯渇S E L E X」のラウンドがなされるべきであろう。

【0102】

ヒトTGF β 2リガンドの特異性

核酸リガンドが本明細書において特許請求される応用において最も有用であるためには、それらは特定のTGF β のサブタイプについて高度に特異的であるべきである。以下に論じるようないくつかの方法により、ヒトTGF β 2リガンドの特異性を検討した。

【0103】

細胞培養生物活性アッセイを使用してTGF β 2リガンドの特異性を試験したが、ここではTGF β 2 (本明細書に記載)とTGF β 1 (「高アフィニティーのTGF β 核酸リガンドと阻害剤」と題する、1998年3月23日出願の米国特許出願第09/046,247号を参照のこと、これはそのまま参照により本明細書に組込まれる)のアプタマーの特異性を抗体の特異性と比較した。2つのタイプの抗体、即ちモノクローナル抗体と免疫精製したポリクローナル抗体を使用した。TGF β 2リガンドのNX22283 (配列番号114)は、TGF β 2タンパク質の生物活性を阻害する ($K_{i_2} = 10 \text{ nM}$) が、TGF β 1 ($K_{i_1} > 1000 \text{ nM}$) 又はTGF β 3 ($K_{i_3} > 1000 \text{ nM}$) の生物活性は阻害しないことが見出された (図6)。TGF β 2リガンドのNX22283はモノクローナル抗体のそれに同等な強度でTGF β 2の生物活性を阻害するが、この実験でTGF β 2生物活性の最も強力な阻害剤はアフィニティー精製されたポリクローナル抗体であった。

【0104】

TGF β 2リガンドの、TGF β 3に比較したTGF β 2に対する特異性を、核酸結合アッセイでも分析した。ラウンド0の40N7核酸又は完全長TGF β 2リガンドである21a-21のヒトTGF β 2タンパク質へのアフィニティーは、それぞれ $> 10 \mu\text{M}$ 又は 1 nM であった。ラウンド0の核酸又はリガンド21a-21のヒトTGF β 3タンパク質へのアフィニティーは、それぞれ $> 10 \mu\text{M}$ 又は $> 30 \mu\text{M}$ であった。従って、このTGF β 2リガンドはTGF β 3へ有意には結合しない。

【0105】

TGF β 1のリガンドである40-03 (「高アフィニティーのTGF β 核酸

リガンドと阻害剤」と題する、1998年3月23日出願の米国特許出願第09/046,247号を参照のこと)は、TGF₃と結合するが、1000倍弱いことが見出された。これらの結果は、TGF₁とTGF₃の間では共通してTGF₂には見出されないアミノ酸が1つ又はそれ以上存在している可能性があり、それでTGF₁リガンドがTGF₁及びTGF₃には結合し得るがTGF₂には結合し得ないこと、そしてTGF₂リガンドの21a-21がTGF₂には結合するが、TGF₁又はTGF₃には結合し得ないことを示す。確かに、表12において示されるように、TGF₂に見出される122個のうち19個のアミノ酸はTGF₁又はTGF₁には存在しない。これらの違いのうち3つ(TGF₂におけるLys-25、Arg-26、及びLys-94)は推定ヘパリン結合領域の内部にあり、TGF₁リガンドの結合特異性を決定するのに重要である可能性がある。

【0106】

核酸リガンドの切断

完全長の核酸リガンドの最小「短鎖型」を得ることは、それを最も少ないコストで効率的に合成し得るので、望ましい。この研究の目標は、元の長さの半分未満(<35塩基)であるが、それでも完全長リガンドとほぼ同一のアフィニティーを保持するリガンドを得ることであった。いくつかのアプローチを使用して3種のTGF₂リガンドの短鎖型を同定した。

【0107】

RNaseHとハイブリッド2'-OCH₃ RNA/DNAオリゴヌクレオチド(5' N7切断(配列番号19)、3' N7切断(配列番号20)、表1)を使用して、「切断SELEX法」と題される、1999年3月24日出願の米国特許出願第09/275,850号(これはそのまま本明細書中に援用される)に記載されるように、2'-Fピリミジン、2'-OHプリン核酸リガンドから、5'及び3'固定配列を除去した。

【0108】

次いで、すでに記載の方法(Fitzwater and Polisky (1996) Meth. in Enzymol 267: 275-301)を使用して、リガンドの「境界部分」を同定した。境界部分は

最小短鎖型の5'及び3'末端を確定する。しかしながら、境界決定では、なし得る内部欠失は同定されない。また、境界決定法の本質のために、境界が一連のピリミジンの内部にあるか、又は両端のごく近くにある場合、どちらのヌクレオチドがその境界であるかは他の方法(例えば、それぞれの候補境界位置で始まるか又は終わるリガンドの産生後にそのTGF₂への結合を分析すること)により決定しなければならない。

【0109】

使用した第三の方法は、仮定の配列境界部分を確定する推定構造モチーフに依存した。これらの境界部分に対応する人工オリゴヌクレオチドを合成し、TGF₂への結合について試験した。

【0110】

TGF₂リガンドの短鎖型を同定する第四のアプローチは、各リガンド中の配列変異の位置に注目することであった。リガンド21a-4及び21a-21では、配列変異体において起こった変化はそれらの配列全体にランダムに分布していた。しかしながら、リガンド14i-1では、変異体における配列変化はきわめて局在化していた。このことは、リガンド14-iの可変領域が結合に影響することなく変化を許容し得ること、及び可変領域全体がさして重要ではない可能性があることを暗示した。

【0111】

第五のアプローチは、予測される構造に基づいて内部欠失をつくることであった。予測されるステム内の推定バルジ、ループ、又は塩基対の部分を欠失し得る。この方法の成功は、構造モデルが真の構造にどのくらい近似しているかにまさに依存する。21a-21については、最も安定な構造は不正確であることが判明した。21a-21の内部欠失物を首尾よく作ることができたのは、真の構造により近似した構造が(偏向SELEX法を使用することによって)同定されたときだけである。

【0112】

リガンド14i-1の切断

RNaseH切断法を使用して、リガンド14i-1が3'ではなく5'の固

定配列を必要とする(表13)ことが決定された。この結果に一致して、5'と3'の両方の固定配列が除去されると、リガンド14i-1はTGF₂に結合しなかった。

【0113】

従来の境界実験により、リガンド14i-1の3'末端が39~45位の内部にあることが画定された。同じ実験で、我々は、このリガンドの5'末端には明瞭な境界を観察し得なかった。リガンド14i-1の60種の配列変異体のうち54種は、選択される配列領域の3'末端の最終16塩基の内部で起こるヌクレオチド変化を有する。この変異体のほとんどは単一塩基変化を有するが、6個もの塩基が変化したものも2、3ある。そのような変化は、結合に影響する場合もあればしない場合もある。それが結合に影響するならば、その領域は結合に重要である。より有り得るのは、それほど多くのクローンのその領域にそれほど多くの変化がある以上、それらの塩基はおそらく重要ではないということである。それらは、おそらくは隣接する3'固定領域とともに、結合に影響を及ぼすことなく欠失させることが可能であろうと推量された。この着想を以下の2つの実験結果により確認した：

1) この16塩基領域内で変化し、異なる配列変化を有する8種の配列の結合性を試験した。それらはすべて14i-1リガンドと同じくらいよくTGF₂へ結合した。

2) 3'固定領域と16塩基の可変領域を欠く、14i-1の38塩基長短鎖型(14i-1t5-41(配列番号131);表13)は、完全長(71塩基長)リガンドと同様にTGF₂へ結合した。

【0114】

14i-1t5-41において除去したもの以上に、14i-1の末端から追加の塩基を除去して、4種の配列を作った[14i-1t5-38(配列番号132)、14i-1t5-35(配列番号133)、14i-1(ML-87)(配列番号135)、及び14i-1(ML-89)(配列番号136)]。さらに、14i-1t5-41の内部欠失物を1つ作った[14i-1(ML-86)(配列番号134)]。これらのうちTGF₂へ結合するものは1つもな

かった(表13)。これらの実験結果をまとめて考えると、リガンド14I-1の境界部分は、5'末端の5~7位と3'末端の39~41位の内部に含まれることが示された。以上のすべての結果により、38塩基長である、リガンド14i-1の短鎖型が画定された(表13)。

【0115】

リガンド21a-4(配列番号86)の切断

RNaseH切断法を使用して、リガンド21a-4が3'ではなく5'の固定配列を必要とする(表14)ことが決定された。5'と3'の両方の固定配列が除去されると、リガンド21a-4はTGF₂に結合しなかった。

【0116】

リガンド21a-4の境界領域(図7)は、5'固定領域のU11位と3'末端の52~56位の内部にあり、42~46塩基長の短鎖型(表8)を画定する。このことは、21a-4がTGF₂へ結合するのに3'末端ではなく、5'末端を必要とすることを示すRNaseH切断の結果に一致する。

【0117】

仮定の構造を試験することによって、21a-4についての境界部分は5'末端のG12位と3'末端のC48位に生じると予測された。これらの位置は、境界法により画定される領域によく一致する。12位で始まり、48位で終わる(転写を開始させるのに必要とされる配列を除く)21a-4の37塩基長短鎖型[(21a-4(ML-110)(配列番号144);表14)]は、完全長の21a-4リガンドと同じくらいよくTGF₂に結合した。

【0118】

21a-4(ML110)の3'末端からさらに4個の塩基を除去する、21a-4(ML-111)と呼ばれる配列を作った。21a-4(ML-111)の結合は21a-4(ML-110)に比較して30倍低下した。さらに、21a-4(ML-110)の内部欠失物を3種[21a-4(ML-92(配列番号141)、ML-108(配列番号142)及びML-109(配列番号143)]作った。これらはいずれもTGF₂にあまり結合しなかった(表14)。21a-4(ML111)の3'末端へ2つの塩基を加えた配列[21a-4

(ML-91)(配列番号140)は、21a-4(ML110)に比較して、改善された結合を有さなかった。このようにして、結合性を保持し、42塩基長である、リガンド21a-4の最小短鎖型が同定された。

【0119】

リガンド21a-21(配列番号72)の切断

RNaseH切断法を使用して、リガンド21a-21は、5'ではなく、3'固定配列を必要とする(表11)と結論された。しかしながら、5'と3'の両方の固定配列を除去すると、リガンド21a-21はTGF₂へ結合した。このことは、3'末端だけの除去により結合性が消失するので、矛盾するように見える。しかしながら、このデータは、3'欠失によりTGF₂に結合しない構造へ折りたたまれるのに対し、両端を欠く短鎖型は行き止まりの(dead end)構造へは折りたたまれないことを意味すると解釈され得る。実際、Mフォールド構造の予測はこのことが起こり得ることを示す。

【0120】

リガンド21a-21の境界部分(図7)は、5'末端のG21位と3'末端の50~55位の内部にあり、30~35塩基長である短鎖型を画定する。この結果は、21a-21がTGF₂へ結合するのに5'末端も3'末端も必要としないことを示すRNaseH切断のデータに一致する。境界部分により同定される短鎖型は、RNaseH切断により画定されるその内部に完全に含まれる。

【0121】

推定構造に基づいた合成配列も表11に要約されるように試験した。上記の実験からの結果は、RNaseHと従来の境界実験の結果に一致している。

21a-21(ML-95)の追加の末端短鎖型と内部欠失物をいくつか作った(表11)。9種の末端短鎖型には、21a-21(ML-96)、21a-21(ML-97)、21a-21(ML-103)、21a-21(ML-104)、21a-21(ML-105)、NX22286、NX22301、NX22302及びNX22303が含まれた。これらのなかで、21a-21(ML-95)と同じくらいよく結合するのは、5'末端で1塩基除去した、NX

22301 だけである。内部欠失物には、21a-21 (ML-99)、21a-21 (ML-101)、21a-21 (ML-102)、21a-21 (ML-114)、21a-21 (ML-115)、21a-21 (ML-116)、21a-21 (ML-118)、21a-21 (ML-120)、21a-21 (ML-122)、21a-21 (ML-128)、21a-21 (ML-132)、21a-21 (ML-134)、21a-21 (ML-136) 及び 21a-21 (ML-138) が含まれた。これら 14 種の内部欠失物のなかで、21a-21 (ML-95) とほぼ同じくらいよく結合したのは 21a-21 (ML-130) だけである。

【0122】

21a-21 (ML-95) よりも長い 3 種の配列 [21a-21 (ML-94)、NX22283 及び NX22285] を作った。これらのなかで、21a-21 (ML-95) よりも (かるうじて) よく結合したのは NX22285 だけである。従って、TGF β 2 に結合する最短のリガンドとして同定されたのは、34 マーの NX22284 である。

【0123】

NX22283 及び NX22284 は、それぞれ、転写されたりガンドである 21a-21 (ML-94) 及び 21a-21 (ML-95) の合成類似体であり、同一のアフィニティーで TGF β 2 へ結合した (表 11)。この合成核酸はまた、その転写された類似体と同じ阻害性の生物活性を有する ; 一方、短い、30 塩基長の NX22286 とその転写された類似体の 21a-21 (ML-96) は TGF β 2 に結合せず、TGF β 2 生物活性を阻害しない。従って、合成核酸はその転写対照物と同じ諸特性を有する。

【0124】

要約すると、完全長のリガンドと同じくらいよく TGF β 2 に結合する、短鎖型 14i-1、21a-4 及び 21a-21 のリガンドが同定され、それぞれ 38、37 (転写収率を改善するために加えた 5 塩基を除く)、及び 32 塩基長である。NX22284 短鎖型リガンドを短縮する試みにおいて、24 種の配列 (8 種の単一塩基欠失物と 16 種の複数塩基欠失物) が作られた。これらのなかで

TGF β 2に結合するのは2種(21a-21(ML-130)及びNX22301)だけである。従って、NX22284にある構造要素の配列及びスペーシングは、結合が起こるように維持されているに違いないと思われる。

TGF β 2への結合についてのリガンド間の競合

あるタンパク質への結合について様々なリガンドが互いに競合する能力を試験すると、リガンドがタンパク質の同一な(又は重複している)領域、又は明瞭に異なる領域のいずれに結合するのかを示すことができる。

【0125】

リガンド21a-21(配列番号87)の短鎖型である、NX22283(配列番号114)(表11)が、4種のリガンド(14i-1(配列番号72)、21a-4(配列番号86)、21a-21、及びNX22283)と競合する能力について試験した。結果は、NX22283はそれ自身と最もよく競合し、次いで、21a-21、21a-4及び14i-1と効果が減少して競合するということであった。このように、NX22283の競合する能力は、その配列が試験リガンドの配列にどのくらい関連しているかに相関する。NX22283はそれ自身に最も密接に関連していて、それ自身と最もよく競合する。NX22283は21a-21の短鎖型であり、21a-21と二番目によく競合する。21a-4の配列は21a-21にあまり関連していない可能性があり、NX22283は21a-4と三番目によく競合する。リガンド14i-1の配列はNX22283に関連していないので、NX22283は、14i-1とまったく競合し得ない。

【0126】

他のリガンドの結合を50%阻害するのに必要とされるNX22283の濃度範囲は10倍であった。他のリガンドと競合するのに要するNX22283の量にこのような違いがあることはそのアフィニティーにおける違いに帰すことができるので、これらリガンドのTGF β 2上の結合領域にはおそらく1つのタイプしか存在しない。しかしながら、TGF β 2のホモ二量体には1つ又はそれ以上の類似部位が存在し得る。(HIV-1 gagタンパク質の場合のように; Lochrie et al. (1997) Nuc. Acids Res. 25: 2902-2910) TGF β 2上に、2つの

異なるタイプの核酸結合部位が存在するとすれば、第二の異なる部位で結合するリガンドを競合して追い出すには、1000倍を越すだけの競合剤（即ち、ラウンド0の核酸の K_d とNX22283の K_d との違い）を要するはずである。このことは観察されなかった。

【0127】

NX22283のオフ速度 (off-rate)

NX22283 - TGF₂ 複合体の半減期は、2種の実験で0.5分又は3分と測定された。ほとんどすべてのリガンドは60～75分でTGF₂から解離した。上記の時間は短いように思われるが、それらは、フィルター分画SELEXにより単離された核酸リガンドのインビトロオフ速度測定にはよくあることである。

【0128】

実施例3．偏向ラウンド0ライブラリーを使用するSELEX法により単離された核酸リガンド

偏向SELEXは、結果をあるアウトカムのほうへ偏らせるように核酸プール内の配列が変化されるものである。「偏向」SELEXの主要な目標は、より高いアフィニティーを有するリガンドを得ることと、リガンドの推定二次構造がどんなものであり得るかを決定することである。TGF₂の偏向SELEXに使用される、出発の、ラウンド0核酸ライブラリー（34N7.21a-21と呼ばれる）は、先行のTGF₂ SELEXと同じ5'及び3'固定領域（5' N7及び3' N7）を有した（表1）。それは、2'-Fピリミジン、2'-OHプリン核酸として作られた。しかしながら、実施例1に記載のように、ランダム領域は34塩基長であった。このランダム化配列の内部で、ヌクレオチドの62.5%は、各位置でNX22284（配列番号115）配列に対応する。残る37.5%は、他の3種のヌクレオチドに対応する。このように、各位置を突然変異させ、このプールの配列をNX22284配列の方へ偏らせる。そのようなプールを使用してTGF₂へ結合するリガンドについて選択することによりNX22284の変異体を単離することが可能になり、そのなかには元の30N7ラウンド0プールには存在しなかったかもしれないものがある。

【0129】

ラウンド0 34N7 . 21a - 21プールのバルクK_dは、タンパク質過剰の結合条件を使用すると、約870 nM (表15)であった。これは、予測されるように、非偏向ラウンド0 40N7プールに対してより少なくとも10倍良好である。このラウンド0核酸プールは小スケールのSELEXタイプ反応において核酸過剰の条件下でも結合したが、予測されるように、タンパク質過剰条件でよりも不良であった。この偏向SELEXの進展を表15に示す。

【0130】

偏向SELEXにおいて使用された条件とその結果を表15に示す。全部で9ラウンドを実施した。ラウンド4で開始し、競合剤を使用することによってより高いアフィニティーのリガンドを得るための試みがなされた。酵母tRNA (低アフィニティー) とNX22284 (高アフィニティー) の両方が競合剤として使用された。いずれもSELEXのPCR工程の間は増幅不能である。「A」系列を競合剤なしで実施したのに対し、「B」系列は競合剤とともに実施した。

【0131】

この核酸プールのTGF β 2への結合性をラウンド0~8について測定し(表15)、ラウンド0核酸ライブラリーの約870 nMからラウンド5a核酸プールの約1 nMへ改善したことが見出された。競合は、このSELEX実験においては、アフィニティー改善に対してほとんど一貫した効果を及ぼさないように思われた。おそらく、競合はラウンド1のNX22284で開始されたはずである。プールアフィニティーにおけるピーク改善は、ラウンド5、6及び7、及び8で安定水準に達した。それ故に、最高アフィニティーを有する最も早いラウンドである、ラウンド5aをサブクローン化し、配列を決定した。

【0132】

偏向SELEXから得られたTGF β 2核酸リガンドの配列

表16に示されるように、25種のユニーク配列を入手した。出発配列から1~9個の変化が見出された。このクローンはすべて選択される配列の内部で34塩基長であって、種々の試験結果と一致し(上記の「リガンド21a - 21の切断」を参照のこと)、内部の塩基を欠失させることが難しかった。

【0133】

位置の対間の共変異 (covariance) を視察とコンセンサス構造マトリックスプログラム (Davis et al. (1995) Nucleic Acids Research 23: 4471-4479) を使用することによって分析した。2種の異なる領域の間に共変異が観察され、この構造に2つのステムが存在することを暗示した。共変異のパターンは、図8に示される構造モデルか、又はその構造に似た変異体 (例えば、ループの内部でいくつかの塩基対合が起こり得るもの) を示唆する。この予測された構造は、Mフォルドプログラム (Zuker (1989) Science 244: 48-52) により予測される三番目に安定な構造である。可能な共変異の奇妙な例がループ領域の15及び25位に観察される。A15及びG25は、2種のクローン (#18及び#29) においてC15及びU25へ共変異することが観察された。リガンド21a-4も推定ループの底部にC/Uコンビネーションを有する。

【0134】

34個の塩基のなかで、11個はこれら25種のクローンのなかで「不変」である (表16)。この不変位置のすべては、最終ヌクレオチドであるC34以外のループ及びバルジ領域に存在すると予測される。全3種の短鎖型TGF₂リガンド (図8) の最終塩基はCである。このCを除去すると、結合性の喪失を生じる。不変位置が、TGF₂がNX22284リガンドに結合する領域を示すならば、結合は主にバルジ及びステムループの領域で起こる可能性がある。このステムは塩基対合しているはずであるが、配列は変化する可能性があり、ステムの構造がその配列より重要である可能性があることを暗示する。このステムは、TGF₂に結合するのに適切な配向においてバルジ、ループ及びC34ヌクレオチドを提示するために使用される構造である可能性がある。

【0135】

偏向SELEX由来のクローン5a-11は、特に偏向SELEX由来のクローンにおいて不変である位置において、一次SELEX由来のクローン21-4に類似していて、新たな構造モデルと不変位置の重要性をさらに裏付ける。リガンド14i-1を類似の構造へ適合させることはできなかった。おそらく、それはTGF₂に結合し得る第二の配列モチーフを表すのだろう。

【0136】

偏向S E L E Xから単離された核酸リガンドの結合性

偏向S E L E X由来のクローンの結合性を完全長リガンドである21a-21の結合性と比較した。このクローンの大部分は21a-21と同じくらいよくTGF β 2に結合した(表16)。1つのクローン(#20(配列番号160))は、完全長リガンドの21a-21より約6倍不良に結合し、1つのクローン(#13(配列番号154))は、それより約5倍良好に結合した。これらクローンの(一回以上見出されたクローンを加重した)平均 K_d は1.2 nMであり、ラウンド5aプールの K_d である約1 nMに一致する。このように、上記の方法で単離されたりガンドは、アフィニティーにおいて、出発配列からさして大きく異なっていないかった。

【0137】

より高いアフィニティーリガンドを生じる最適な変化数があることが期待される。ごくわずかな変化しか有さないクローンは、出発配列とほぼ同じくらいに結合し、閾値数の変化を有するクローンはより良好に結合する可能性があり、あまりに多くの変化を有するクローンはより不良に結合すると予測される。実際、変化数とアフィニティーの間には相関性があるかもしれない。1~4個の変化を有するクローンはリガンド21a-21と同じか又はより不良に結合する傾向がある。5~8個の変化を有するクローンはリガンド21a-21より良好に結合する傾向がある。最も不良な結合物(#20)は、最も多くの変化(9個)をもつものであった。TGF β 2と最も良好に結合したクローン(クローン#13)は、出発配列に対して7個の変化を有していた。

【0138】

より良好に結合したクローンとより不良に結合したものとを並置すると(表17)、より高いアフィニティー結合には5位のAが重要である可能性がある。なぜなら、TGF β 2に最もよく結合するリガンドはすべて5位にAを有し、5位にAを有するすべてのクローンは少なくとも21a-21と同等に結合するからである。対照的に、5位にU、C又はGを有するクローンは21a-21より不良に結合する傾向がある。推定ステムにおける塩基対変化のパターンに関しては

、より良好な結合に相関する単一の変化はない。さらに、より良好な結合物は、GCリッチなステムを一貫して有するわけではない。しかしながら、不良な結合物のステムにおける変化のパターンは、より良好な結合物のステムに見られものと重複しない。このように、様々なステム配列が微妙な理由でより良好な結合をもたらす可能性がある。

【0139】

完全長21-21転写物(21a-21(ML-107);表11)の結合を消失させた点突然変異は、6位のUをGへ変化させる。偏向SELEX由来の3種のクローン(#4、9及び35)では6位にGが見出され、そのうち1つ(クローン#4)は他に1つしか塩基変化を有さないが、他のクローンには追加の変化があった。6位にGを有する、偏向SELEX由来の3種のクローンはすべてTGF₂に結合する。従って、U6G変化だけで結合を消失させるが、この結合の欠損は、他の配列変化と組み合わせられると復帰され得ると考えられる。

【0140】

要約すると、独立して作用し、それだけでより良好な結合を与え得る場合がある(5位のAのような)変化もあれば、他の変化も存在することに依存する、より予測不能なやり方で結合に影響を及ぼし得る変化(例、6位での変化やステム内の変化)もあることになる。

【0141】

おそらく、「不変の」ヌクレオチドを欠く配列はTGF₂に結合しないだろう。不変塩基のいくつかを欠失させ、他のものは変化させた(表11)。これら10種の変更された配列[21a-4(ML-111);21a-21(ML-96,97,101,102,103,104,105,120,NX22286)]は、いずれもTGF₂に結合しない。

【0142】

実施例4.NX22284において2'-OHプリンを2'-OCH₃プリンで置換すること

2'-OHプリンを2'-OCH₃プリンで置換すると、血清及び動物内でより長い半減期を有する核酸リガンドを時々生じる。本明細書に記載の核酸リガン

ドは最終的には診断薬、治療薬、造影剤、又は組織化学試薬としての使用に意図されるので、リガンドNX22284において2'-OCH₃プリンで置換され得る2'-OHプリンの最大数を決定した。NX22284は、70塩基長の21a-21TGF₂リガンドの34mer短鎖型である(表18)。NX22284は17個の2'-OHプリンを有し、リガンド21a-21より約2倍不良に結合する。

【0143】

初めに、すべて2'-OCH₃プリンで置換した配列(NX22304)を合成した。もう1つの配列は、その5'末端にある6個のプリン以外をすべて2'-OCH₃プリンで置換した2'-OHを有する。いずれもTGF₂に結合しなかったし、測定し得る生物活性を有さなかった(表18)。

【0144】

従って、3又は4個の2'-OHプリンの群が2'-OCH₃プリンで置換されたような1組の配列(NX22356~NX22360;表18)を合成した。NX22357の結合は約2倍低下し、生物活性は10倍低下した。NX22356、NX22358及びNX22360の結合性及び生物活性は影響を受けなかった。対照的に、NX22359の結合性は100倍以上低下し、その生物活性は30倍以上低下した。従って、NX22359内のどの個別プリンが2'-OCH₃プリンになり得ないかを決定するために、NX22359の配列を1つの塩基で一度「脱らせん(deconvoluted)」させた。NX22374、NX22375及びNX22376はNX22359の脱らせん体(deconvolutions)である。これら3種の配列はすべて結合性及び生物活性が大きく低下した。このことは、G20、A22、及びA24が2'-OCH₃プリンになり得ないことを示唆する。

【0145】

中間数の2'-OCH₃プリンを有する配列がTGF₂に結合し、生物活性を保持し得るかを決定するために、NX22377を設計した。NX22377は、(NX22356、NX22357及びNX22360内の2'-OCH₃プリンを表す)17個のうち10個の2'-OCH₃プリンを有する。NX22

377の結合性及び生物活性は、NX22284と同一である。

【0146】

結合性及び生物活性を保持するにはG20、A22及びA24が2'-OHプリンでなければならないという可能性を検証するためにNX22417を設計した。NX22417では、G20、A22及びA24が2'-OHであるが、他の14個のプリンは2'-OCH₃である。NX22417はNX22284と同じくらい良好にTG F₂に結合するが、その生物活性は約10倍低下している。G20(NX22374)又はA24(NX22376)の置換だけではA22(NX22375)の置換ほどは重大な効果を及ぼさなかったので、A22位(NX22384を参照のこと)又はG20及びA22位(NX22383を参照のこと)以外ですべて2'-OCH₃プリンを有する核酸を合成した。NX22383及びNX22384はTG F₂に結合することもそれを阻害することもなく、結合性及び生物活性を保持するには、20、22及び24位の少なくとも3つのプリンが2'-OHでなければならないことを再び示唆した。

【0147】

質量分析法によりNX22384を分析し、その結合性及び阻害活性の不足が不完全な脱保護化や不正確な配列によるものではないことを確かめた。この結果は、NX22383が予測される分子量より0.5~0.9ダルトン多い可能性があり、従ってそれがあるべきものである可能性がきわめて高いということである。

【0148】

NX22357はNX22284よりもわずかに不良にTG F₂へ結合したが、10倍も低下した生物活性を有したので、NX22357にある3個の2'-OCH₃プリン(G5、A8又はA11)の1つ又はそれ以上が生物活性にも必要とされ得ることが考えられた。NX22420及びNX22421を合成することによって、この考えを検証した。NX22421は、(2'-OH基を必要とする、G20、A22及びA24とともに)これら塩基の3つ(G5、A8及びA11)すべてを2'-OHプリンとして有する。NX22420は、(G20、A22及びA24とともに)A8を2'-OHプリンとして有する。NX

22421は、(G20、A22及びA24とともに)G5、A8及びA11を2'-OHプリンとして有する。NX22420とNX22421の両方でA8を2'-OHプリンとして保持したのは、偏向SELEX由来のクローンのなかでそれが不変であって、従って、(G20、A22及びA24の場合と同様に)2'リボース位置で変化することにA8が耐えられない可能性があるかと推量されたからである。実際、NX22420とNX22421は両方ともNX22284とほぼ同じ結合性及び阻害活性を有した。要約すると、NX22284配列は、4個のプリン(A8、G20、A22及びA24)が2'-OHであり、他のプリンが2'-OCH₃であるときに最大の結合性及び阻害活性を保持し得る。偏向SELEX法を使用して単離されたクローンのなかでこれら4個の位置がすべて不変であることに注目すること。

【0149】

NX22284の2'-OHプリンを置換することに関する試験がなされている間に、転写物のようにTGF β 2へ良好に結合する、NX22284のより短いバージョン2種(21a-21[ML-130]及び21a-21[ML-134];表11)が発見された。これらの配列へ、NX22420の2'-OCH₃プリン置換パターンを移した。NX22426は21a-21(ML-134)の2'-OCH₃プリン類似体であり、NX22427は21a-21(ML-130)の2'-OCH₃プリン類似体である。NX22426はTGF β 2に良好に結合したが、25倍低下した生物活性を有した。NX22427はNX22284よりわずかに良好な結合性及び阻害活性を有した可能性がある。

【0150】

要約すると、アフィニティー、短い長さ、及び阻害活性の最良の組み合わせを有するスポット、spr、及びフィルターSELEX法を合わせて使用することによって単離されたヒトTGF β 2のリガンドはNX22427であり、全16個のプリンのうち12個で2'-OCH₃プリンを有する32マーである。NX22385において2'-OHプリンを2'-OCH₃プリンで置換すること

偏向SELEX法を使用して単離されたりガンドのいくつか(例えば、クロー

ン13)は、TGF β 2へより良好に結合した。

【0151】

短鎖型クローン13の諸特性を短鎖型21a-21に比較するために、NX22385を合成した。NX22385(表19)は34塩基長で、偏向SELEXクローン#13の2'-Fピリミジン、2'-OHプリンバージョンである。それは、対応する34塩基長の21a-21短鎖型であるNX22284より約2.5倍良好に結合するが、その阻害活性は約4倍不良である。

【0152】

前節で述べた理由により、短鎖型クローン13tの諸特性が、2'-Fピリミジン、2'-OCH₃プリンの核酸として合成されたとき(どうなるかを)決定することは興味深かった。21a-21の短鎖型であるNX22420の2'-OCH₃パターンに基づいて、NX22385の2種の2'-OCH₃プリンバージョン(NX22424及びNX22425;表19)を合成した。いずれの核酸でも、NX22420におけるように、A8、G20、A22及びA24は2'-OHプリンとして保持された。NX22424では、クローン13にユニークであるプリン(A5、A6及びG12)は2'-OHプリンである。NX22425では、それらのプリンは2'-OCH₃プリンである。A24(NX22386)又はG20及びA24(NX22387)が2'-OCH₃プリンである、NX22424及びNX22425の類似体も合成した。NX22386及びNX22387は、NX22387のG20又はA24が2'-OCH₃であるバージョンが不活性だったので、陰性対照として役立つと予測された。予測されたように、NX22386及びNX22387はTGF β 2に結合せず、それを阻害もしなかった。NX22424とNX22425はNX22284と同様にTGF β 2に結合したが、生物活性においては100倍より多く低下した(表19)。従って、NX22284と同じくらい良好に結合する他の配列が単離されたが、より良好な生物活性を有する他の配列は同定されなかった。

【0153】

実施例5 . NX22323の薬物動態特性

NX22323はNX22284の5'-ポリエチレングリコール修飾バージ

オンである(表11; 図9を参照のこと)。NX22323の血漿濃度をラットにおいて48時間にわたり測定し、表20及び21の対応する薬物動態変数とともに図11に示す。上記のデータは、NX22323の血漿からの二相性クリアランスを明示し、初期クリアランス半減期($T_{1/2}$)は1時間、終期クリアランス半減期($T_{1/2}$)は8時間である。定常状態での分布容積は約140 mL/kgであり、このアプタマーの大部分が血漿と細胞外の水に残存する、ごくわずかな分布であることを示唆した。コンパートメント分析により決定されたクリアランス速度は0.40 mL/(分·kg)であった。この値は同様の化学組成を有する他のアプタマー(5'-PEG40k、3'-3'dT、2'Fピリミジン、2'-OHプリン)の核酸)と一致していた。上記のデータにより、有効性の評価にNX22323を毎日投与することが支持される。

実施例6. リード短鎖型リガンドであるCD70の2'OMe修飾

TGF- β 1の核酸リガンドは、「切断SELEX法」と題される、1999年3月24日出願の米国特許出願第09/275,850号(これはそのまま参照により本明細書に組込まれる)に開示されている。ハイブリダイゼーションによる切断SELEXによりリードアプタマーを産生し(表11、米国特許出願第09/275,850号のファミリー4、リガンド#70を参照のこと)、本明細書ではCD70と呼んだ。表22に要約されるように、様々な位置に2'OMe修飾を含有する、CD70の誘導体オリゴヌクレオチドを合成した。この結果は、16個のプリンのうち13個が、活性を失うことなく、その2'OMe対照物で置換され得ることを示唆する。最大数の2'OMe修飾を有する分子(CD70-m13)も生物活性である(表22)。図10は、CD70-m13(配列番号206)の推定構造と2'OHヌクレオチドの存在を必要とする位置を示す。興味深いのは、この分子の3'末端にあるAの位置であり、これは提起された構造によれば、二次構造に参加しない。この一本鎖のAを欠失させるとこの分子の結合活性にやや影響を及ぼすが、それによりその生物活性が完全に消失される(表22)。2'OH塩基と最終3'のAはこの提起された構造においてごく近接している。このことは、ターゲット結合の原因となるこの分子のドメインを示唆する。上記の状況では、提起された構造(図10)の頂点に示されるループは

結合に必要でないかもしれない。このことは、そのようなループをPEGリンカーで置換し、そのような修飾された分子が結合性を保持することを示すことによって、確かめられた(表22)。PEGリンカーは、「血小板由来増殖因子(PDGF)核酸リガンド複合体」と題する、1997年12月16日出願の米国特許出願第08/991,743号(これはそのまま参照により本明細書に組込まれる)に示されるように、このアプタマーとコンジュゲートしていた。上記の実験から同定された最短の結合アプタマーは、(PEGリンカーを含む)34マーのCD70-m22(配列番号215)である。

【0154】

実施例7. ミンク肺上皮細胞(MLEC)PAIルシフェラーゼアッセイ

TGF β 2の生物学的活性にインビトロで干渉するTGF β アプタマーの能力を試験するために、MLEC PAIルシフェラーゼアッセイを実施した。TGF β によるPAIプロモーターのアップレギュレーションの直接測定を可能にするPAI/ルシフェラーゼ構築体で、ミンク肺上皮細胞をトランスフェクトした。TGF β 1とTGF β 2は両方ともPAIプロモーターをアップレギュレートすることができる。PAI/ルシフェラーゼの発現を刺激すると、ルシフェラーゼの基質であるルシフェリンが存在する場合に、定量可能な光放出を生じる。P₆₋₁₅の間にあるMLEC-PAI-Luc細胞を、10mM HEPES及び0.2% FBSを補充したMEM(MEM-S)において、ウェルあたり3x10⁴個の細胞でプレート培養し、4~5時間付着させた。MLECとのインキュベーション用に、阻害剤(抗体又はアプタマー)のMEM-Sでの連続希釈液(1:3)を調製した。2つのウェル列を、各TGF β と未処理対照群のために維持した。未処理対照細胞以外の各ウェルへTGF β (1又は2)を10pM又は20pMまで加え、細胞を15~16時間インキュベートした。TGF β の刺激後に、MEM-SをCa²⁺及びMg²⁺各1mM補充したDPBSに置き換えた。製造業者の指示により、細胞をLuc-Liteキット(パッカード・インスツルメンツ)で処理した。10分間の暗順応の後で、相対ルシフェラーゼ活性を化学発光検出(Top Count, パッカード・インスツルメンツ)により決定した。データはCPS(カウント/秒)として作成した。この結果を図12及び

13に示す。これらの図から、いずれのTGF アプタマーもそのそれぞれのサイトカインの生物活性に干渉することが明らかである。これらの実験における見かけの K_i は約200 nMである。

【0155】

【表1】

SELEXの間に使用された配列

(いずれも5'から3'の方向で示され、10塩基ごとにブランクによって区切られている)

SELEX法に関わる配列

(P0; スポットSELEXのラウンド0用DNAテンプレート)

TCGGGCGAGT CGTCTGNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
NNNNNNCCGC ATCGTCCTCC C 71 (配列番号1)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT; N=dA, dC, dG又はdTの各25%

(5' N7; SELEXのPCR工程において使用したプライマー)

TAATACGACT CACTATAGGG AGGACGATGC GG 32 (配列番号2)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(3' N7; SELEXのRT及びPCR工程において使用したプライマー)

TCGGGCGAGT CGTCTG 16 (配列番号3)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(スポットSELEXのラウンド0用転写テンプレート)

TAATACGACTCACTATAGGGAGGACGATGCGG-40N-CAGACGACTCGCCCGA
(配列番号4)

ATTATGCTGAGTGATATCCCTCCTGCTACGCC-40N-GTCTGCTGAGCGGGCT
(配列番号5)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT; N=dA, dC, dG又はdTの各25%

(R0 40N7; スポットSELEXのラウンド0用核酸ライブラリー)

GGGAGGACGA UGCGGNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
NNNNNCAGAC GACUCGCCCG A 71 (配列番号6)

A=2'-OH A; C=2'-F C; G=2'-OH G; N=2'-OH A, 2'-F C, 2'-OH G及び2'-F U
の各25%; U=2'-F U

(34N7. 21a-21; 偏向SELEXのラウンド0用DNAテンプレート)

GGGAGGACGA TGCGGNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNC
AGACGACTCG CCCGA 65 (配列番号7)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT, N=DNAとして62.5%のNX22284配列、及び
各位置に12.5%の他の4種ヌクレオチド(dA, dC, dG又はdT)

(偏向SELEXのラウンド0用転写テンプレート)

TAATACGACTCACTATAGGGAGGACGATGCGG-34N-CAGACGACTCGCCCGA
(配列番号8)

ATTATGCTGAGTGATATCCCTCCTGCTACGCC-34N-GTCTGCTGAGCGGGCT
(配列番号9)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT, N=DNAとして62.5%のNX22284配列、及び
各位置に12.5%の他の4種ヌクレオチド(dA, dC, dG又はdT)

【0156】

表1. (続き)

(34N7. 21a-21; 偏向SELEXのラウンド0用核酸ライブラリー)

GGGAGGACGA UGCGGNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNC

AGACGACUCG CCCGA 65 (配列番号10)

A=2'-OH A; C=2'-F C; G=2'-OH G; N=62. 5%のNX22284配列、及び各位置に12. 5%の他の4種ヌクレオチド(2'-OH A, 2'-F C, 2'-OH G又は2'-F U); U=2'-F U

リガンドをサブクロニング、スクリーニング、配列決定するのに使用した配列

(ML-34; サブクロニングに使用)

CGCAGGATCC TAATACGACT CACTATA 27 (配列番号11)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(ML-78; サブクロニングに使用)

GGCAGAATTC TCATCTACTT AGTCGGGCGA GTCGTCTG (配列番号12)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(RSP1; リガンドインサートについて形質転換体をスクリーニングするのに使用したベクター特異的プライマー)

AGCGGATAAC AATTCACAC AGG 23 (配列番号13)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(FSP2; リガンドインサートについて形質転換体をスクリーニングするのに使用したベクター特異的プライマー)

GTGCTGCAAG GCGATTAAGT TGG 23 (配列番号14)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(RSP2; リガンドの配列決定用プライマー)

ACTTTATGCT TCCGGCTCG 19 (配列番号15)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

特異的リガンドを検出するのに使用した配列

(リガンド14I-1特異的プライマー; ML-85)

GCCAAATGCC GAGAGAACG 19 (配列番号16)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(リガンド21a-4特異的プライマー; ML-79)

GGGGACAAGC GGACTION 18 (配列番号17)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

(リガンド21a-21特異的プライマー; ML-81)

GGGAGTACAG CTATACAG 18 (配列番号18)

A=dA; C=dC; G=dG; T=dT

【0157】

表1. (続き)

RNase Hによる切断に使用した配列

(5' N7切断)

CCGCaugcuc cuccc 15 (配列番号19)

a=2'-OCH₃ A; c=2'-OCH₃ C; C=dC; g=2'-OCH₃ G; G=dG; u=2'-OCH₃ U

(3' N7切断)

ucgggcgagu cgTCTG 16 (配列番号20)

a=2'-OCH₃ A; c=2'-OCH₃ C; C=dC; g=2'-OCH₃ G; G=dG; u=2'-OCH₃ U; T=dT

【0158】

【表2】

フィルターSELEXの条件と結果

ラウンド ^a	[RNA] ^b , nM	[TGFβ2], nM	RNA ^b タンパク質	「競合剤」	結合率 (%)	バックグラウンド率 (%)	結合/バックグラウンド	Kd (nM)
9b	1 nM	100 nM	0.01	100 μM tRNA	4.2	1.1	4	nd
10b	1 nM	30 nM	0.03	100 μM tRNA	4.3	0.13	33	100
11a	1 nM	30 nM	0.03	100 μM tRNA	1.5	0.2	8	75
12d	0.2 nM	20 nM	0.01	250 μM tRNA	2.2	0.3	7	40
13i	0.4 nM	10 nM	0.04	10 μM tRNA	2.6	0.16	16	30
14i	0.1 nM	10 nM	0.01	10 μM 核糖リン	14.5	0.55	20	75
15c	10 nM	10 nM	1.0	0	8.8	2.2	4	30
16a	55 nM	10 nM	5.5	0	9.6	2.1	5	10
17a	30 nM	3 nM	10	0	1.9	0.17	11	5
18b	15 nM	3 nM	5	0	2.3	0.6	4	5
19a	7 nM	0.1 nM	70	0	0.17	0.05	3	2
20a	0.33 nM	0.03 nM	11	0	0.1	0.04	3	1
21a	0.63 nM	0.03 nM	21	0	0.3	0.1	3	1
22a	0.07 nM	0.01 nM	7	0	0.12	0.09	1	1

^a 数字はSELEXのラウンド数を示し、英文字はそのラウンドに使用した条件を示す。

^b NA: 核酸ライブラリー

次のラウンドへ移行したラウンドだけを示す。

【0159】

【表3】

スポットSELEXの条件と結果

ラウンド	タンパク質	RNA (ピコモル)	洗浄 ¹ (μ l/分)	シグナル/ ノイズ	インプット(%)	インキュベーション	前吸着 ²
1	*200	2000	2 (500/10)	4.90	ND ³	4 hrs, 20°C	なし
2	*200	1500	2 (1000/10)	1.80	ND	0.5 hrs, 37°C	5層、0.75時間
3	*200	1500	2 (1000/10)	5.50	ND	1 hr, 37°C	5層、1時間
4	200	1000	2 (1000/10)	11.20	0.18	1 hr, 37°C	5層、2.5時間
	*67	1000	2 (1000/10)	3.70	0.06	1 hr, 37°C	5層、2.5時間
	22	1000	2 (1000/10)	1.58	0.03	1 hr, 37°C	5層、2.5時間
5	67	100	2 (1000/20)	26.00	1.30	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
	*22	100	2 (1000/20)	11.00	0.56	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
	7.3	100	2 (1000/20)	2.70	0.10	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
6	22	50	2 (1000/20)	20.70	1.00	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
	*7.3	50	2 (1000/20)	4.00	0.20	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
	2.4	50	2 (1000/20)	1.20	0.06	1 hr, 37°C	10層、0.75時間
7	22	7	3 (1000/50)	24.00	1.30	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
	*7.3	7	3 (1000/50)	7.50	0.40	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
	2.4	7	3 (1000/50)	1.50	0.07	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
8	*7.3	3	2 (1000/60)	77.00	0.41	0.75 hr, 37°C	10層、1.5時間
	2.4	3	2 (1000/60)	8.50	0.04	0.75 hr, 37°C	10層、1.5時間
	0.7	3	2 (1000/60)	1.00	ND	0.75 hr, 37°C	10層、1.5時間
9	*7.3	1	2 (1000/20)	87.00	0.23	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
	2.4	1	2 (1000/20)	4.00	0.01	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
	0.7	1	2 (1000/20)	2.50	0.006	1 hr, 37°C	10層、1.5時間
10	7.3	<1 (なし tRNA)	2 (1000/20)	13.70	ND	0.5 hr, 37°C	10層、1.5時間
	7.3	<1 (10 ¹ tRNA) ⁴	2 (1000/20)	10.50	ND	0.5 hr, 37°C	10層、1.5時間
	7.3	<1 (10 ² tRNA)	2 (1000/20)	5.00	ND	0.5 hr, 37°C	10層、1.5時間
	7.3	<1 (10 ³ tRNA)	2 (1000/20)	1.80	ND	0.5 hr, 37°C	10層、1.5時間

*次のラウンドへ移行したプール

¹洗浄の回数、容量及び時間

²バックグラウンドの逆選択工程におけるフィルターの数とインキュベーション時間

³ND、測定せず

⁴アプタマープールに対する過剰 tRNA の倍率

【0160】

【表4】

表面プラズモン共鳴バイオセンサー (s p r) S E L E X の条件と結果

TGFβ2を用いたBIA SELEXの経過

ラウンド	TGFβ2, RU ¹				[RNA], μM ² (容積、μL) ³	注入 (各分) ⁴	画分 FW ⁵	画分 FW ⁵	SDS後の RU ⁶
	FC1	FC2	FC3	FC4					
2	1293	874	294	0	4	4 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~100
3	1176	1178	1181	0	15	4 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~50-100
4	3010	2037	1767	0	10	6 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~80
5	5520	5334	4265	0	5	6 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~100-150
6	4075	3143	298	0	5	6 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~75-100
7	3773	2616	2364	0	2	6 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~330-220
8	2574	1842	1461	0	5	4 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~60-105
9	3180	2029	1688	0	3	4 (40)	3 (5)	3rd & SDS	~77-114
10	344	718	1692	0	1	4 (40)	6 (10)	6th & SDS	~50
11	217	675	386	0	5	2 (40)	6 (10)	6th & SDS	~50-62

¹ 1 RUがタンパク質1 pg/mm²に対応する共鳴ユニットで表記される、固定化TGFβ2の量。
タンパク質は1.2 mm²の範囲に固定化されている。

² RNAプールの濃度

³ 注入の回数と各注入の量

⁴ 各画分の数と時間 (分)

⁵ 次のラウンドに移行した画分

⁶ 共鳴ユニットで表記される、SDS処理後に溶出されたRNAの量

FC1、FC2、FC3及びFC4は、BIAチップの4種のフローセルを示す。

【0161】

【表5】

表面プラスモン共鳴 S E L E X のラウンド 8 から単離された配列

名称 ^a	配列番号	配列 ^b	結合 ^c
8.1(1)	21	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.2(1)	22	GGGAGGACGAUGCGG	TGFβ2
8.3(14)	23	GGGAGGACGAUGCGG	TGFβ2
8.5(1)	24	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.6(1)	25	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.8(1)	26	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.9(4)	27	GGGAGGACGAUGCGG	TGFβ2
8.11(1)	28	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.12(1)	29	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.13(1)	30	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.15(2)	31	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.18(1)	32	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.20(1)	33	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.21(1)	34	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.22(1)	35	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.23(1)	36	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.24(1)	37	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.25(1)	38	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.26(1)	39	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.28(1)	40	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.29(1)	41	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.31(1)	42	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.33(1)	43	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.34(1)	44	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ
8.35(1)	45	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.36(1)	46	GGGAGGACGAUGCGG	なし
8.38(1)	47	GGGAGGACGAUGCGG	フィルタ

共鳴ミラー (r m) 光学バイオセンサー S E L E X の条件と結果

T G F β 2 を用いた I A S Y S S E L E X の経過

ラウンド	TGF β 2, Arcsec ¹		[RNA], μ M ²	容量、 μ L ³	結合 (分) ⁴	解離 (分) ⁵	溶出 ⁶
	C1	C2					
10	1777	0	1	50	27	29	水
11	1777	0	10	50	30	60	水
12	1777	0	10	50	60	150	水
13	1893	0	0.05	50	37	73	水及びSDS
14	1721	0	3.5	50	30	35	水及びSDS

¹Arcsec で示される固定化 T G F β 2 の量、1 Arcsec は 5 pg/mm² タンパク質である。
タンパク質はセル 1 (C 1) の 4 mm² の範囲に固定化されている。

²R N A プールの濃度

³使用された R N A 溶液の容積

⁴結合相の長さ (分)

⁵解離相の長さ (分)

⁶使用された溶出液

【 0 1 6 4 】

【表 7】

共鳴ミラーSELEXのラウンド13から単離された配列

名称 ^a	配列番号	配列 ^b
14i-1	72	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CAUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.20(1)	73	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-UAUU_GGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.22(2)	74	GGGAGGACGGUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CGUUUUGGU CAGACGACU-CGCCCGA
13.24(2)	75	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CGUUUUGGU CAGACGACU-CGCCCGA
13.30(1)	76	GGGAG_ACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CAUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.32(1)	77	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-UA_UUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.34(1)	78	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-UA_UUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.36(2)	79	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CAUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.40(1)	80	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CAUUU_GC CAGACGACU-CGCCCGA
13.42(1)	81	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUAAAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CGUUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.44(1)	82	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGAAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-CGUUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.48(1)	83	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-UAUUUGGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.50(1)	84	GGGAGGACGAUGCGG AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG-UGUU_GGC CAGACGACU-CGCCCGA
13.54(1)	85	_GGGAGGACGAUGCG_ AAGUAACGUUGUAGUAAAUAUUCGUUCUCUCUGG_CGGGCAUUUGG_ CAGACGACU_CGCCCGA

^a名称はラウンド13. クロロンの番号の形式で示し、その後単離された配列のクロロン数を示す。

^b下線を施した塩基はフィルタ-SELEX由来のリガンド14i-1とは異なるものである。14i-1

の配列を比較のために一番上に示す。A = 2'OH A ; C = 2'F C ; G = 2'OH G ; U = 2'F U

【 0 1 6 5 】

【表 8】

【表10】

【0167】

SELEX法を使用して単離された配列の数

SELEXラウンド

配列	<u>8-spr</u>	<u>13-rm</u>	<u>14i</u>	<u>16a</u>	<u>18b</u>	<u>21a</u>	合計
14i-1	0	0	75	2	0	0	77
14i-1 変異体	21	15	22	2	0	0	60
21a-4	0	0	0	0	0	3	3
21a-4 変異体	0	0	4	7	0	2	13
21a-21	0	0	0	1	11	38	50
21a-21 変異体	0	0	0	2	4	4	10
未同定	36	0	0	0	0	0	36
フィルター結合性	12	0	1	1	0	1	15
合計	69	15	102	15	15	48	264

(78)

特表2003-517295

SELLEX法を使用して単離された核酸プールの特徴

ラウンド ^a	プールの配列 ^b	プールの比率(%) ^c	形質転換体の比率(%) ^d	クロームの比率 ^e
0	ランダム	14i-1: <0.03		14i-1: 30
6-spr	ランダム	14i-1: ~1		他: 70
8-spr	やや非ランダム	14i-1: ~5		
9-spr	非ランダム			
9-rm	リガンド14i-1の配列が読み取れる			
10-rm	リガンド14i-1の配列が読み取れる			
11-rm	リガンド14i-1の配列が読み取れる			
12-rm	リガンド14i-1配列の変異体を読み取れる			
13-rm	リガンド14i-1配列の変異体を読み取れる	14i-1: 10-100		14i-1: 100
14i		21a-21: <0.1		
16a		21a-21: 0.2-0.5		14i-1: 93 21a-4: 4 21a-21: 0 他: 3 14i-1: 27 21a-4: 47 21a-21: 20 他: 6 21a-21: 100
18b		21a-21: 3-100		
21a		21a-21: 3-100	21a-4: 9 21a-21: 90 他: 1	21a-4: 10 21a-21: 84 他: 6

表10. (続き)

- a s p r : 表面プラスモン共鳴バイオセンサーSELEX由来;
- r m : 共鳴ミラー光学バイオセンサーSELEX由来。
- b 3' N 7 プライマーを用いるバルク核酸プールのプライマー伸張により決定。
- c リガンド特異的プライマーを用いるバルク核酸プールのRT-PCRにより決定。
- d リガンド特異的プライマーを用いる個別形質転換体のPCRにより決定。
- e クロロンの配列決定により決定。リガンドの配列変異体を含む。

【0169】

【表11】

ヒトTGFβ2核酸リガンド21a-21の短鎖型

名称	配列 ^a	結合性 ^b	長さ ^c	生物活性 ^d
21a-21	GGGAGGACGAUGCGGUUCAGGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCCAGACGACGACUCGCCCCGA</u>	87 0.5	70	1
21a-21 (U6G)	GGGAGGACGAUGCGGUUCAGGAGGGUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCCAGACGACGACUCGCCCCGA</u>	88 250	34	
21a-21Δ5'	GGUUCAGGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCCAGACGACGACUCGCCCCGA</u>	89 0.5	56	
21a-21Δ3'	GGGAGGACGAUGCGGUUCAGGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCCA</u>	90 100	56	
21a-21Δ5', 3'	GGUUCAGGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCCA</u>	91 0.5	42	1
21a-21 (ML-94)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCCCC</u>	92 0.5	36	
21a-21 (ML-95)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUCUGUAUAGCUGUA <u>CUCC</u>	93 1	34	
21a-21 (ML-96)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUA	94 1000	30	
21a-21 (ML-97)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUGUAUAGC	95 1000	26	
21a-21 (ML-99)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUGUAUAGC CUCC	96 1000	30	
21a-21 (ML-101)	GGAGGUUUUU AGAGUCU AUAGCUGUA <u>CUCC</u>	97 1000	30	
21a-21 (ML-102)	GGAGGUUUUU AGAGUCU AUAGC CUCC	98 1000	26	
21a-21 (ML-103)	GGAGGUUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUA <u>CUC</u>	99 50	33	

表11. (続き)

名称	配列 ^a	結合性 ^b	長さ ^c	生物活性 ^d
21a-21 (ML-104)	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACU 100 70		32	
21a-21 (ML-105)	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUAC 101 1000		31	
21a-21 (ML-114)	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGC GUAUCUCC 102 1000		33	
21a-21 (ML-115)	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGCUGU CUCC 103 1000		33	
21a-21 (ML-116)	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGCU ACUCC 104 1000		32	
21a-21 (ML-118)	GGAGGUUAU ACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC 105 1000		33	
21a-21 (ML-120)	GGAGGUUAUUACAGA UCUGUAUAGCUGUACUCC 106 1000		33	
21a-21 (ML-122)	GGAGGUUAUUACA AGU UGUUAUAGCUGUACUCC 107 1000		32	
21a-21 (ML-128)	GGAGGUUAUUACAGAGU UGUUAUAGCUGUACUCC 108 1000		33	
21a-21 (ML-130)	GG GGUUAUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUAC CC 109 2		32	
21a-21 (ML-132)	GGAGGUUAUUAC GAGUCUGUAUAGC GUAUCUCC 110 1000		32	
21a-21 (ML-134)	GGAGA UAUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC 111 10		33	
21a-21 (ML-136)	GG GGUUAUU CAGAGUCUGUAUAGCUG AC CC 112 10000		30	
21a-21 (ML-138)	GG GGUUAUUA AGAGUCUGUAUAGCU UAC CC 113 10000		30	

【0171】

【表 12】

表 11. (続き)

名称	配列 ^a	結合性 ^b	長さ ^c	生物活性 ^d
NX22283	GGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCCCC [3'T]	114 0.6	36	0.5
NX22284	GGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	115 1	34	1
NX22285	GGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCCCCA	116 2	37	
NX22286	GGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUA	117 130	30	>20
NX22301	GAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	118 1	33	2
NX22302	AGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	119 100	32	
NX22303	GGUUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	120 >100	31	>100
NX22323	PEG-GGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	121 nt	34	3

^a 固定領域を太字で示す。21a-21の点突然変異 (U6G) に下線を施し、太字で示す。

A = 2'-OH A ; C = 2'-F C ; G = 2'-OH G ; U = 2'-F U

5' RNaseH 切断産物の5' 末端にあるイタリック文字Gは、この時間の切断物の約50%が2つの

Gを残すこと、50%で1つのGが残ることを示す。21a-21の境界部分に下線を施す。

^b 結合性を、リガンドのK_d/NX22284のK_dの比として表す。NX22284のK_dは約2nMである。

^c 長さは塩基数で示す。

^d 生物活性を、リガンドのK_i/NX22284のK_iの比として表す。NX22284のK_iは約10nMである。

ヒトトランスフォーマー増殖因子βのアミノ酸配列の並置

	<u>配列番号</u>
TGFβ1: ALDTNYCFSS TEKNCCVRQL YIDFRKDLGW KWIHEPKGYH ANFCLGPCPY IWSLDTQYSK	60 122
TGFβ2: ALDAAAYCFRN VQDNCCLRPL YIDFKRDLGW KWIHEPKGYN ANFCAGACPY LWSSDTQHSR	60 123
TGFβ3: ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWIHEPKGYI ANFCSGPCPY LRSADTTHST	60 124
TGFβ2 特異的: AA VQD L KR N A A S R	
TGFβ1: VLALYNQHNP GASAAPCCVP QALEPLPIVY YVGRKPKVEQ LSNMIVRSCK CS	112 125
TGFβ2: VLSLYNTINP EASASPCCVS QDLEPLTILY YIGKTPKIEQ LSNMIVKSCK CS	112 126
TGFβ3: VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMIVKSCK CS	112 127
TGFβ2 特異的: S I S I K I	

【0173】

【表13】

ヒトTFβ 2核酸リガンド14i-1の短鎖型

名称	配列 ^a	配列番号	結合性 ^b	長さ ^c
14i-1	<u>GGGAGGACGAUGCGGAAGUAA</u> CGUUGUAGUAAA <u>UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCAGACGACUCGCCCCGA</u>	72	1	71
14i-1Δ5 ^d	GGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCAGACGACUCGCCCCGA	128	>100	56
14i-1Δ3 ^d	GGGAGGACGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCA	129	3	57
14i-1Δ5,3 ^d	GGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCA	130	>100	42
14i-1t5-41	GGGAGGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCA	131	1	38
14i-1t5-38	GGGAGGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCA	132	>100	35
14i-1t5-35	GGGAGGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGUAAA</u> UUCGUUUCUUCGGCAUUUGGCCA	133	>100	32
14i-1 (ML-86)	GGGAGGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGU</u> UCCUUC	134	>100	33
14i-1 (ML-87)	GGGAGGAUGCGGAAGUAA <u>CGUUGUAGU</u>	135	>100	27
14i-1 (ML-89)	gGgaGgAGUAA <u>CGUUGUAGU</u>	136	>100	20

^a小文字は、完全長リガンドのその位置には見出されず、転写効率を維持するために付加又は変化させた塩基を示す。境界部分に下線を施す。固定領域を太字で示す。5' RNaseH 切断産物の5'末端にあるイタリック文字Gは、この時間の切断物の約50%が2つのGを残すこと、50%で1つのGが残ることを示す。

A = 2'-OH A ; C = 2'-F C ; G = 2'-OH G ; U = 2'-F U

^b結合性を、 K_d (リガンド) / K_d (14i-1) の比として表す。14i-1の K_d は約10nMである。

^c長さは塩基数で示す。

^dRNaseH 消化により産生

【 0 1 7 4 】

【表 1 4】

偏向SELEXの条件と結果

【0176】

【表16】

ラウンド ^a	[RNA] ^b , Nm	[TGFβ2], nM	RNA ^b / タンパク質	[競合剤]	結合率 (%)	バックグラウンド率 (%)	結合/ バックグラウンド	Kd (nM) ^c
34N7. 21a-21	1000	150	7	0	1.4	1.4	1.0	870
1a	450	300	1.5	0	1.7	1.0	1.7	395
2a	10	50	0.2	0	17.5	1.0	17.5	186
3a	50	10	5	0	11.0	0.9	12.3	25
4a	50	10	5	333 nM NX22284	2.2	1.3	1.7	17
4b	8	1	8	0	1.4	0.9	1.5	8
5a	8	1	8	100 nM NX22284	0.8	0.7	1.1	1
5b	4	0.5	8	0	2.9	2.9	1.0	17
6a	6	0.5	12	100 nM NX22284	1.8	1.3	1.4	1
6b	5	0.25	20	0	0.5	0.14	3.4	1
7a	5	0.25	20	200 nM NX22284	0.15	0.1	1.5	1
7b	5	0.25	20	5 mM tRNA	1.05	1.1	0.9	0.5
8a	1	0.05	20	0	0.6	0.5	1.2	1
8b	1	0.05	20	100 nM NX22284	0.6	0.5	1.2	3
9a	125	1	125	5 mM tRNA	0.6	0.5	1.2	nd
9b	0.9	0.01	90	0	0.15	0.14	1.0	nd

^a a 系列：競合剤なし；b 系列：競合剤あり^b 核酸リガンドライブラリー^c nd, 測定せず

表16. (続き)

名称 ^a	5' 固定	選択 ^b	3' 固定	配列番号 A = 変換 ^c B = 結合性 ^d
30: (1)	GGGAGGACGAUGCGG	UGAGGUUUUACAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC	CAGACGACUCGCCCGA	<u>A</u> 167 1 <u>C</u> 2.4
34: (1)	GGGAGGACGAUGCGG	GGUGGUUUUAGAGAGUCUGUAUAGCUCUACGCC	CAGACGACUCGCCCGA	168 4 1.7
35: (1)	GGGAGGACGAUGCGG	GGGGAGUUUUAAGAGUCUGUAUAGCUUUAACCCC	CAGACGACUCGCCCGA	169 6 0.8
36: (1)	GGGAGGACGAUGCGG	GGAGGUUUUUAUAGAGUCUGUAUAGCUUAACCCC	CAGACGACUCGCCCGA	170 4 1.9

不変:

UAU GU UG AUA C

^a 各配列について単離されたクローンの数を括弧内に示す。

^b 出発配列とは異なるヌクレオチドを太字で示す。A = 2'-OH A ; C = 2'-F C ; G = 2'-OH G ; U = 2'-F U。

推定構造要素: S1、ステム1; B、バルジ; S2、ステム2; L、ループ。リガンド21a-21の配列を比較のため一番上に示す。

^c 出発配列からの変換数。

^d 結合性を、 K_d (リガンド) / K_d (21a-21) として表す。21a-21の K_d は約1 nMである。

【0178】

【表17】

【表 18】

【0179】

偏向SELEXに由来する最高及び最低アフィニティーのTGFβ2核酸リガンド

名称	5' 固定	選択 ^a	配列番号	結合性 ^b	3' 固定	変化 ^c
最高アフィニティーリガンド:						
13:	GGGAGGACGAUGCGG	UGUGAAUUAUAGAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	154	0.2	CAGACGACUCGCCCGA	7
14:	GGGAGGACGAUGCGG	CGGGAUUAUUAACUGAGUCUGUAUAGCAGUACCCC	155	0.4	CAGACGACUCGCCCGA	6
21:	GGGAGGACGAUGCGG	AGGGAUUAUUAACAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	161	0.7	CAGACGACUCGCCCGA	4
35:	GGGAGGACGAUGCGG	GGGGAUUAUUAAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	169	0.8	CAGACGACUCGCCCGA	6
推定構造要素:		S1 B S2 L S2 S1				
21a-21:	GGGAGGACGAUGCGG	UGUGAAUUAUAGAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	72	1.0	CAGACGACUCGCCCGA	0
最低アフィニティーリガンド:						
36:	GGGAGGACGAUGCGG	GGAGGAUUAUUAAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	170	2.0	CAGACGACUCGCCCGA	4
30:	GGGAGGACGAUGCGG	UGAGGUUAUUAACAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	167	2.4	CAGACGACUCGCCCGA	1
26:	GGGAGGACGAUGCGG	GGUGGUUAUUAACACAGUAUGUAUAGGUGUACCCC	164	3.1	CAGACGACUCGCCCGA	4
6:	GGGAGGACGAUGCGG	GGAGGUUAUUAUAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	149	3.3	CAGACGACUCGCCCGA	3
20:	GGGAGGACGAUGCGG	GGVAGAUAUACUGAGUCUGUAUAGCUGUACCCC	160	5.7	CAGACGACUCGCCCGA	9

不変:

UAU GU UG AUA C

^a出発配列とは異なるヌクレオチドを太字で示す。A=2'-OH A; C=2'-F C; G=2'-OH G; U=2'-F U。

推定構造要素: S1、ステム1; B、バルジ; S2、ステム2; L、ループ。

^b結合性を、 K_d (リガンド) / K_d (21a-21) として表す。21a-21の K_d は1nMである。

^c出発配列からの変化数。

NX22284リガンドにおける2'-OHプリンとの2'-OCH₃プリンによる置換

名称	配列 ^a	配列番号	結合性 ^b	長さ ^c	生物活性 ^d
NX22284	GGAGGUUAUUACAGAGUCUGUAAGCUGUACUCC [3'T]	115	1	34	1
NX22304	ggaggUUaUUaCagagUCUgUaUagCUgUaCUCC [3'T]	171	>100	34	>100
NX22355	GGAGGUUAUUaCagagUCUgUaUagCUgUaCUCC [3'T]	172	>100	34	>100
NX22356	ggaggUUaUUaCAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	173	1	34	1
NX22357	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	174	2	34	10
NX22358	GGAGGUUAUUaCagagUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	175	1	34	1
NX22359	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUgUaUaGCUGUACUCC [3'T]	176	>100	34	>30
NX22360	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	177	1	34	1
NX22374	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUGUAUAGCUGUACUCC [3'T]	178	25	34	>100
NX22375	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUGUaUAGCUGUACUCC [3'T]	179	>100	34	>300
NX22376	GGAGGUUAUUaCAGAGUCUGUaUaGCUGUACUCC [3'T]	180	50	34	>100
NX22377	ggaggUUaUUaCAGAGUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	181	1	34	1
NX22383	ggaggUUaUUaCagagUCUGUAUagCUgUaCUCC [3'T]	182	500	34	>100
NX22384	ggaggUUaUUaCagagUCUGUAUagCUgUaCUCC [3'T]	183	10000	34	>100
NX22417	ggaggUUaUUaCagagUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	184	1	34	10
NX22420	ggaggUUaUUaCagagUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	185	1	34	1
NX22421	ggaggUUaUUaCagagUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	186	2	34	1
NX22426	ggaga-UAUUaCagagUCUGUAUAGCUGUaCUCC [3'T]	187	1	33	25
NX22427	gg-ggUUaUUaCagagUCUGUAUAGCUGUaC-CC [3'T]	188	0.3	32	0.7

^a A, 2'-OH A; C, 2'-F C; G, 2'-OH G; U, 2'-F U; a, 2'-OCH₃ A; g, 2'-OCH₃ G; [3'T] は、3', 3'd Tキヤップを示す。

^b 結合性を、リガンドのK_d/NX22284のK_dの比として表す。NX22284のK_dは約1 nMである。

^c 長さは塩基数で示す。

^d 生物活性を、リガンドのK_i/NX22284のK_iの比として表す。NX22284のK_iは約10 nMである。

【 0 1 8 0 】

【表 1 9】

偏向SELEXに由来する核酸リガンド#13の短鎖型及び2'-OCH₃プリン修飾物

名称	配列 ^a	配列番号	結合性 ^b	長さ ^c	生物活性 ^d
NX22385	UGUGAAUUUAGAGAGUCUGUAUAGCUCUACCCC	[3'T] 189	0.4	34	4
NX22386	UGUGAAUaUUaGagagUCUGUAUagCUCUaCCCC	[3'T] 190	3000	34	>100
NX22387	UGUGaaUaUUagagagUCUGUAUagCUCUaCCCC	[3'T] 191	3000	34	30
NX22424	UGUGAAUUUaGagagUCUGUAUagCUCUaCCCC	[3'T] 192	0.6	34	>100
NX22425	UGUGaaUUUagagagUCUGUAUagCUCUaCCCC	[3'T] 193	1.5	34	>100

a A, 2'-OH A; C, 2'-F C; G, 2'-OH G; U, 2'-F U; a, 2'-OCH₃ A; g, 2'-OCH₃ G. [3'T] は、3', 3'd Tキヤップを示す。

b 結合性を、リガンドのK_d/NX22284のK_dの比として表す。NX22284のK_dは2 nMである。

c 長さは塩基数で示す。

d 生物活性を、リガンドのK_i/NX22284のK_iの比として表す。NX22284のK_iは10 nMである。

非区画分析を用いたラットにおけるNX22323の薬物動態特性

パラメータ	単位	推定値
Cmax	($\mu\text{g}/\text{mL}$)	27.1
AUCラスト	(($\mu\text{g}\cdot\text{min}$)/ mL)	3028.0
AUCINF	(($\mu\text{g}\cdot\text{min}$)/ mL)	3058.0
$\beta\cdot t_{1/2}$	(min)	630.9
Cl	($\text{mL}/(\text{min}\cdot\text{kg})$)	0.33
MRTINF	(min)	350.4
Vss	(mL/kg)	115.0
Vz	(mL/kg)	298.0

【0182】

【表21】

区画分析を用いたラットにおけるNX22323の薬物動態特性

パラメータ	単位	推定値	標準誤差	誤差 (%)
Cmax	($\mu\text{g}/\text{mL}$)	16.3	3.3	20.2
AUCINF	(($\mu\text{g}\cdot\text{min}$)/ mL)	2486	274	11.0
$\alpha\cdot t_{1/2}$	(min)	63.5	19.1	30.2
$\beta\cdot t_{1/2}$	(min)	467.2	83.2	17.8
A	($\mu\text{g}/\text{mL}$)	14.63	3.21	21.9
B	($\mu\text{g}/\text{mL}$)	1.70	0.84	49.1
Cl	($\text{mL}/(\text{min}\cdot\text{kg})$)	0.402	0.044	11.0
MRTINF	(min)	360.3	35.6	9.9
Vss	(mL/kg)	144.9	23.1	15.9

【0183】

【表22】

【配列表】

リードTGFβ1短鎖型リガンドCD70の2'-Oメチル-及びPEG-修飾物の結合性及び阻害活性

配列番号	結合性	阻害活性
ChD70	+++	+++
ChD70-m1	+	
ChD70-m2	++	
ChD70-m3	+++	
ChD70-m4	++	
ChD70-m5	+++	
ChD70-m6	+++	
ChD70-m7	+++	
ChD70-m8	+	
ChD70-m9	+	
ChD70-m10	+++	
ChD70-m11	+++	
ChD70-m12	+++	
ChD70-m13	+++	
ChD70-m14	+++	
ChD70-m15	+++	
ChD70-m16	+++	
ChD70-m17	+++	++
ChD70-m18	+++	
ChD70-m19	++	-
ChD70-m20	++	
ChD70-m21	++	
ChD70-m22	+++	

SEQUENCE LISTING

<110> NeXstar Pharmaceuticals, Inc.

<120> High Affinity TGFBeta Nucleic Acid Ligands and Inhibitors

<130> NEX87/PCT

<140>

<141>

<150> 09/046,247

<151> 1998-03-23

<150> 08/458,424

<151> 1995-06-02

<150> 07/714,131

<151> 1991-06-10

<150> 07/931,473

<151> 1992-08-17

<150> 07/964,624

<151> 1992-10-21

<150> 08/117,991

<151> 1993-09-08

<150> 07/536,428

<151> 1990-06-11

<150> 09/363,939

<151> 1999-07-29

<150> 08/434,465

<151> 1995-05-04

<160> 216

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 71

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(71)
 <223> Feature N at positions 17-56 is A, C, G or T.

<400> 1
 tcgggcgagt cgtctgnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnccgc 60
 atcgtctcc c 71

<210> 2
 <211> 32
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 2
 taatacgact cactataggg aggacgatgc gg 32

<210> 3
 <211> 16
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 3
 tcgggcgagt cgtctg 16

<210> 4
 <211> 88
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base

<222> (1)..(88)

<223> Feature N at positions 33-72 is A, C, G or T.

<400> 4

```
taatacgact cactataggg aggacgatgc ggnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 60
nnnnnnnnnn nncagacgac tcgcccga                                     88
```

<210> 5

<211> 88

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(88)

<223> Feature N at positions 33-72 is A, C, G or T.

<400> 5

```
attatgctga gtgatatccc tctgctaag cennnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 60
nnnnnnnnnn nngtctgctg agcgggct                                     88
```

<210> 6

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F; feature N at positions 16-55 is A, 2'-FC, G or 2'-FU.

<400> 6

```
gggaggacga ugcggnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnncagac 60
gacucgcccg a                                                       71
```

<210> 7

<211> 65

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> Feature N at positions 16-49 is SEQ ID NO: 115
and A, C, G or T.

<400> 7
gggaggacga tgcggnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnc agacgactcg 60
cccga 65

<210> 8
<211> 82
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(82)
<223> Feature N at positions 33-66 is SEQ ID NO: 115 and
A, C, G or T.

<400> 8
taatacgact cactataggg aggacgatgc ggnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn 60
nnnnnncaga cgactcgccc ga 82

<210> 9
<211> 82
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(82)
<223> Feature N at positions 33-66 is SEQ ID NO: 115 and
A, C, G or T.

<400> 9
 attatgctga gtgatatccc tctgtctacg cccccccccn nccccccccn nccccccccn 60
 nccccngtct gctgagcggg ct 82

<210> 10
 <211> 65
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(65)
 <223> All pyrimidines are 2'F; feature N at positions
 16-49 is SEQ ID NO: 115 and A, 2'-FC, G or 2'-FU.

<400> 10
 gggaggacga ugcggnnnnn nccccccccn nccccccccn nccccccccn agacgacucg 60
 cccga 65

<210> 11
 <211> 27
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 11
 cgcaggatcc taatagcact cactata 27

<210> 12
 <211> 38
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 12
 ggcagaattc tcactactt agtcgggcga gtcgtctg 38

<210> 13
 <211> 23
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 13
 agcggataac aatttcacac agg 23

 <210> 14
 <211> 23
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 14
 gtgctgcaag gcgattaagt tgg 23

 <210> 15
 <211> 19
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 15
 actttatgct tccggctcg 19

 <210> 16
 <211> 19
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 16
 gccaaatgcc gagagaacg 19

<210> 17
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 17
 ggggacaagc ggacttag 18

 <210> 18
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <400> 18
 gggagtacag ctatacag 18

 <210> 19
 <211> 15
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(15)
 <223> Bases at positions 5-15 are 2'-OMe.

 <400> 19
 ccgcaugcuc cuccc 15

 <210> 20
 <211> 14
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic

Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(12)

<223> Bases at positions 1-12 are 2'-OMe.

<400> 20

ucgggcgagu cgcg

14

<210> 21

<211> 61

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(61)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 21

gggaggacga ucgguccuc aaugaucuuu ccuguuuuug cuccccagac gacucgcccg 60
a 61

<210> 22

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 22

gggaggacga ucggaagua acguuuuagu aaaaauucguu cucucgguau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 23

<211> 71

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 23
gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaauucguu cucucggcau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 24
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 24
gggaggacga ugcgguccua accaucacaa ucucuuuucu uauuuuuucc cgccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 25
<211> 69
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(69)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 25
gggaggacga ugcggaaacc aaaagaccac aucuccauac ucacgcucug cccagacga 60
cucgcccga 69

<210> 26
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 26
gggaggacga ugcggauaga ucgguccgau aagucuuuca uuuuaccug gccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 27
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 27
gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaucguu cucucggau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 28
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 28

gggaggacga ugcggacgau ccuuuccuaa acauuucac auuucuccug ugccccagac 60
gacucgcccg g 71

<210> 29

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 29

gggaggacga ugcgguccau caacaauuu aucauuuugu uuuccuucc cgccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 30

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 30

gggaggacga ugcgguccuc ugagccgauc uucuuacua cuuuuuuuug ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 31

<211> 71

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 31
gggaggacga ugcgguuccu caauucuucc aucuucuaaa uguuuccuu ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 32
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 32
gggaggacga ugcgguacuac ccuuuagcag uauuuguuuc caucguuguu ugccccagac 60
gacucgcccg g 71

<210> 33
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 33
gggaggacga ugcgguuca acgaagaaca ucguuggaua cuguuugucc cgccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 34
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 34
gggaggacga ugcgguucag uuuccuucag uuucguuuc uauucuugu guccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 35
<211> 61
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(61)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 35
gggaggacga ugcggagcgg auuaauuagu cugacuucu guccccagac gacucgcccg 60
a 61

<210> 36
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 36
gggaggacga ugcggagaca ucuuugucuc gauuagucan guccuuacc ugcccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 37
<211> 69
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(69)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 37
gggaggacga ugcgguccuc uagcaagcag cuucucaucu uauuuuuccg ccccagacga 60
cucgcccga 69

<210> 38
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 38
gggaggacga ugcggugcac agugauggau gacauuguan aacgguaugc gucccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 39
<211> 70

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 39
gggaggacga ugcgaccua ucuuucucc aagucagu uuuacuucc gccccagacg 60
acucgccga 70

<210> 40
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 40
gggaggacga ugcggaugag accuaucua cgauccgcu ucuaaaaccu cacccagac 60
gacucgccg a 71

<210> 41
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 41
 gggaggacga ugcgguccuc agacaaaucu uucuugaauc uuuccuaac ugccccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 42
 <211> 70
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(70)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 42
 gggaggacga ugcggaccga uucuccaacu ugacauuuau uccucuuucu gccccagacg 60
 acucgcccga 70

<210> 43
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(71)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 43
 gggaggacga ugcgguccuc ugagccaauc uucuucgcuu cuucuuuuuc ugccccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 44
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 44
gggaggacga ugcggaucuu uucuccaacg cuuuucacua ccuacauuc ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 45
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 45
gggaggacga ugcggaucuu auccucugaa uaucauuaaa ucaucuucuc cgccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 46
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 46
gggaggacga ugcgguucau ucaucuucac ucucuuucc uuuuuccuac uccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 47
<211> 71

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 47
gggaggacga ugcggcgaua gaaucuaguc guucuagaug aucugguacg ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 48
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 48
gggaggacga ugcgguagua auccuugucu uccauuucuc uuuaccuuuu ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 49
<211> 61
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(61)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 49
 gggaggacga ugcggcccau uaguccucau uagucccug ugccccagac gacucgcccg 60
 a 61

<210> 50
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(71)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 50
 gggaggacga ugcggcaucu uauccuccau caguuacucu ucguuuuucc cgccccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 51
 <211> 70
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(70)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 51
 gggaggacga ugcgguccaa auccucuucc cauguuagca uucagccuug uccccagacg 60
 acucgcccg a 70

<210> 52
 <211> 70
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 52
gggaggacga ugcgguuccg acaauuuccu ccaccuuag auuucuugcu gccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 53
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 53
gggaggacga ugcgguucug auccuccuuu gugucuucuu uugucuuccc ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 54
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 54
gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaauucguu cucucgguau uggccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 55
<211> 70

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 55
gggaggacga ugcggucoga ucaguuccuu cgauuaaucu ucuuuccugc cccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 56
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 56
gggaggacga ugcggaauc uucuccuga ugaauaugac cuuuuucug cuccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 57
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 57
 gggaggacga ugcggaugau cuuuaauguc ugguugagg ucaaugcggg ugccccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 58
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(71)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 58
 gggaggacga ugcggaugaug guacuccauc uccuuuaugu gcccaucgcu guccccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 59
 <211> 61
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(61)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 59
 gggaggacga ugcgguccuc gauucuaauu uacuccuuuu uccccagac gacucgcccg 60
 a 61

<210> 60
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 60
gggaggacga ugcgguacuac ccuuuagcag uauuuguuuc caucguuguu ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 61
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 61
gggaggacga ugcggcacaa uauucuccuc uacuuccacg uauuuuccug uccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 62
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 62
gggaggacga ugcgguccuc aaccuuagac uuucauuucu ucaguucuc ucgccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 63
<211> 71

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 63
gggaggacga ugcgguagug gucugucaaa ggaauagcua guaguguuug guccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 64
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 64
gggaggacga ugcggaucuu uccuuagcau accaguuuau uccuuucccu guccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 65
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 65
gggaggacga ugcgagcga caguauaguu aguacucuag cucuagugcu guccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 66
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 66
gggaggacga ugcggaccuc ucaugaucag caucucgcu aaucacgguu caccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 67
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 67
gggaggacga ugcgguccgu acuccauuuc cuauuugauu ccuuuuccuc ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 68
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 68
gggaggacga ugcggaaccc acgaccuuac cuuaaucaug uauuucucuc ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 69
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 69
gggaggacga ugcggagaua augagugacg gugauuuauag augcugcccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 70
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 70
gggaggacga ugcgguuccu caauucucc aucuucuaaa uguuuccuu ugccccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 71
<211> 60

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(60)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 71
gggaggacga ugcgguuccu uccaacguua ucuacuuccu gccccagacg acucgcccga 60

<210> 72
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 72
gggaggacga ugcggaagua acguuguagu aaaaucguu cucucggcau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 73
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 73

gggaggacga ugcggaagua acguuauagu aaaauucguu cucucggua uggccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 74
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 74
gggaggacgg ugcggaagua acguuguagu aaaauucguu cucucggcgu uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 75
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 75
gggaggacga ugcggaagua acguuguagu aaaauucguu cucucggcgu uggucagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 76
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 76
gggagacgau gcggaaguaa cguuguagua aaauucguuc ucucggcauu uggccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 77
<211> 71
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(71)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 77
gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaucguu cucucugcgu uggucagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 78
<211> 70
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(70)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 78
gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaucguu cuccugguau uggccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 79
<211> 71
<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 79

gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaauucguu cucucggcau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 80

<211> 70

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(70)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 80

gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaauucguu cucuuggcau uggccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 81

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 81

gggaggacga ugcggaagua acguaaaagu aaaaucguu cucucggcgu uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 82

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 82

gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaucguu cucucggcgu uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 83

<211> 71

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(71)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 83

gggaggacga ugcggaagua acguugaagu aaaaucguu cucucggau uggccagac 60
gacucgcccg a 71

<210> 84

<211> 70

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(70)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 84
 gggaggacga ugcggaagua acguuguagu aaaaucguu cucuuggucu uggccagacg 60
 acucgcccga 70

<210> 85
 <211> 70
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(70)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 85
 ggaggacgau gcgaaguaac guuguaguua aaucguucu cucgggcauu uggcagacga 60
 cuucgcccga 70

<210> 86
 <211> 71
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(71)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 86
 gggaggacga ugcggcguug uuuagucgua uguauauacu aaguccgcuu gucccagac 60
 gacucgcccg a 71

<210> 87
 <211> 70
 <212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(70)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 87

gggaggacga ugcgguucag gagguauua cagagucugu auagcuguac uccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 88

<211> 70

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(70)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 88

gggaggacga ugcgguucag gagguauua cagagucugu auagcuguac uccccagacg 60
acucgcccga 70

<210> 89

<211> 57

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(57)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 89

gguucaggag guuauuacag agucuguaua gcuguacucc ccagacgacu cgcccga 57

<210> 90

<211> 56

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(56)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 90

gggaggacga ugcgguucag gagguuaua cagagucugu auagcuguac ucccca 56

<210> 91

<211> 43

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(43)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 91

gguucaggag guuauuacag agucuguaua gcuguacucc cca 43

<210> 92

<211> 36

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(36)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 92

ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucccc

36

<210> 93

<211> 34

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(34)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 93

ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc

34

<210> 94

<211> 30

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(30)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 94

ggagguuauu acagagucug uauagcugua

30

<210> 95

<211> 26

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(26)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 95
ggagguuuu acagagucug uauagc

26

<210> 96
<211> 30
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(30)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 96
ggagguuuu acagagucug uauagcucc

30

<210> 97
<211> 30
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(30)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 97
ggagguuuu agagucuaua gcuguacucc

30

<210> 98
<211> 26
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(26)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 98

ggagguuuuu agagucuaua gccucc

26

<210> 99

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 99

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cuc

33

<210> 100

<211> 32

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(32)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 100

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cu

32

<210> 101

<211> 31

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(31)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 101

ggagguuauu acagagucug uauagcugua c

31

<210> 102

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 102

ggagguuauu acagagucug uauagcguac ucc

33

<210> 103

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 103

ggagguuauu acagagucug uauagcuguc ucc

33

<210> 104
<211> 32
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(32)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 104
ggagguuuuu acagagucug uauagcuacu cc 32

<210> 105
<211> 33
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 105
ggagguuuau cagagucugu auagcuguac ucc 33

<210> 106
<211> 33
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 106
ggagguuuuu acagaucugu auagcuguac ucc 33

<210> 107
<211> 32
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(32)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 107
ggagguuuuu acaaguugua uagcuguacu cc 32

<210> 108
<211> 33
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 108
ggagguuuuu acagaguugu auagcuguac ucc 33

<210> 109
<211> 32
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base

<222> (1)..(32)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 109

gggguuaua cagagucugu auagcuguac cc

32

<210> 110

<211> 32

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(32)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 110

ggagguauu acgagucugu auagcuguac cc

32

<210> 111

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 111

ggagauaua cagagucugu auagcuguac ucc

33

<210> 112

<211> 30

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(30)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 112
gggguuauuc agagucugua uagcugaccc 30

<210> 113
<211> 30
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(30)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 113
gggguuauua agagucugua uagcuuaccc 30

<210> 114
<211> 36
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(36)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 114
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucccc 36

<210> 115
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(34)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 115

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucc

34

<210> 116

<211> 37

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(37)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 116

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucccca

37

<210> 117

<211> 30

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(30)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 117

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua

30

<210> 118

<211> 33

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 118
gagguuuua cagagucugu auagcuguac ucc 33

<210> 119
<211> 32
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(32)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 119
agguuuuac agagucugua uagcuguacu cc 32

<210> 120
<211> 31
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(31)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 120
gguuuuaca gagucuguau agcuguacuc c 31

<210> 121
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 121
 ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucc

34

<210> 122
 <211> 60
 <212> PRT
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 122
 Ala Leu Asp Thr Asn Tyr Cys Phe Ser Ser Thr Glu Lys Asn Cys Cys
 1 5 10 15
 Val Arg Gln Leu Tyr Ile Asp Phe Arg Lys Asp Leu Gly Trp Lys Trp
 20 25 30
 Ile His Glu Pro Lys Gly Tyr His Ala Asn Phe Cys Leu Gly Pro Cys
 35 40 45
 Pro Tyr Ile Trp Ser Leu Asp Thr Gln Tyr Ser Lys
 50 55 60

<210> 123
 <211> 60
 <212> PRT
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic

<400> 125

Val Leu Ala Leu Tyr Asn Gln His Asn Pro Gly Ala Ser Ala Ala Pro
 1 5 10 15

Cys Cys Val Pro Gln Ala Leu Glu Pro Leu Pro Ile Val Tyr Tyr Val
 20 25 30

Gly Arg Lys Pro Lys Val Glu Gln Leu Ser Asn Met Ile Val Arg Ser
 35 40 45

Cys Lys Cys Ser
 50

<210> 126

<211> 52

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 126

Val Leu Ser Leu Tyr Asn Thr Ile Asn Pro Glu Ala Ser Ala Ser Pro
 1 5 10 15

Cys Cys Val Ser Gln Asp Leu Glu Pro Leu Thr Ile Leu Tyr Tyr Ile
 20 25 30

Gly Lys Thr Pro Lys Ile Glu Gln Leu Ser Asn Met Ile Val Lys Ser
 35 40 45

Cys Lys Cys Ser
 50

<210> 127

<211> 52

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 127

Val Leu Gly Leu Tyr Asn Thr Leu Asn Pro Glu Ala Ser Ala Ser Pro

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(44)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 130
ggaaguaacg uuguaguaaa auucguucuc ucggaauug gccca 44

<210> 131
<211> 38
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(38)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 131
gggaggauhc ggaaguaacg uuguaguaaa auuccuuc 38

<210> 132
<211> 35
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(35)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 132
gggaggauhc ggaaguaacg uuguaguaaa auucc 35

<210> 133
<211> 32
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(32)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 133
gggagggaugc ggaaguaacg uuguaguaaa au 32

<210> 134
<211> 33
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 134
gggagggaugc ggaaguaacg uuguaguucc uuc 33

<210> 135
<211> 27
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(27)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 135
gggagggaugc ggaaguaacg uuguagu 27

<210> 136
<211> 20
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(20)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 136
gggaggagua acguuguagu 20

<210> 137
<211> 58
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(58)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 137
ggcguuguuu agucguaugu auauacuaag uccgcuuguc cccagacgac ucgcccga 58

<210> 138
<211> 57
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base
 <222> (1)..(57)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

 <400> 138
 gggaggacga ugccggcuug uuuagucgua uguauauacu aaguccgcuu gucccca 57

 <210> 139
 <211> 44
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(44)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

 <400> 139
 ggcguuguuu agucguaugu auauacuaag uccgcuuguc ccca 44

 <210> 140
 <211> 44
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

 <220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(44)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

 <400> 140
 ggggagcggc guuguuuagu cguauguaua uacuaagucc gcuu 44

 <210> 141
 <211> 29
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic

Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(29)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 141

ggggagcggc guuguugaaa aguccgcuu

29

<210> 142

<211> 38

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(38)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 142

ggggagcggc guuguuucgu auguauauaa guccgcuu

38

<210> 143

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 143

ggggagcggc guuguuuuug uauaaguccg cuu

33

<210> 144

<211> 42

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 144
 ggggagcggc guuguuuagu cguauguaua uacuaagucc gc 42

<210> 145
 <211> 38
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(38)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 145
 ggggagcggc guuguuuagu cguauguaua uacuaagu 38

<210> 146
 <211> 65
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(65)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 146
 gggaggacga ugcgggguga uuauuacaga guauguauag cguaccccc agacgacucg 60
 cccga 65

<210> 147
 <211> 64
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(64)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 147
 gggaggacga ugcggaggcg uuauuagaga gucuguauag cucuagcccc agacgacucg 60
 ccga 64

<210> 148
 <211> 65
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(65)
 <223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 148
 gggaggacga ugcggggagg guauuacaga guauguauag cuguacucucc agacgacucg 60
 cccga 65

<210> 149
 <211> 65
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 149

gggaggacga ugcggggagg uuauuauaga gucuguauag cuauaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 150

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 150

gggaggacga ugcggggagg uuauuauaga gucugcavag cuauaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 151

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 151

gggaggacga ugcggugaga guauuacgga guauguauag ccguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 152

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 152

gggaggacga ugcgggggca uuauucaga gucuguauag cuguagcccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 153

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 153

gggaggacga ugcgggcgga uuauacaga guauguauag cugugccgcc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 154

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 154

gggaggacga ugcgguguga uuauagaga gucuguauag cucuaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 155
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 155
gggaggacga ugcggcggga uuauuacuga gucuguaug caguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 156
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 156
gggaggacga ugcgggugga auauuacgga gucuguaug ccguacuccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 157
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 157

gggaggacga ugcgggggga cuauuaguga gucuguauag cacuaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 158

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 158

gggaggacga ugcgggggga uuauuacagc gucuguauau cuguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 159

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 159

gggaggacga ugcgggcagg uuauuacaga gucuguauag cuguacugcc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 160

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 160

gggaggacga ugcgggguag auaucacuga gucuguauag cagugucucc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 161

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 161

gggaggacga ugcggaggga uuauacaga gucuguauag cuguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 162

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 162

gggaggacga ugcgggugga uuauacaga gucuguauag cuguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 163
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 163
gggaggacga ugcgggggcg uuauuacaga gucuguauag cuguagcccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 164
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)
<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 164
gggaggacga ugcggggggg uuauuacaca guauguauag guguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 165
<211> 65
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 165

gggaggacga ugcggaggga auauuacaga guauguauag cuguaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 166

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 166

gggaggacga ugcggggagu uuauuacagc gucuguauau cuguagcccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 167

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 167

gggaggacga ugcggugagg uuauuacaga gucuguauag cuguacuccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 168

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 168

gggaggacga ugcggggugg uuauuagaga gucuguauag cucuacgccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 169

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 169

gggaggacga ugcgggggga guauuaaaga gucuguauag cuuaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 170

<211> 65

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(65)

<223> All pyrimidines are 2'F.

<400> 170

gggaggacga ugcggggagg auauuauaga gucuguauag cuauaccccc agacgacucg 60
cccga 65

<210> 171
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
 1-5, 8, 11, 13-16, 20, 22, 24-25, 28 and 30 are
 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 171
 ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 172
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
 11, 13-16, 20, 22, 24-25, 28 and 30 are 2'OCH₃;
 linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 172
 ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 173
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>

<221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
 1-4 are 2'OCH3; linkage at positions 34 and 35 is
 3'-3'.

<400> 173
 ggagguuuu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 174
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
 5, 8, and 11 are 2'OCH3; linkage at positions 34
 and 35 is 3'-3'.

<400> 174
 ggagguuuu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 175
 <211> 34
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(34)
 <223> All pyrimidines are 2'F; a' and g's at positions
 13-16 are 2'-OCH3; linkage at positions 34 and 35
 is 3'-3'.

<400> 175
 ggagguuuu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 176

<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'E; a's and g's at positions
20, 22 and 24 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34
and 35 is 3'-3'.

<400> 176
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 177
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'E; a's and g's at positions
25, 28 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34
and 35 is 3'-3'.

<400> 177
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 178
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base

<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; g at position 20 is
2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 178
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 179
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a at position 22 is
2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 179
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 180
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a at position 24 is
2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 180
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 181
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 8, 11, 25 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 181
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 182
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 8, 11, 13-16, 24-25, 28 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 182
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 183
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 8, 11, 13-16, 20, 24-25, 28 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 183
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 184
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 8, 11, 13-16, 25, 28 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 184
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 185
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 11, 13-16, 25, 28, and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 185
ggagguuauu acagagucug uauagcugua cucc 34

<210> 186
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(34)

<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-4, 13-16, 25, 28 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 186

ggagguuuuu acagagucug uauagcugua cucc

34

<210> 187

<211> 33

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(33)

<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-5, 10, 12-15 24, 27 and 29 are 2'-OCH₃; linkage at positions 33 and 34 is 3'-3'.

<400> 187

ggaguuuuu cagagucugu auagcuguac ucc

33

<210> 188

<211> 32

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(32)

<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions 1-4, 10, 12-15, 24, 27 and 29 are 2'-OCH₃; linkage at positions 32 and 33 is 3'-3'.

<400> 188
gggguuauua cagagucugu auagcuguac cc 32

<210> 189
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'E; linkage at positions 34
and 35 is 3'-3'.

<400> 189
ugugaauuu agagagucug uauagcucua cccc 34

<210> 190
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'E; a's and g's at positions
2, 4-5, 8, 11, 13-16, 24-25 and 30 are 2'-OCH₃;
linkage at positons 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 190
ugugaauuu agagagucug uauagcucua cccc 34

<210> 191
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
2, 4-6, 8, 11-16, 20, 24-25, and 30 are 2'-OCH₃;
linkage at positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 191
ugugaauuu agagagucug uauagcucua cccc 34

<210> 192
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
2, 4, 11, 13-16, 25 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at
positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 192
ugugaauuu agagagucug uauagcucua cccc 34

<210> 193
<211> 34
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(34)
<223> All pyrimidines are 2'F; a's and g's at positions
2, 4-6, 11-16, 25 and 30 are 2'-OCH₃; linkage at
positions 34 and 35 is 3'-3'.

<400> 193
ugugaauuu agagagucug uauagcucua cccc 34

<210> 194
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(42)
<223> A's and g's at positions 1-3 and 5 are 2'-OMe.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 194
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 195
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(42)
<223> A's and g's at positions 12 and 16-18 are 2'OMe.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 195
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 196
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(42)
<223> A's and g's at positions 21, 23-24 and 28 are
2'-OMe.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic

Sequence

<400> 196
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 197
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 30-31, 38 and 42 are
 2'-OMe.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 197
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 198
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 1, 21, 23-24 and 28 are
 2'-OMe.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 198
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 199
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 2, 21, 23-24 and 28 are
2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 199

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 200

<211> 42

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 3, 21, 23-24 and 28 are
2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 200

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 201

<211> 42

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 5, 21, 23-24 and 28 are
2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 201

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 202

<211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 12, 21, 23-24 and 28 are
 2'-OMe.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 202
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 203
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 16, 21, 23-24 and 28 are
 2'-OMe.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 203
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 204
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 17, 21, 23-24 and 28 are
 2'-OMe.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic

Sequence

<400> 204
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 205
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(42)
<223> A's and g's at positions 18, 21, 23-24, and 28 are
2'-OMe.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 205
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 206
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(42)
<223> A's and g's at positions 21, 23-24, 28 and 30 are
2'-OMe.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
Sequence

<400> 206
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 207
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 21, 23-24, 28 and 31 are 2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 207

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 208

<211> 42

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 21, 23-24, 28 and 38 are 2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 208

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 209

<211> 42

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(42)

<223> A's and g's at positions 21, 23-24, 28 and 42 are 2'-OMe.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 209

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca

42

<210> 210

<211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21, 23-24,
 28, 30-31 and 42 are 2'-OMe; linkage at positions
 42 and 43 is 3'-3'.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 210
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 211
 <211> 42
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(42)
 <223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21, 23-24,
 28, 30 and 42 are 2'-OMe; linkage at positions 42
 and 43 is 3'-3'.

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
 Sequence

<400> 211
 gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca 42

<210> 212
 <211> 41
 <212> RNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <221> modified_base
 <222> (1)..(41)
 <223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21, 23-24, 28
 and 30-31 are 2'-OMe; linkage at positions 41 and
 42 are 3'-3'.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 212

gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc c

41

<210> 213

<211> 37

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(37)

<223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21, 23, 25-26 and 37 are 2'-OMe; linkage at positions 37 and 38 is 3'-3'.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 213

gggugccuuu ugccuagguu guguaaccuu cugccca

37

<210> 214

<211> 35

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> modified_base

<222> (1)..(35)

<223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21, 23-24 and 35 are 2'-OMe; linkage at positions 35 and 36 is 3'-3'.

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic Sequence

<400> 214

gggugccuuu ugccuagguu guaaccuucu gccca

35

<210> 215

<211> 33

```

<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<221> modified_base
<222> (1)..(33)
<223> A's and g's at positions 1-3, 16-18, 21-22, and 33
      are 2'-OMe; linkage at positions 33 and 34 is
      3'-3'.

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
      Sequence

<400> 215
gggugccuuu ugccuagguu aaccuucugc cca                               33

<210> 216
<211> 42
<212> RNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic
      Sequence

<400> 216
gggugccuuu ugccuagguu gugauuugua accuucugcc ca                       42

```

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、TGF β 2についてなされる様々なSELEX実験を要約するフローチャートである。矢印の長さは左に示されるラウンド回数に対応する。連結された矢印は、SELEX実験における分枝を示し、ここでは新たな分枝を開始するのにプールを使用した。それぞれの矢印の下に、アフィニティーの改善倍率も示す。

【図2】 図2は、BIAcoreカルボキシメチルセルロース(CM5)チップ上でアミンカップリングした後のTGF β 2の活性を示す。実施例1に記載されるようにNHS-EDCカップリングを使用して、フローセル(FC)1、2及び3について、それぞれ約18、718及び1692反応ユニットで、CM5チップにTGF β 2を負荷した。FC-4は対照としてブランクのままにし、他のFCからのシグナルを正規化するのに使用した。次いでこのチップを、10nMの潜伏関連ペプチド(LAP)(図2A)又はTGF β 可溶性受容体II

I (s R I I I) (図 2 B) のいずれかへ、結合緩衝液 20 μ L / 分で曝露した。図示されるように、会合相及び解離相についてのデータを収集した。FC - 4 由来のシグナルを他の FC から差引いた。

【図3】 図3は、spr SELEXの間のアフィニティー改善を示す。実施例1に記載されるようにNHS - EDCカップリングを使用して、フローセル (FC) 1、2及び3について、それぞれ約18、718及び1692反応ユニットで、CM5チップにTGF 2を負荷した。FC - 4は対照としてブランクのままにし、他のFCからのシグナルを正規化するのに使用した。次いでこのチップを、図示されるようにSELEXラウンド (Rd) 由来の1 μ MのRNAプールへ、結合緩衝液20 μ L / 分で曝露した。図示されるように、会合相及び解離相についてのデータを収集した。FC - 4由来のシグナルを他のFCから差引いた。

【図4】 図4は、spr SELEX由来のプールを用いたニトロセルロースフィルター結合曲線を示す。図示されるように、各ラウンド (R) 由来の高比活性の内部標識RNAを使用した。標識RNAを、約100,000倍モル過剰の非標識tRNAの存在下で、様々な濃度のTGF 2とともにインキュベートした。結合したRNAをニトロセルロース濾過により分配し、定量した。実施例1に記載のようにデータを分析した。

【図5】 図5は、様々なプールを用いたニトロセルロースフィルター結合曲線を示す。図示されるように、各ラウンド (R) 由来の高比活性の内部標識RNAを使用した。標識RNAを、様々な濃度のTGF 2とともに (競合剤のtRNAは使用しない) インキュベートした。結合したRNAをニトロセルロース濾過により分配し、定量した。実施例1に記載のようにデータを分析した。

【図6】 図6は、リードTGF 1アプタマー及びTGF 2アプタマーの生物活性の特異性と市販の抗体調製物との比較を示す。RNAはホスホロアミダイト化学 (NX 2 2 2 8 3) (配列番号 1 1 4) によるか又はインビトロ転写のいずれかにより合成した。指示細胞 (ミンク肺上皮細胞) を、TGF 1、TGF 2又はTGF 3のいずれかとRNA又は抗体の希釈液とともに、記載のようにインキュベートした。細胞増殖の程度を³H - チミジン取込みにより測定

し、記載のようにデータを分析した。点は $n = 2 \sim 6$ の平均を表し、誤差の棒線は標準誤差である。TGF 1、TGF 2又はTGF 3により示される記号は、それぞれTGF 1、TGF 2又はTGF 3のいずれかで処理した細胞から得られるデータを示す。MABとpABは、それぞれモノクローナル抗体とポリクローナル抗体を示す。ランダム、NX22283、及び40-03は、それぞれ、ランダムRNA、TGF 2、又はTGF 1のリードアプタマーを示す。アプタマー40-03は、「高アフィニティーTGF 核酸リガンド及び阻害剤」と題する米国特許出願第09/046,247号(1998年3月23日出願)に記載された。

【図7】 図7は、TGF 2リガンド14-1(配列番号72)、21-21(配列番号87)、及び21-4(配列番号86)の境界部分を示す。RNAアプタマーは、5'末端(3'B)又は3'末端(5'B)で末端標識し、高pHで部分的に加水分解し、実施例1に記載のようにニトロセルロース濾過によりTGF 2に対する結合について分配した。結合分配に用いたTGF 2の量は示される通りである。回収したRNAを高解像配列決定ゲル上で分析し、オートラジオグラフィにより可視化した。非選択的に加水分解されたRNAをマーカー(A1k.hydr.)として使用し、バンド形成パターンを各リガンドの配列へ並置した。観察された境界のバンドを(´)で示し、配列パターン内におけるそれらの位置を矢印で示す。「タンパク質なし」と「インプット」のレーンは、ニトロセルロースと最初の非加水分解RNAに対するバックグラウンドの結合を示す。各リガンドについて観察された境界を図の下に要約する。

【図8】 図8は、TGF 2アプタマーの推定構造を示す。必要とされる最小の配列は類似の構造を示した。リガンド14i-1t5-41(配列番号131)及び21a-4(ML-110)(配列番号144)はインビトロ転写され、効率的なインビトロ転写を可能にする過剰な塩基をその5'末端(小文字で示す)に含有した。太字は、21-21配列(配列番号93)を用いた偏向SELEXの不変位置と同一な位置を示す。

【図9】 図9は、NX2232340kPEG(配列番号115)の分子構造を示す。rG=2'OHG;rA=2'-OHA;fU=2'FU;f

C = 2'FC。

【図10】 図10は、リード短鎖型リガンドのCD70（配列番号216）の推定構造を示す。小文字は2'OHを必要とする位置を示し、 $\bullet$ はGU塩基対合を示す。

【図11】 図11は、スプレグドローラットにおけるTGF β 1 アプタマー（用量1mg/kg）の薬物動態を示す。

【図12】 図12は、TGF β 1とTGF β 1アプタマーのM22（配列番号215）を用いてMLECについて実施した3種の個別PAI-1シフェラーゼアッセイの結果を示す。陰性対照は関連のないアプタマーである。TGF β 1濃度は16時間20pMで一定に保った。

【図13】 図13は、TGF β 2とTGF β 2アプタマーのNX22421（配列番号186）を用いてMLECについて実施した3種の個別PAI-1シフェラーゼアッセイの結果を示す。陰性対照は関連のないアプタマーである。TGF β 2濃度は16時間10pMで一定に保った。

【図1】

図1

【図2】

図2 A

図2 B

【図3】

【図4】

【図 5】

【図6】

図6

【図8】

21a-21 (ML-95) 又は
NX22284

配列番号93

21a-4(ML-110)

配列番号144

14i-1t5-41

配列番号131

図8

【図9】

TGFβ2 リガンド=
rGrArGrGfUfUrAfUfUrAfCrArGrArGfUfCfUrGfUrArGfCfUrGfUrAfCfUfCfC-3'-3'-dT
配列番号115

図9

【図10】

配列番号216

【図11】

【図12】

【図13】

【手続補正書】**【提出日】**平成14年3月28日(2002.3.28)**【手続補正1】****【補正対象書類名】**明細書**【補正対象項目名】**特許請求の範囲**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【特許請求の範囲】**

【請求項1】 精製及び単離された、TGF β 2に対する非天然のRNAリガンドであって、表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9(配列番号21～121及び配列番号128～193)に示される配列からなる群から選択される、前記リガンド。

【請求項2】 TGF β 2核酸リガンドと、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物から構成される複合体。

【請求項3】 前記リガンドと前記非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物との間にリンカーをさらに含んでなる、請求項2に記載の複合体。

【請求項4】 前記非免疫原性の高分子量化合物がポリアルキレングリコールである、請求項2に記載の複合体。

【請求項5】 前記ポリアルキレングリコールがポリエチレングリコール(PEG)である、請求項4に記載の複合体。

【請求項6】 前記PEGが約10～80kの分子量を有する、請求項5に記載の複合体。

【請求項7】 前記PEGが約20～45kの分子量を有する、請求項6に記載の複合体。

【請求項8】 前記複合体が

【化1】

リガンド＝

rGrGrArGrGfUfUrAfUfUrAfCrArGrArGfUfCfUrGfUfUrArGfCfUrGfUrAfcfUfCfC-3'-3'-dT

(配列番号115)であって、rGが2'OHGであり、rAが2'OH Aであり、fUが2'FUであり、及びfCが2'FCである、請求項7に記載の複合体。

【請求項9】 TGF 2核酸リガンドと、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物から構成される複合体であって、前記リガンドが表5、表7、表8、表11、表13、表14、表16～表19及び図9(配列番号21～121及び配列番号128～193)に示される配列からなる群から選択される、前記複合体。

【請求項10】 前記リガンドと前記非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物との間にリンカーをさらに含んでなる、請求項9に記載の複合体。

【請求項11】 前記非免疫原性の高分子量化合物がポリアルキレングリコールである、請求項9に記載の複合体。

【請求項12】 前記ポリアルキレングリコールがポリエチレングリコール(PEG)である、請求項11に記載の複合体。

【請求項13】 前記PEGが約10～80kの分子量を有する、請求項12に記載の複合体。

【請求項14】 前記PEGが約20～45kの分子量を有する、請求項13に記載の複合体。

【請求項15】 精製及び単離された、トランスフォーミング増殖因子1(TGF 1)に対する非天然のRNAリガンドであって、表22(配列番号1

94～215)に示される配列からなる群から選択される、前記リガンド。

【請求項16】 TGF 1核酸リガンドと、非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物から構成される複合体であって、前記リガンドが請求項15に示される配列からなる群から選択される、前記複合体。

【請求項17】 前記リガンドと前記非免疫原性の高分子量化合物又は親油性化合物との間にリンカーをさらに含んでなる、請求項16に記載の複合体。

【請求項18】 前記非免疫原性の高分子量化合物がポリアルキレングリコールである、請求項16に記載の複合体。

【請求項19】 前記ポリアルキレングリコールがポリエチレングリコール(PEG)である、請求項18に記載の複合体。

【請求項20】 前記PEGが約10～80kの分子量を有する、請求項19に記載の複合体。

【請求項21】 前記PEGが約20～45kの分子量を有する、請求項19に記載の複合体。

【國際調查報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US00/20397
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) :C07H 21/02, 21/04 US CL :536/22.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 536/22.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WEST, DIALOG ONESEARCH; search terms: nucleic ligand, aptamer, TGFbeta2, polyethylene glycol, lipophilic, nonimmunogenic, polyalkylene glycol		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5,731,424 A (TOOTHMAN et al.) 24 March 1998, claims 1-9; col. 5, line 66-col. 6, line 1.	2-7
Y	US 5,859,228 A (JANJIC et al.) 12 January 1999; see entire document.	2-7
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "A" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 26 OCTOBER 2000		Date of mailing of the international search report 24 NOV 2000
Name and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703) 305-3230		Authorized officer STEPHANIE ZITOMER, PHD Telephone No. (703) 308-0196

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-コ-ト [*] (参考)
A 6 1 P 35/00		A 6 1 P 37/02	
35/04		43/00	1 1 1
37/02		C 1 2 N 15/00	Z N A A
43/00	1 1 1	A 6 1 K 37/02	
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW		
(72)発明者	ロチュリー, マイケル アメリカ合衆国カリフォルニア州94541 - 3581, ハイワード, クリークビュー・コート 3374		
(72)発明者	ゴールド, ラリー アメリカ合衆国コロラド州80302, ボールダー, フィフス・ストリート 1033		
Fターム(参考)	4B024 AA01 AA11 CA11 HA03 4C076 AA01 AA09 AA12 AA13 AA17 AA19 AA22 AA25 AA29 BB01 BB13 BB15 BB16 BB25 BB27 BB29 BB30 BB31 CC01 CC07 CC15 CC27 CC31 EE59N EE59Q FF34 FF63 4C084 AA02 AA03 AA07 AA17 BA44 MA13 MA17 MA22 MA23 MA24 MA28 MA31 MA34 MA44 MA52 MA56 MA59 MA60 MA63 MA66 NA14 ZA012 ZA592 ZB072 ZB262 ZB312 ZC412		

专利名称(译)	高亲和力TGFβ ₂ 核酸配体和抑制剂		
公开(公告)号	JP2003517295A	公开(公告)日	2003-05-27
申请号	JP2001513963	申请日	2000-07-26
[标]申请(专利权)人(译)	吉利德科学公司		
申请(专利权)人(译)	Girido科学公司		
[标]发明人	パグラティスニコス ロチュリーマイケル ゴールドラリー		
发明人	パグラティス,ニコス ロチュリー,マイケル ゴールド,ラリー		
IPC分类号	C12N15/09 A61K9/127 A61K38/00 A61K47/48 A61P25/00 A61P31/00 A61P35/00 A61P35/04 A61P37/02 A61P43/00 C07B61/00 C07H19/06 C07H19/10 C07H21/00 C07K14/00 C07K14/49 C07K14/495 C07K14/50 C12N9/12 C12N15/10 C12N15/113 C12N15/115 C12Q1/37 C12Q1/68 C12Q1/70 F02B75/02 G01N33/531 G01N33/532 G01N33/535 G01N33/569 G01N33/68 G01N33/76		
CPC分类号	A61K9/1271 A61K9/1272 A61K38/00 A61K47/547 A61K47/549 A61P25/00 A61P31/00 A61P35/00 B82Y5/00 C07H19/06 C07H19/10 C07H21/00 C07K14/001 C07K14/49 C07K14/495 C07K14/50 C12N9/1276 C12N15/1048 C12N15/1136 C12N15/115 C12N2310/13 C12N2310/322 C12N2310/53 C12Q1/37 C12Q1/6804 C12Q1/6811 C12Q1/6876 C12Q1/70 C12Q1/703 C40B40/00 F02B2075/027 G01N33/531 G01N33/532 G01N33/535 G01N33/56988 G01N33/68 G01N33/76 G01N2333/16 G01N2333/163 G01N2333/503 G01N2333/575 G01N2333/62 G01N2333/8125 G01N2333/96433 G01N2333/96455 G01N2333/966 G01N2333/9726 G01N2333/974 G01N2333/976 C12Q2525/101		
FI分类号	A61K47/48 A61P25/00 A61P31/00 A61P35/00 A61P35/04 A61P37/02 A61P43/00.111 C12N15/00.ZNA.A A61K37/02		
F-TERM分类号	4B024/AA01 4B024/AA11 4B024/CA11 4B024/HA03 4C076/AA01 4C076/AA09 4C076/AA12 4C076/AA13 4C076/AA17 4C076/AA19 4C076/AA22 4C076/AA25 4C076/AA29 4C076/BB01 4C076/BB13 4C076/BB15 4C076/BB16 4C076/BB25 4C076/BB27 4C076/BB29 4C076/BB30 4C076/BB31 4C076/CC01 4C076/CC07 4C076/CC15 4C076/CC27 4C076/CC31 4C076/EE59N 4C076/EE59Q 4C076/FF34 4C076/FF63 4C084/AA02 4C084/AA03 4C084/AA07 4C084/AA17 4C084/BA44 4C084/MA13 4C084/MA17 4C084/MA22 4C084/MA23 4C084/MA24 4C084/MA28 4C084/MA31 4C084/MA34 4C084/MA44 4C084/MA52 4C084/MA56 4C084/MA59 4C084/MA60 4C084/MA63 4C084/MA66 4C084/NA14 4C084/ZA012 4C084/ZA592 4C084/ZB072 4C084/ZB262 4C084/ZB312 4C084/ZC412		
优先权	09/363939 1999-07-29 US		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

描述了鉴定和产生对TGFβ₂的高亲和力核酸配体的方法。本发明包括通过SELEX方法鉴定的TGFβ₂特异性RNA配体。还包括抑制TGFβ₂与其受体相互作用的RNA配体。