

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-180619

(P2015-180619A)

(43) 公開日 平成27年10月15日(2015. 10. 15)

| (51) Int.Cl.          | F I         | テーマコード (参考) |
|-----------------------|-------------|-------------|
| C07K 16/10 (2006.01)  | C07K 16/10  | ZNA         |
| C07K 1/22 (2006.01)   | C07K 1/22   |             |
| C12N 15/09 (2006.01)  | C12N 15/00  | A           |
| A61P 31/16 (2006.01)  | A61P 31/16  |             |
| A61K 39/395 (2006.01) | A61K 39/395 | S           |

審査請求 有 請求項の数 1 O L 外国語出願 (全 125 頁) 最終頁に続く

|              |                                  |          |             |
|--------------|----------------------------------|----------|-------------|
| (21) 出願番号    | 特願2015-48216 (P2015-48216)       | (71) 出願人 | 399052796   |
| (22) 出願日     | 平成27年3月11日 (2015. 3. 11)         |          |             |
| (62) 分割の表示   | 特願2010-537143 (P2010-537143) の分割 | (71) 出願人 | 508236848   |
| 原出願日         | 平成20年12月8日 (2008. 12. 8)         |          |             |
| (31) 優先権主張番号 | 61/005, 725                      |          |             |
| (32) 優先日     | 平成19年12月6日 (2007. 12. 6)         |          |             |
| (33) 優先権主張国  | 米国 (US)                          |          |             |
| (31) 優先権主張番号 | 61/091, 599                      |          |             |
| (32) 優先日     | 平成20年8月25日 (2008. 8. 25)         |          |             |
| (33) 優先権主張国  | 米国 (US)                          |          |             |
|              |                                  | (74) 代理人 | 110002077   |
|              |                                  |          | 園田・小林特許業務法人 |

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 インフルエンザウイルスに対する抗体およびその使用方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】インフルエンザウイルスを中和するヒトの s c F v 抗体およびモノクローナル抗体の提供。

【解決手段】単離されたモノクローナル抗-インフルエンザヘマグルチニンタンパク質抗体又はその断片であって、該抗体が、V H 生殖系列遺伝子 I G H V 1 - 6 9 \* 0 1 によってコードされる V H アミノ酸配列と、以下の位置にアミノ酸を有し、a) 2 7 がバリンである；b) 2 8 がスレオニンである；c) 3 0 がセリンである；d) 3 1 がセリンである；e) 5 4 がメチオニンである；f) 5 5 がフェニルアラニンである；g) 5 8 がスレオニンである；h) 1 0 0 がプロリンである；i) 1 0 1 がセリンである；j) 1 0 2 がチロシンである；k) 1 0 3 がイソロイシンであり、1 0 5 がセリンである抗体又は断片。

【選択図】図 7 A - C



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

インフルエンザウイルスのヘマグルチニン(HA)タンパク質のステム領域のエピトープに結合し、インフルエンザAウイルスを中和する、単離されたモノクローナル抗体。

**【請求項 2】**

前記インフルエンザウイルスがグループEインフルエンザウイルスである、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 3】**

前記インフルエンザウイルスがH1クラスターインフルエンザウイルスである、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 4】**

前記H1クラスターインフルエンザウイルスがH1aクラスターインフルエンザウイルス又はH1bクラスターインフルエンザウイルスである、請求項3に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 5】**

前記エピトープが非線形である、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 6】**

前記エピトープがHA1とHA2のポリペプチドを含む、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 7】**

エピトープが、HA1ポリペプチドの位置18、38、40、291のアミノ酸と、HA2ポリペプチドの位置18、19、20、21、38、41、42、45、49、52、53および56のアミノ酸を含む、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 8】**

前記モノクローナル抗体がウイルスと細胞の膜融合を阻害する、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 9】**

前記モノクローナル抗体が、モノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90又はH98のHAタンパク質への結合と競合する、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 10】**

前記モノクローナル抗体が完全なヒト抗体である、請求項1に記載のモノクローナル抗体。

**【請求項 11】**

インフルエンザウイルスのヘマグルチニン(HA)タンパク質のエピトープに結合し、インフルエンザAウイルスを中和する、単離されたscFv抗体。

**【請求項 12】**

前記インフルエンザウイルスがグループEインフルエンザウイルスである、請求項11に記載の抗体。

**【請求項 13】**

前記インフルエンザウイルスがH1クラスターインフルエンザウイルスである、請求項11に記載の抗体。

**【請求項 14】**

前記H1クラスターインフルエンザウイルスがH1aクラスターインフルエンザウイルスである、請求項13に記載の抗体。

**【請求項 15】**

前記エピトープが非線形である、請求項11に記載の抗体。

**【請求項 16】**

エピトープがHA1とHA2のポリペプチドを含む、請求項11に記載の抗体。

**【請求項 17】**

10

20

30

40

50

エピトープが、H A 1 ポリペプチドの位置 1 8、3 8、4 0、2 9 1 のアミノ酸と、H A 2 ポリペプチドの位置 1 8、1 9、2 0、2 1、3 8、4 1、4 2、4 5、4 9、5 2、5 3 および 5 6 のアミノ酸を含む、請求項 1 1 に記載の抗体。

【請求項 1 8】

前記抗体がウイルスと細胞の膜融合を阻害する、請求項 1 1 に記載の抗体。

【請求項 1 9】

前記抗体が、モノクローナル抗体 D 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0 又は H 9 8 の H A タンパク質への結合と競合する、請求項 1 1 に記載のモノクローナル抗体。

【請求項 2 0】

インフルエンザウイルスによって引き起こされる疾患又は疾病の予防方法であって、前記疾患又は疾病を患うリスクにあるヒトに、請求項 1 に記載のモノクローナル抗体又は請求項 1 1 に記載の s c F v 抗体の治療上の有効量を投与することを含む方法。

【請求項 2 1】

抗ウイルス薬、ウイルス侵入阻害薬又はウイルス接着阻害薬を投与することを更に含む、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 2】

前記抗ウイルス薬が、ノイラミニダーゼ阻害薬、H A 阻害薬、シアル酸阻害薬又は M 2 イオンチャンネルである、請求項 2 1 に記載の方法。

【請求項 2 3】

前記 M 2 イオンチャンネル阻害薬がアマンタジン又は リマンタジンである、請求項 2 2 に記載の方法。

【請求項 2 4】

前記ノイラミニダーゼ阻害薬がザナミビル又は リン酸オセルタミビルである、請求項 2 2 に記載の方法。

【請求項 2 5】

グループ I インフルエンザウイルスに特異的な 2 以上の抗体を投与することを含む、請求項 2 0 又は請求項 2 1 に記載の方法。

【請求項 2 6】

グループ I I インフルエンザウイルスに特異的な抗体を投与することを更に含む、請求項 2 0、請求項 2 1 又は請求項 2 5 に記載の方法。

【請求項 2 7】

前記抗体がインフルエンザウイルスへの曝露の前又はその後に投与される、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 8】

前記抗体が、前記インフルエンザウイルスを中和するために十分な用量で投与される、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 9】

インフルエンザウイルスによって引き起こされる疾患又は疾病の治療方法であって、前記疾患又は疾病を患うリスクにあるヒトに、請求項 1 に記載のモノクローナル抗体又は請求項 1 1 に記載の s c F v 抗体の治療上の有効量を投与することを含む方法。

【請求項 3 0】

抗ウイルス薬、ウイルス侵入阻害薬又はウイルス接着阻害薬を投与することを更に含む、請求項 2 9 に記載の方法。

【請求項 3 1】

前記抗ウイルス薬が、ノイラミニダーゼ阻害薬、H A 阻害薬、シアル酸阻害薬又は M 2 イオンチャンネルである、請求項 3 0 に記載の方法。

【請求項 3 2】

前記 M 2 イオンチャンネル阻害薬がアマンタジン又はリマンタジンである、請求項 3 1 に記載の方法。

10

20

30

40

50

## 【請求項 33】

前記ノイラミニダーゼ阻害薬がザナミビル又はリン酸オセルタミビルである、請求項 31 に記載の方法。

## 【請求項 34】

グループ I インフルエンザウイルスに特異的な 2 以上の抗体を投与することを含む、請求項 29 又は請求項 30 に記載の方法。

## 【請求項 35】

グループ I インフルエンザウイルスに特異的な抗体を投与することを更に含む、請求項 29、請求項 30 又は請求項 34 に記載の方法。

## 【請求項 36】

前記抗体がインフルエンザウイルスへの曝露の前又はその後に投与される、請求項 29 に記載の方法。

## 【請求項 37】

前記抗体が、前記インフルエンザウイルスを中和するために十分な用量で投与される、請求項 29 に記載の方法。

## 【請求項 38】

請求項 1 に記載のモノクローナル抗体又は請求項 11 に記載の s c F v 抗体と担体を含む組成物。

## 【請求項 39】

抗ウイルス薬、ウイルス侵入阻害薬又はウイルス接着阻害薬を更に含む、請求項 38 に記載の組成物。

## 【請求項 40】

前記抗ウイルス薬が、ノイラミニダーゼ阻害薬、H A 阻害薬、シアル酸阻害薬又は M2 イオンチャネルである、請求項 39 に記載の組成物。

## 【請求項 41】

前記 M2 イオンチャネル阻害薬がアマンタジン又はリマンタジンである、請求項 40 に記載の方法。

## 【請求項 42】

前記ノイラミニダーゼ阻害薬がザナミビル又はリン酸オセルタミビルである、請求項 40 に記載の方法。

## 【請求項 43】

グループ I インフルエンザウイルスに特異的な 2 以上の抗体を更に含む、請求項 38 に記載の組成物。

## 【請求項 44】

グループ I インフルエンザウイルスに特異的な抗体を更に含む、請求項 38、請求項 39 又は請求項 42 に記載の組成物。

## 【請求項 45】

インフルエンザウイルスに特異的な抗体の同定方法であって、固形表面に固定されている三量体ヘマグルチニン(H A)タンパク質を試験抗体と接触させることと、そして H A タンパク質 - 抗体複合体を検出することを含む方法。

## 【請求項 46】

前記固形表面が可塑性である、請求項 45 に記載の方法。

## 【請求項 47】

前記 H A タンパク質が非哺乳動物細胞において生産される、請求項 45 に記載の方法。

## 【請求項 48】

前記 H A タンパク質が昆虫細胞において生産される、請求項 45 に記載の方法。

## 【請求項 49】

前記 H A タンパク質が、野生型 H A タンパク質に比べて変更したグリコシル化を含む、請求項 45 に記載の方法。

## 【請求項 50】

10

20

30

40

50

前記 H A タンパク質が、前記 H A タンパク質の球状上部をマスキングするように前記固形表面上で固定されている、請求項 4 5 に記載の方法。

【請求項 5 1】

三量体ヘマグルチニン(H A)タンパク質を特異的に結合する単離された抗体の製造方法であって、(a)固形表面に固定されている H A タンパク質に単鎖又は F a b 発現ライブラリをさらし、(b)該タンパク質を特異的に結合する該ライブラリ中の抗体を同定し、そして、(c)抗体をライブラリから単離することを含む方法。

【請求項 5 2】

前記固形表面が可塑性である、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 3】

前記 H A タンパク質が非哺乳動物細胞において生産される、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 4】

前記 H A タンパク質が、野生型 H A タンパク質に比べて変更したグリコシル化を含む、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 5】

前記 H A タンパク質が、前記 H A タンパク質の球状上部をマスキングするように前記固形表面上で固定されている、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 6】

前記発現ライブラリが非免疫性ライブラリである、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 7】

前記発現ライブラリが H 5 ナイーブライブラリである、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 8】

インフルエンザウイルスに対する被検体の予防接種方法であって、生物学的に適合したマトリックスにコート又は包埋された三量体ヘマグルチニン(H A)タンパク質を被検体に投与することを含む方法。

【請求項 5 9】

前記 H A タンパク質が非哺乳動物の糖鎖構造を有する、請求項 5 8 に記載の方法。

【請求項 6 0】

前記 H A タンパク質が、野生型 H A タンパク質に比べて変更したグリコシル化を含む、請求項 5 8 に記載の方法。

【請求項 6 1】

前記 H A タンパク質が、前記 H A タンパク質の球状上部をマスキングするように前記生物学的に適合したマトリックスにコート又は包埋されている、請求項 5 8 に記載の方法。

【請求項 6 2】

病原性エンベロープウイルスを特異的に結合する単離された抗体の製造方法であって、(a)固形表面に固定されている、ウイルスの膜融合タンパク質に単鎖又は F a b 発現ライブラリをさらし、(b)該タンパク質を特異的に結合する該ライブラリ中の抗体を同定し、そして、(c)抗体をライブラリから単離することを含む方法。

【請求項 6 3】

前記固形表面が可塑性である、請求項 6 2 に記載の方法。

【請求項 6 4】

前記膜融合タンパク質が非哺乳動物細胞において生産される、請求項 6 2 に記載の方法。

【請求項 6 5】

前記膜融合タンパク質が非哺乳動物の糖鎖構造を有する、請求項 6 2 に記載の方法。

【請求項 6 6】

前記膜融合タンパク質が、野生型膜融合タンパク質に比べて変更したグリコシル化を含む、請求項 6 2 に記載の方法。

【請求項 6 7】

前記発現ライブラリが非免疫性ライブラリである、請求項 6 2 に記載の方法。

10

20

30

40

50

## 【請求項 68】

前記発現ライブラリが H5 ナイブライブラリである、請求項 62 に記載の方法。

## 【請求項 69】

病原性エンベロープウイルスに対する被検体の予防接種方法であって、生物学的に適合したマトリックスにコート又は包埋された、ウイルスの膜融合タンパク質を被検体に投与することを含む方法。

## 【請求項 70】

前記融合タンパク質が非哺乳動物の糖鎖構造を有する、請求項 69 に記載の方法。

## 【請求項 71】

前記融合タンパク質が、野生型膜融合タンパク質に比べて変更したグリコシル化を含む、請求項 69 に記載の方法。

## 【請求項 72】

試料中のインフルエンザウイルスの存在の検出方法であって、

a) 試料を請求項に記載のモノクローナル抗体と接触させ、そして、b) 抗体 - 抗原複合体の有無を検出し、このことにより試料中のインフルエンザウイルスの存在を検出することを含む方法。

## 【請求項 73】

検出がインビボで起こる、請求項 72 に記載の方法。

## 【請求項 74】

試料が血液、体毛、頬擦過物、唾液、生検又は精液から得られる、請求項 72 に記載の方法。

## 【請求項 75】

VH 生殖系遺伝子IGHV1-69\*01 によってコードされる VH アミノ酸配列を含み、a) 位置 27 のアミノ酸がバリンであり、b) 位置 28 のアミノ酸がスレオニンであり、c) 位置 30 のアミノ酸がセリンであり、d) 位置 31 のアミノ酸がセリンであり、e) 位置 54 のアミノ酸がメチオニンであり、f) 位置 55 のアミノ酸がフェニルアラニンであり、g) 位置 58 のアミノ酸がスレオニンであり、h) 位置 100 のアミノ酸がプロリンであり、i) 位置 101 のアミノ酸がセリンであり、j) 位置 102 のアミノ酸がチロシンであり、k) 位置 103 のアミノ酸がイソロイシンであり、位置 105 のアミノ酸がセリンであり、インフルエンザウイルスのヘマグルチニン(HA)タンパク質のステム領域のエピトープに結合して、インフルエンザ A ウイルスを中和する、単離されたモノクローナル抗体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

## (関連出願)

本出願は、2007 年 12 月 6 日に出願の US N 61 / 005725 及び 2008 年 8 月 25 日に出願の US N 61 / 091599 の優先権を主張するものであり、これらの内容は出典明記によって本明細書中に援用される。

## 【0002】

## (助成金支援)

本発明は、国立衛生研究所助成 U01 AI074518 - 01 の下で、米国政府支援により成された。米国政府は本発明の特定の権利を有する。

## 【0003】

## (技術分野)

本発明は、概して、抗ウイルス抗体並びにその使用方法に関する。

## 【背景技術】

## 【0004】

インフルエンザの世界的流行は、ヒトの健康に最も大きな急性感染の脅威の一つである。1918 ~ 1919 年のインフルエンザの世界的流行は米国の約 500,000 人の死

10

20

30

40

50

を引き起こし、米国歴史上最も致命的な現象となった。高病原性鳥インフルエンザ(H P A I ) H 5 N 1 インフルエンザはアジア全体に蔓延し、現在中東および北アフリカへ、新たな世界的流行の実質的なリスクとなっている。

自然変異(natural variation)並びに回避変異(escape mutant)は、ウイルスの継続した進化が菌株(一又は複数)を受動および能動的な免疫化に使うべきであるという決定に影響を与えうることを示唆する。多くの重要なエピトープマッピングおよび中和回避(neutralization escape)研究は新規の中和抗体を報告しているが、H P A I H 5 N 1 に対する免疫化方策を開発するためには関連の構造的な研究が必要とされている。H P A I H 5 N 1 に対する保護ワクチンを開発する試みは大変なものであり、常に変化する敵による人の感染を予防及び治療するためには新たな方策が必要である。受動的にも能動的にも保護的な宿主免疫を誘発するためには、治療的方策を急いで開発する必要がある。

ヒト抗体(A b)工学の分野は甚だしく進歩している。モノクローナル抗体(M a b)ベースの免疫療法は現在、R S Vを含む増えつつあるヒト疾患の標準的な治療となりつつある。デノボのヒトM a b単離およびその臨床使用に対する推移は、現在、高い親和性及び特異性を有するヒト抗体を構築するために利用される新規な抗体ディスプレイおよび他のライブラリスクリーニング技術にある程度よるものである。ヒトM a b免疫療法は、ヒトの疾患の臨床管理においてますます重要な役割を提供しうる。

#### 【発明の概要】

##### 【0005】

本発明は、インフルエンザウイルス、例えばインフルエンザAウイルスを中和するモノクローナル抗体の発見に基づく。インフルエンザAウイルスはH 1 クラスタインフルエンザウイルスのようなグループI インフルエンザAウイルスであり、H 1 クラスタインフルエンザウイルスはH 1 a クラスタ又はH 1 b クラスタである。モノクローナル抗体は完全にヒトである。様々な態様では、モノクローナル抗体は、二価抗体、一価抗体、単鎖抗体又はその断片である。具体的に、このようなモノクローナル抗体は、H A 1 又はH A 2 ポリペプチドのような、ヘマグルチニンタンパク質(H A)のステム領域上のエピトープに結合する。エピトープは非線形である。

場合によって、エピトープはH A - 1 およびH A - 2 を含む。エピトープは非線形である。いくつかの実施態様では、エピトープは、H A 1 ポリペプチドのアミノ酸位18、38、40、291と、H A 2 ポリペプチドのアミノ酸位18、19、20、21、38、41、42、45、49、52、53および56を含む。

例示的なモノクローナル抗体には、モノクローナル抗体D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90又はH 98、または、D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90又はH 98と同じエピトープに結合する抗体が含まれる。

##### 【0006】

本発明のモノクローナル抗体は、モノクローナル抗体D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90又はH 98の結合親和性を有しうる。あるいは、結合親和性は、およそ1 p M ~ およそ200 m Mであってよい。本発明のモノクローナル抗体は、ウイルスと細胞の膜融合を阻害するように機能する。

モノクローナル抗体は、配列番号：2、6、12、18、24、28、32および36を含む重鎖可変アミノ酸配列および/または配列番号：4、8、14、16、20、22、26、30、34および38を含む軽鎖可変アミノ酸配列とを有する。

モノクローナル抗体は、配列番号：1、5、13、15、21、23、29、33、37及び40を含む重鎖可変核酸配列、及び又は配列番号：3、9、11、17、19、25、27、31、35、39および42を含む軽鎖可変核酸配列を有する。

また、モノクローナル抗-インフルエンザヘマグルチニンタンパク質抗体又はその断片であって、該抗体が、アミノ酸配列S Y A F S、T N A F S、A Y A F T、S F A I S、S Y A I S、G Y Y I H、M T A F T又はD N A I Sを有するV<sub>H</sub> CDR 1領域；アミノ酸配列G I I P M F G T P N Y A Q K F Q G、G V I P L F R T A S Y A Q N V Q G

、G I I G M F G T A N Y A Q K F Q G、G I S P M F G T P N Y A Q K F Q G、G I I G V F G V P K Y A Q K F Q G、W I N P M T G G T N Y A Q K F Q V、G I S P I F R T P K Y A Q K F Q G又はG I I P I F G K P N Y A Q K F Q Gを有するV<sub>H</sub> CDR 2 領域；アミノ酸配列S S G Y Y Y G G G F D V、S S G Y H F G R S H F D S、G L Y Y Y E S S L D Y、S P S Y I C S G G T C V F D H、E P G Y Y V G K N G F D V、G A S V L R Y F D W Q P E A L D I、T L S S Y Q P N N D A F A I又はD S D A Y Y Y G S G G M D Vを有するV<sub>H</sub> CDR 3 領域；アミノ酸配列T G S S S N I G N Y V A、T G S S S N I A A N Y V Q、T G T S S D V G G Y N S V S、T G N S N N V G N Q G A A、T G D S N N V G H Q G T A、G G N N I G G Y S V H、R A S Q S V S S Y L A、R A S Q S L S S K Y L A、T G S S S N I G N Y V A、S G S S S N I G S N T V N、R A S Q S I S S Y L N又はT L S S G H S N Y I I Aを有するV<sub>L</sub> CDR 1 領域；アミノ酸配列S N S D R P S、E D D R R P S、E V T K R P S、R N N D R P S、R N G N R P S、D D K D R P S、D A S N R A T、G A S S R A T、S N N Q R P S、A A S S L Q R、S N E Q R P S又はV N S D G S H T K G Dを有するV<sub>L</sub> CDR 2 領域、および/またはアミノ酸配列Q S Y D S L S A Y V、Q S Y D T N N H A V、C S Y A G H S A Y V、S T W D S S L S A V V、S V W D S S L S A W V、Q V W D S G N D R P L、Q Q Y G S S P Q V、Q Q Y D G V P R T、Q S Y D S R L S A S L、Q Q Y D S S P Y T、A S W D D N L S G W V又はE T W D T K I H Vを有するV<sub>L</sub> CDR 3 領域を有する抗体又は断片が本発明によって提供される。

10

20

**【0007】**

更なる態様では、本発明は、単離されたモノクローナル抗-インフルエンザヘマグルチニンタンパク質抗体又はその断片であって、該抗体が、V<sub>H</sub>生殖系列遺伝子IGHV1-69\*01によってコードされるV<sub>H</sub>アミノ酸配列と、以下の位置にアミノ酸を有し、a) 27がバリンである；b) 28がスレオニンである；c) 30がセリンである；d) 31がセリンである；e) 54がメチオニンである；f) 55がフェニルアラニンである；g) 58がスレオニンである；h) 100がプロリンである；i) 101がセリンである；j) 102がチロシンである；k) 103がイソロイシンであり、105がセリンである抗体又は断片を提供する。

30

他の態様では、本発明は、インフルエンザウイルスによって生じる疾患又は疾病を患うリスクにあるヒトに、治療的に有効量の本明細書中に記載のモノクローナル抗体又はs c F V抗体を投与することによる、該疾患又は疾病の予防又は治療の方法を提供する。モノクローナル抗体又はs c F V抗体は、インフルエンザウイルスを中和するために十分な用量で投与される。本発明の実施態様では、方法もまた、抗ウイルス薬、ウイルス侵入阻害薬又はウイルス接着阻害薬を投与することを含む。抗ウイルス薬は、ザナミビル又はオセルタミビルリン酸塩のようなノイラミニダーゼ阻害薬、H A阻害薬、シアル酸阻害薬、又はアマンタジン又はリマンタジンのようなM 2 イオンチャネルである。抗体はインフルエンザウイルスへの曝露の前又は後に投与される。

**【0008】**

他の態様では、本発明は、試料を本明細書中に記載のモノクローナル抗体と接触させ、抗体-抗原複合体の有無を検出し、これによって試料中のインフルエンザの存在を検出することによって、試料中のインフルエンザウイルスの存在の検出方法を提供する。試験試料は一般に、血液、体毛、頬擦過物又は塗布物、唾液、生検、尿、糞便、痰、鼻吸引又は精液から得られる。

40

さらに、本発明は、H Aのステム領域の高く保存されたエピトープを標的とする広い中和ヒト抗体を生成するためのプロトコルの発見に基づく。可塑性(プラスチック)表面に吸着された無電荷のマノースと短いN-グリカンを生産するバキュロウイルスに発現される三量体H 5外部ドメインを用いると、正常に免疫優性球状ヘッドをマスキングしながら、ステムエピトープを優性に提示することができた。

**【0009】**

したがって、本発明はまた、単鎖又はF a b発現ライブラリをウイルスの膜融合タンバ

50

ク質にさらし、該タンパク質を特異的に結合するライブラリ中の抗体を同定し、そしてライブラリから抗体を単離することによる、病原性エンベロープウイルスを特異的に結合する単離された抗体の製造方法も包含される。好ましくは、融合タンパク質は、固形表面、例えばプラスチックに固定される。様々な態様では、融合タンパク質は、野生型融合タンパク質と比較して変更したグリコシル化を有する。例えば、融合は、昆虫細胞などの非哺乳動物細胞内で産生される。融合タンパク質は、例えば三量体ヘマグルチニン(HA)タンパク質である。

本発明はさらに、生物学的に適合性のあるマトリックスにコートされたか又は包埋された膜融合タンパク質(例えば三量体ヘマグルチニン(HA)タンパク質)を被検体に投与することによる、インフルエンザウイルスなどの病原性エンベロープウイルスに対して被検体を予防接種する方法を提供する。様々な態様では、融合タンパク質は、野生型融合タンパク質と比較して変更したグリコシル化を有する。

他の態様では、本発明は、本明細書中に記載のモノクローナル抗体を含む組成物、及び一又は複数の容器内の組成物と使用のための指示書を具備するキットを提供する。

#### 【0010】

特に定義しない限り、本明細書中で用いるすべての技術的及び化学的用語は、本発明が属する分野の通常の技術者によって共通して理解される意味と同じである。本明細書において記述されるものに類似する方法及び材料又はその等価物が、本発明の実施又は試験に使われうるが、適切な方法および材料は後述する。本明細書において言及されるすべての刊行物、特許出願、特許および他の文献は、出典明記によってその全体が本明細書中に援用される。紛争の場合、定義を含む本明細書は管理するであろう。さらに、材料、方法および実施例は例示のためだけのものであって、制限を目的とするものではない。

本発明の他の特徴および効果は以下の詳細な説明および特許請求の範囲から明らかである。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0011】

【図1A】A/Vietnam1203/04三量体の構造の例である。レセプター結合部位および抗原性変異部位を単量体上で強調して示す。

【図1B】ポジティブ選択下にあるH5N1インフルエンザウイルスのHAのアミノ酸残基の位置を示す例である。

【図2】H5N1の収束組合せ免疫療法の概略図である。

【図3】本発明の抗インフルエンザ抗体のVH及びVLのフレームワーク領域1-4(FR1-4)及び相補性決定領域1-3(CDR1-3)のアミノ酸配列比較を示す例である。FRおよびCDR領域はカバットデータベースを使用して定められる。VHおよびVLの遺伝子名を右に示す(IMG Tデータベースを使用する)。点はコンセンサス配列に対する配列同一性を示す。ハイフンはギャップを表す。

【図4】抗H5抗体のインビトロ中和を示す。(a)(上パネル)10のnAbを可溶性scFv-Fc(ヒンジ、CH2およびCH3に連結した可変領域の単鎖断片)に変換し、H5TH04-偽型のウイルスに対する活性の中和について評価した。2つの濃度の中和割合を標準誤差バーにて示す。mAb 80R<sup>16</sup>をコントロール(Ctrl)として用いた。(中央及び下パネル)、ブラック減少アッセイを用いた3つの濃度の10のscFv-Fcによる野生型H5-VN04及びH5-IN05の中和。結果は、マイクロ中和アッセイから得られたデータと一致している(データは示さない)。(b)交差サブタイプ中和。nAb D8、F10及びA66すべてがH5-TH04、H1-SC1918((A/South Carolina/1/1918(H1N1))、H1-PR34(A/Puerto Rico/8/34(H1N1))、H2-JP57(A/Japan/305/57(H2N2))及びH6-NY98(A/chicken/New York/14677-13/1998(H6N2))偽型ウイルスを中和した。(c)マイクロ中和アッセイ。H5N1およびCtrlに対して生じたマウスmAb 21G8.6と比較したときの、野生型H5N1、H1N1(A/Ohio/83(「H1-OH83」))およびH2N2(A/Ann Arbor/6/

10

20

30

40

50

60(「H2-AA60」))に対するF10の中和力価。80R(1mg/mL Ab原液)。「<」は20未満の力価を示す。結果は2つの独立した実験を表す。

【図5】中和メカニズムを示す。(a) H5-TH04-偽型HIV-1ウイルスの完全長HAを用いたウイルス結合阻害アッセイ。Ab処理群の細胞に対するウイルスの結合は、Abがない場合の細胞への結合(100%定める)と比較した。3つのnAb(D8、F10及びA66)はいずれも細胞へのウイルス結合を阻害しなかったが、赤血球凝集を阻害し、おそらくヘッドに結合するマウス抗H5 mAbである17A2.1.2とフェレット抗H5N1血清はいずれも有意に結合を低減した。(b) nAbによるシンシチウム(合胞体)形成の阻害。HeLa細胞にH5-TH04発現プラスミドを形質移入した。pH5.0バッファに短時間さらすことによって誘導したシンシチウム形成は、20µg/mLのnAb D8、F10及びA66によって完全に阻害されたのに対して、同じ濃度のコントロール及び抗HA1 mAb(2A)は効果を示さなかった。

【図6】H5-F10エピトープの構造と配列/構造の保存を示す。(a) F10(scFv)に結合したH5三量体の構造。H5は複合体化されなかった構造<sup>21</sup>に非常に類似している(2つの独立した三量体では、ペアワイズRMSD(Cα)=1.0及び0.63)。HA1、HA2、HA2のαAヘリックス、「融合ペプチド」(FP)およびF10(VHおよびVL)を色分けして示す。第3のF10はステムの後に隠れている。VLはH5と接触しないことを注記する。(b) 中央のステム領域の表面。1つの単量体を鎖ごとに色分けする。エピトープに沿ったFPの経路(赤)の輪郭を示す。結合に作用していない突然変異を青色とする。2つの単量体において融合ペプチド(FPおよびFP')を可視化する。エピトープ残基は白色(HA2)又は黄色(HA1)で標識した。(c) F10の先端(赤リボン)と選択されたCDR側鎖を示すエピトープの拡大図。界面の1500<sup>2</sup>埋没表面の43%は疎水的相互作用を伴う。(d) HAサブタイプのオーバーレイ: H1、H5およびH9(グループ1)を赤/黄色の影(1RU7、2IBXおよび1JSD)で、H3およびH7(グループ2)を青の影(1MQLおよび1TI8)で示す。ペアワイズオーバーレイのRMSDは0.56±0.11(観察範囲、グループ1)、0.75(グループ2)、そしてグループ間では1.21±0.12である。グループ間の一貫した相違には、18<sub>1</sub>及び38<sub>1</sub>での側鎖方向を交替させるために連結されるW21<sub>2</sub>の配位、17<sub>1</sub>でのヒスチジン(グループ2)より大きなチロシン(グループ1)の埋没、そしてW21<sub>1</sub>に対して埋没したHis111<sub>2</sub>(グループ1)のパッキングが含まれる。他のエピトープ残基は丸で囲んだ数字で示す。N38<sub>1</sub>はH3およびH7クラスターにおいてグリコシル化される。(e) 16のHAサブタイプの配列。円は算出結合エネルギーを示す。強=青、中間=橙、弱=青、好ましくない=黒。着色した強調表示は、クラスターおよびグループ内での配列の保存を示す。融合構造<sup>29</sup>を安定化させるヘリックス内接触のネットワークを配列の下に示す。

【図7】マウスの抗H5 nAbの予防及び治療的有効性を示す。マウスを、致死性ウイルス抗原投与の前又は後に異なる用量のnAbにて処理する。予防有効性(a、b、g及びh)。マウスを、H5N1又はH1N1の10半致死量(MLD<sub>50</sub>)の鼻腔内投与(i.n.)により、致死性抗原投与の24時間前に抗H5 nAb又はコントロールmAbにて処理した。(a) 10mg/kgの3ついずれかのnAbの腹腔内投与(i.p.)によりH5-VN04(A/Vietnam/1203/04(H5N1)、クレイド1)にて抗原刺激したマウスは完全に保護された。低用量の抗体(2.5mg/kg)でも非常に保護された。(b) H5-HK97(A/Hong Kong/483/97(H5N1)、クレイド0)ウイルスからの予防的保護は、10mg/kgの3ついずれかのnAbにて処置したマウスの80~100%に観察された。(g) 3ついずれかのnAb(10mg/kgの単回注射)により、H1-WSN33(A/WSN/1933(H1N1))ウイルスによる抗原刺激マウスが完全に保護された。(h) 10mg/kgを単回注射すると、D8およびF10は、H1-PR34(A/Puerto Rico/8/34(H1N1))にて抗原刺激したマウスを完全に保護した。25mg/kgの抗体が単回注射として投与されると、A66によりマウスが完全に保護された。治療有効性(c-f)。マウスは、H5-VN04を接種

し、24、48、72 h p i (c、e および f) の n A b、または、24 h p i の H 5 - H K 9 7 を注入した(d)。接種後24時間目(h p i)に15 m g / k g (ヒトの治療的に達成可能な用量)の3ついずれかのn A bを腹腔内処置すると、H 5 - V N 0 4 又はH 5 - H K 9 7 ウイルスの10倍のM L D<sub>50</sub>にて抗原刺激したマウスの80～100%が保護された。

【図8】H A タンパク質のS D S - P A G E およびゲル濾過分析を示す。(a) H 5 - T H 0 4 のH A 1 (残基11 - 325)断片に対する個々のH A 1 標的選別から抗体2 A を得た(左パネル)。ライブラリ選別のために用いたH 5 H A (H 5 - V N 0 4 菌株)を右パネルに示す。(b) H 5 - V N 0 4 (H 5) およびs c F v - F 1 0 複合体。H A 0 は、フューリンとの同時発現によりH A 1 およびH A 2 に完全に切断された(左パネル)。複合体は、初めに1 : 10 のモル比でH 5 とF 1 0 を混合することによって形成させ、次いでゲル濾過によって精製した。

【図9】E L I S A および競合E L I S A による抗H 5 s c F v - F c のH 5 又はH A 1 への結合を示す。(a) 1 μ g / m l の抗H 5 s c F v - F c の後にH R P - 抗ヒトI g G 1 を用いて、E L I S A プレート上にコートしたH A 1 (H 5 - T H 0 4) 又はH 5 (H 5 - V N 0 4) への抗H 5 s c F v - F c の結合を検出した。H A 1 サブユニットに対して選別した抗体、m A b 2 A s c F v - F c はH A 1 およびH 5 に結合した。10の強力な中和s c F v - F c はH A 1 でなくH 5 に結合した。(b) 10<sup>12</sup> p f u の抗H 5 ファージ-s c F v を、5 μ g / m l の抗H 5 s c F v - F c と混合し、H 5 (H 5 - V N 0 4) - コートプレートに加え、洗浄して、その後H R P - 抗M 1 3 にてH 5 に結合したファージ-s c F v を検出した。m A b 2 A - F c は10のH 5 選別A b によって認識されるエピートープと競合しなかった。すべてのH 5 選別s c F v - F c は交差競合した。これらのうち、H 5 三量体に結合するA b F 1 0 (ファージ-s c F v) は他のs c F v - F c による阻害が最も低かったことから、試験したA b すべての中で最も親和性が高いことを示す。

【図10】n A b D 8、F 1 0 およびA 6 6 - I g G 1 へのH 5 の結合の動態学的及び熱力学的特徴を示す。n A b は抗ヒトI g G 1 によりC M 4 チップに捕獲された。様々な濃度(20、10、5、2.5、2.5、1.25、0.625 n M)の三量体H 5 (H 5 - V N 0 4) をチップ表面に注入した。結合動態は1 : 1 ラングミュア結合モデルを用いて評価した。記録された結合曲線(ブランク対照を減算したもの)と算出されたカーブは、密接に重なり合った。各々のk<sub>a</sub>、k<sub>d</sub> およびK<sub>D</sub> 値は、3つの実験の平均および標準誤差を表す。

【図11】H A サブタイプの間の系統発生の関係および配列比較を示す。アミノ酸配列に基づくインフルエンザA ウイルスの16のH A サブタイプの系統樹。H A サブタイプの4つのクラスターを異なる色で示す。分析のために使用した配列は以下の通りであった。H 1 (A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1918)、H 2 (A / J a p a n / 305 / 1957)、H 3 (A / A i c h i / 2 / 1968)、H 4 (A / d u c k / C z e c h o s l o v a k i a / 56)、H 5 (A / V i e t N a m 1203 / 2004)、H 6 (A / c h i c k e n / C a l i f o r n i a / 431 / 00)、H 7 (A / N e t h e r l a n d / 219 / 03)、H 8 (A / t u r k e y / O n t a r i o / 6118 / 68)、H 9 (A / s w i n e / H K / 9 / 98)、H 10 (A / c h i c k e n / G e r m a n y / N 49)、H 11 (A / d u c k / E n g l a n d / 56)、H 12 (A / d u c k / A l b e r t a / 60 / 76)、H 13 (A / g u l l / M a r y l a n d / 704 / 77)、H 14 (A / m a l l a r d / A s t r a k h a n / 263 / 1982)、H 15 (A / s h e a r w a t e r / W e s t A u s t r a l i a / 2576 / 79) およびH 16 (A / b l a c k - h e a d e d g u l l / S w e d e n / 2 / 99)。

【図12】H 5 - V N 0 4 抗原投与後、抗H 5 n A b にて処置したマウスの肺、脾臓および脳のウイルス力価を示す。B A L B / c マウス(n = 5)は、10 M L D<sub>50</sub> のH 5 - V N 0 4 をi. n. 感染させた後、24、48又は72時間目に15 m g / k g のm A b を腹腔内注射した。ウイルス力価は、96 h p i に採取した肺、脳および脾臓において決定した。データは、ボックスが第25から第75のパーセンタイルまで伸び、中央値に水平線を示す、箱髭様式で表す。箱の上下の髭は極値を示す。スチューデントT検定統計分析の

結果は、 $p < 0.05$ を1つの星(\*)、 $p < 0.01$ を2つの星(\*\*)を付して示す。Y軸を越えた矢印は滴定の検出限界を示す。

【図13】H1、H2、H5、H6、H11、H13およびH16を含むすべてのH1クラスターHAへの抗H5 nAb結合のFACS分析を示す。293T細胞に異なるHA発現プラスミドを過渡的に形質移入し、HA発現細胞へのmAb結合をFACSによって分析した。抗SARS mAb 80Rをコントロールとして用いた。2A-FcはH5 HA特異的抗体である。グループ2 HA、H7への結合の欠如も示された。H11、H13およびH16のウイルス株詳細は以下の通りである。H11-MP74(A/Duck/memphis/546/74(H11N9))、H13-MD77(A/Gull/MD/704/77(H13N6))およびH16-DE06(A/Shorebird/DE/172/06(H16N3))。

【発明を実施するための形態】

【0012】

(発明の詳細な説明)

インフルエンザA型は、10のタンパク質をコードする8セグメントのゲノムを有するネガティブセンスの一本鎖RNAウイルスである。それは、ヌクレオキャプシッドおよびマトリクスタンパク質の抗原性によって定義されるように、インフルエンザウイルスA、BおよびCの属を含むファミリーオルソミクスウイルス科に属する。概して、インフルエンザAウイルスはヒトの重症疾患と関係している。インフルエンザAウイルスはさらに、2つの表面タンパク質、細胞侵入のための宿主細胞にウィリオンを付着するヘマグルチニン(HA)と、プロジェニーウイルス又は細胞表面に付着した宿主シアル酸を切断することによってプロジェニーウイルスの拡散を促すノイラミニダーゼ(NA)によってサブタイプ分けされる。

16のHAサブタイプと9のNAサブタイプがあり、HAとNAの様々な組合せによってインフルエンザAウイルスのすべてのサブタイプを成す。16のHAと9のNAウイルスサブタイプのすべての組合せは水鳥に見られる。トリインフルエンザAウイルスの何百もの菌株の中で、H5N1、H7N3、H7N7およびH9N2の4つだけがヒトの感染を引き起こすことが知られている。通常、これらのウイルスによるヒト感染は、軽度の症状であって重症な疾病をほとんど引き起こさない。唯一、H7N7によって引き起こされた肺炎の致命的な症例があるのみである。しかしながら、ヒトでは自然免疫がない、病原性の高いH5N1ウイルスは例外である。RNAポリメラーゼの不信および宿主免疫の選択圧は、突然変異の蓄積とこれらのタンパク質の表面抗原性の変化をもたらさう。この抗原性変化は抗原ドリフトと呼ばれている。加えて、その分節されたゲノムの結果として、2つの異なるサブタイプのインフルエンザAウイルスが同じ細胞を感染する場合、遺伝子セグメントのシャフリング(組み換え)が起こりうる。例えば、ヒトのH3N2ウイルスとトリH5N1ウイルスは共に、ヒト又は哺乳類種の他の類に感染し、このような現象は新しいH5N2を生じうる。次いで、この新規のウイルスは、ほとんどすべての遺伝子セグメントがヒトのウイルスから生じているので、ヒトからヒトへ効率よく伝達されうる。このような遺伝子再結合により主要な抗原変化、いわゆる抗原シフトが生じ、世界的な集団のほとんどが再構成ウイルスに対する中和抗体を持っていない。インフルエンザH5N1肺炎の高死亡率と加えて、このような状況は、公衆衛生の分野において最も恐れられる状況の一つである。

【0013】

インフルエンザウイルスヘマグルチニン(血球凝集素)(HA)は、インフルエンザウイルスの可変性の高い抗原であって、細胞へのウイルス侵入を担う。これは三量体前駆体ポリペプチドHA0として合成され、単一ジスルフィド結合によって連結される2つのポリペプチドHA1とHA2に翻訳後切断される。HAのHA1鎖は細胞表面へのウイルスの接着の原因となる。HA2はウイルスとエンドソームの細胞膜との融合を媒介し、細胞質へのリボヌクレオタンパク質複合体の放出を可能とする。HA1とは対照的に、HA2分子はHAの相対的に保存された部分を表す。第二免疫原性インフルエンザタンパク質はノイ

ラミニダーゼ (N A) である。この四量体糖タンパク質は、プロデューサー細胞上の表面シアル酸からウイルス粒子を放出する原因となり、また、気道の標的細胞への接触を促す際の役割を有しうる。N A に対する中和抗体が動物およびヒトにおいて保護的であるにもかかわらず、その作用機構についての情報は不足している。N 1 ノイラミニダーゼの結晶構造についての最近の報告は、抗体を含む新規の抗インフルエンザ剤を開発するために利用されるその活性部位に隣接するキャビティの存在を示した。この発見は、H 5 N 1 ウイルスのためのオセルタミビル (タミフル) およびザナミビル (リレンザ) に対する薬剤耐性の出現の報告を考慮すると、特に重要である。

H A の H A 1 と H A 2 鎖は免疫原性であり、ヒトの自然感染の後に両鎖と反応する抗体が示された。H A 1 に特異的な抗体は主に中和であるが、インビトロの H A 1 特異的 M a b によるウイルス中和の異なる機構は、抗体の濃度に応じて、H A 1 上のレセプター部位のブロック、ウイルス - 細胞融合の細胞内障害、又は同時付着障害及びウイルス - 細胞融合障害を含み、記載されている。あまり研究されていないが、抗 H A 2 抗体による細胞融合の障害が報告されている。

#### 【 0 0 1 4 】

2 0 年以上前、H 3 サブタイプの H A 分子は、抗原性ドリフト変異および回避変異の H A を配列決定することによって特徴付けされ、抗原エピトープは分子の三次元構造にマップされた。それ以来、トリ病原性ウイルスの H 1、H 2 および H 5 上の抗原性部位は H 3 の三次元構造にマップされた。1 9 9 7 年の香港におけるヒトの H 5 N 1 感染の発生と、1 9 9 9 年のヒトの症例からの H 9 N 2 ウイルスの単離の後、両方のタンパク質の X 線構造が解析された。しかしながら、構造解析に用いられた 1 9 9 7 年のブタ単離物 (A / D u c k / S i n g a p o r e / 3 / 9 7) の抗原ドリフトと、最近単離された病原性が高い菌株は意義深いものである。実際、ブタ単離物 (A / D u c k / S i n g a p o r e / 3 / 9 7) と H P A I H 5 N 1 株 (A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4) との間には、2 8 のマイナーな変化と 2 つのメジャーになりうる変化がある。

2 0 0 4 ~ 2 0 0 5 年の発生からの H 5 H A 遺伝子の系統学的分析により、クレイド 1 及び 2 と称される、H A 遺伝子の 2 つの異なる系統が示された。H P A I H 5 N 1 株 (A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4) はクレイド 1 のメンバーである。これらクレイドのそれぞれのウイルスは地理的にオーバーラップしていないアジア地域に分布している。インドシナからの H 5 N 1 ウイルスはクレイド 1 内に密接に集まっているのに対して、いくつかの周辺国から単離される H 5 N 1 はクレイド 1 単離物とは異なり、分岐したクレイド 2 に属する。クレイド 1 ウイルスは、ベトナム、タイおよびカンボジアのヒトとトリ、そしてラオスおよびマレーシアのトリだけから単離された。クレイド 2 ウイルスは、中国、インドネシア、日本および韓国のトリのみから単離されるウイルスに見られた。ウイルス導入、風土性および進化に関連する疑問を解決するために、最新の疫学研究は、インドネシアおよびベトナム中の家禽、並びに 1 1 人の南ベトナムのヒト試料から単離された 8 2 の H 5 N 1 型ウイルスを、公共のデータベースで利用可能な配列データと共に分析した<sup>3 6</sup>。系統学的分析により、インドネシアのウイルスすべてが H 5 N 1 遺伝子型 Z ウイルスの異なるサブ系統を示したことから、この発生は過去 2 年の間に国中への蔓延により単独導入から生じたであろうことが示唆される。インドネシアの継続したウイルス活動は、トリの移動による繰り返された導入というよりも、国内での家禽の移動により伝搬されたものであった。インドネシアおよびベトナム内では、H 5 N 1 ウイルスは、各々の国の中で時間とともに地理的に異なるグループに進化した。

#### 【 0 0 1 5 】

近年、A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 4 からの H A の構造が解析された。クレイド 1 及び 2 ウイルスの H P A I 2 0 0 4 年および 2 0 0 5 年の単離物からの H A 遺伝子とそのアミノ酸配列を比較したところ、主にレセプター結合ドメイン周辺に集中しており、残りは退化したエステラーゼドメイン内にある抗原性変異の 1 3 の位置が同定された。抗原性変異の領域は H 1 および H 3 セロタイプにおいて同定された (図 1 A)。H 1 ではこれらの部位は S a、S b、C a および C b と称され、H 3 では A、B、C および D と称される。H

5 H A の回避変異は 3 つのエピトープに集中している。部位 1 : H 3 の抗原性部位 A と H<sup>2</sup> の C a 2 にオーバーラップする露出したループ(H A 1 1 4 0 - 1 4 5) ; 部位 2 : H 3 セロタイプの抗原性部位 B に相当する H A 1 残基 1 5 6 および 1 5 7 ; そして、 3 ) H 1 H A と H 9 セロタイプの S a 部位に制限される H A 1 1 2 9 - 1 3 3。 S m i t h による近年の研究では、アミノ酸レベルでポジティブな選別が検出されると、H A タンパク質の 8 つの残基がポジティブ選択下であったことが示された(図 1 B)。これらの残基には、抗原性部位 A および E の 5 つ(位置 8 3、8 6、1 3 8、1 4 0 および 1 4 1)が含まれ、2 つはレセプター結合に関与し(位置 1 2 9 および 1 7 5)、位置 1 5 6 はレセプター結合部位に近い潜在的な N 結合グリコシル化のための部位である。さらに、結果から、H A 内の 3 つの残基(V a l 8 6、S e r 1 2 9 および T h r 1 5 6)が、ニワトリ又はカモ単離物よりもヒトの単離物において観察されることが多く、ヒトに対する H 5 N 1 遺伝子型 Z の初期適応を表すようであることが明らかとなった。これらの研究のさらに重要な発見は、インドネシアとベトナムとのサブ系統間の系統学的相違はこれら 2 つの群のウイルス間での抗原交差反応の統計学的相違も反映していたことである。具体的には、インドネシアのウイルスは A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4 に対するフェレット抗血清に応答せず、ベトナムの代表的なウイルスはインドネシアウイルス I D N / 5 / 0 6 および D k / I D N / M S / 0 4 に対するフェレット抗血清に応答しなかった。これらの所見は、系統学的にだけでなく抗原的に異なっているヒトの 1 9 9 7 年と 2 0 0 3 年の H 5 N 1 ウイルスと免疫ヒト血清による以前の研究と一致している。ゆえに、自然変異並びに回避変異は、ウイルスの継続した進化が菌株(一又は複数)が受動的および能動的な免疫化に用いられるべきかの決定に影響を与えうることを示唆している。

本発明は、ヒト抗インフルエンザモノクローナル抗体の同定、製造及び特徴付けのための方法を提供する。

#### 【 0 0 1 6 】

s c F v 及びモノクローナル抗体の同定と特徴付け

高親和性、交差サブタイプの広く中和するヒト抗 H A m A b が同定された。これら n A b は、立体構造変化の重要な成分(融合ペプチドとヘリックス α A の露出した表面)が非常に同格にあるポイントのステム領域内の新規の高く保存された中和エピトープを認識することによって接着後の融合プロセスを阻害する。16 すべての H A サブタイプの構造及び配列分析により、H A の 2 つの系統学的グループ分け(グループ 1 および 2)に一致する、2 つのみのエピトープの変異の存在を示す。これらの結果は、各群のサブセットから得られる n A b のわずかな反応混液が季節性で全国的に流行しているインフルエンザの幅広い予防を可能にしようという可能性を示す。

最近の報告は、H 5 N 1 感染患者の免疫細胞を利用して抗 H A n A b を単離していた。しかしながら、それらのエピトープや作用様式は報告されなかった。珍しいことに、我々は、同じ V H 生殖系統遺伝子 I G H V 1 - 6 9 \* 0 1 を利用し、Y 1 0 2 と同等の位置にチロシンを含む C D R 3 ループをコードする n A b を非免疫ライブラリから繰り返し単離した。これは、おそらく以前に H 1 に、そして 1 9 6 8 年以前に生まれたライブラリドナーでは H 2 サブタイプに曝露したために、広い抗 H A 交差免疫が H 5 ナイーブ集団に既に存在していることを示唆する。この生殖系統 V H セグメントの反復使用、N 挿入および / または生殖系統 D 遺伝子アセンブリにより導入される C D R 3 チロシンの共通性、および両研究において発見された n A b による V L 遺伝子のランダムな使用は、このエピトープを認識することができる再編成された V H セグメントの前駆体頻度が重要であることを示唆する。これは、本明細書において同定された F 1 0 エピトープへの適切な曝露により、これら広域スペクトルの n A b はインビボで容易に誘導されうる可能性を示す。両群のウイルスサブタイプに対して万能的に保護するために必要とされる n A b の遺伝学的及び構造的な複雑さは以前として未知であるが、我々のデータは驚くほど単純な解決策を示すであろう。

#### 【 0 0 1 7 】

3 つの異なる抗 H A - 1 s c F v が、58 の H A - 1 ポジティブクローンの配列決定分

析によって同定された。これらの s c F v を 3 8 B および 1 C とした。2 A の V H および V L アミノ酸配列を図 4 に示す。

1 0 の異なる抗 H A 0 s c F v が、9 7 の H A 0 ポジティブクローンの配列決定分析によって同定された。これらの s c F v を 7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 及び 9 8 とした。6 の異なる V H と 1 0 の異なる V L 遺伝子が明らかとなった。いくつかの s c F v は同じ V H 遺伝子を共有していた。6 の異なる V H 遺伝子のうちの 5 つは、I G H V 1 - 6 9 遺伝子ファミリーに属した。1 0 の V L 遺伝子のうちの 3 つは κ 鎖であった。

2 A s c F v は中程度の中和抗体であり、3 8 B 及び 1 C は非中和抗体である。1 0 の s c F v、7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 および 9 8 は強力な中和抗体である(図 6)。

【 0 0 1 8 】

中和インフルエンザ抗体の核酸およびアミノ酸配列を以下に示す。

表 1A. 抗体 2A 可変領域核酸配列

2A の V<sub>H</sub> 鎖 (配列番号:1)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGTGACAATGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCAGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGGGGCATCATTCCCTA  
TCTTTGGAAAACCAAACCTACGCACAGAAAGTCCAGGGCAGAGTCACGATTACTGCGGACGAATCCACGAGCACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTTTATTACTGTGCGAGAGATTTCAGACGCGTATTACTATGGTTC  
GGGGGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGCACCCTGGTCAACCGTCTCCTCA

2A の V<sub>L</sub> 鎖 (配列番号:3)

CTGCCTGTGCTGACTCAATCATCCTCTGCCTCTGCTTCCCTGGGATCCTCGGTCAAGCTCACCTGCACTCTGAGCAGTGG  
GCATAGTAACATCATCAGCATGGCATCAACAGCAGCCAGGGAAGGCCCTCGGTACTTGATGAAGGTTAATAGTGATG  
GCAGCCACACCAAGGGGGACGGGATCCCTGATCGCTTCTCAGGCTCCAGCTCTGGGGCTGACCGCTACCTCACCATCTCC  
AACCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTAGTTATTTCTGTGAGACCTGGGACACTAAGATTTCATGTCTTCGGAAGTGGGACCAA  
GGTCTCCGTCTCTCAG

表 1B. 抗体 2A 可変領域アミノ酸配列

2A の V<sub>H</sub> 鎖 (配列番号: 2)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSDNAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPFGKPNYAQKFQGRVTITADESTSTAY  
MDLRSLRSEDYAVYYCARDSDAYYYGSGGMDVWGQGLTVTVSS

2A の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:4)

LPVLTQSSSASASLGSSVKLTCTLSSGHSNYIIAWHQQPGKAPRYLMKVNSDGSHTKGDGIPDRFSGSSSGADRYLTIS  
NLQSEDEASYFCETWDTKIHFVGTGTVSVL

表 1C. 抗体 D7 可変領域核酸配列

D7 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:5)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTCCTGGAGG  
TATCTTCAACACCAATGCTTTCAGCTGGGTCCGACAGGCCCCCTGGACAAGGTCTTGAGTGGGTGGGAGGGGTCATCCCTT  
TGTTTTCGAACAGCAAGCTACGCACAGAACGTCCAGGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCTAC  
ATGGAGCTTACCAGCCTGAGATCTGCGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAAGTAGTGTTTACCATTTTAGGAGTCA  
CTTTGACTCCTGGGGCCTGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

D7 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:9)

AATTTTATGCTGACTCAGCCCCACTCTGTGTGCGGCTCTCCGGGGAAGACGGTGACCATCTCCTGCACCGGCAGCAGTG  
CAACATTGCCGCCAATATGTGCACTGGTACCAACAACGTCCGGGCAGTGCCCCCACTACTGTGATCTATGAGGATGACC  
GAAGACCTCTGGGGTCCCTGATCGGTTCTCTGGCTCCATCGACAGGTCTCCAACTCTGCCTCCCTCACCATCTCAGGA  
CTGAAGACTGAGGACGAGGCTGACTACTACTGTGCACTTATGATACCAACAATCATGCTGTGTTTCGGAGGAGGCACCCA  
CCTGACCGTCCTC

10

表 1D. 抗体 H98 可変領域核酸配列

H98 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:7)

CAGGTGCAGCTGGTGCATCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTCCTGGAGG  
TATCTTCAACACCAATGCTTTCAGCTGGGTCCGACAGGCCCCCTGGACAAGGTCTTGAGTGGGTGGGAGGGGTCATCCCTT  
TGTTTTCGAACAGCAAGCTACGCACAGAACGTCCAGGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCTAC  
ATGGAGCTTACCAGCCTGAGATCTGCGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAAGTAGTGTTTACCATTTTAGGAGTCA  
CTTTGACTCCTGGGGCCTGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

20

H98 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:11)

TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCTCAGCGTCTGGGAAACACGGGCAGAGGGTCACCATCTCTTGTCTGGAGGCACCTC  
CAACATCGGACGTAATCATGTAACTGGTACCAGCAACTCCCAGGAACGGCCCCAACTCCTCATCTATAGTAATGAAC  
AGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAATCTGGCACCTCCGCCTCCCTGGCCGTGAGTGGGCTCCAG  
TCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGTGCATCATGGGATGACAACCTGAGTGTTGGGTGTTTCGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

表 1E. 抗体 D7 及び H98 可変領域鎖アミノ酸配列

D7 及び H98 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:6)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKAPGGIFNTNAPSWVRQAPGQGLEWVGGVIPLFRTASYAQNQGRVTITADESTNTAY  
MELTSLSRSDTAVYYCARSSGYHFRSHFDSWGLGLTVTVSS

30

D7 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:8)

NFMLTQPHSVSASPGKTVTISCTGSSGNIAANYVQWYQQRPGSAPTTVIYEDDRPSGVPDRFSGSIDRSSNSASLTISG  
LKTEDEADYYCQTYDTNNHAVFGGGTHLTVL

H98 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:10)

SYELTQPPSASGKHGQRTISCSGGTSNIGRNHVNWYQQLPGTAPKLLIYSNEQRPSPGVPDRFSGSKSGTSASLAVSGLQ  
SEDEADYYCASWDDNLSGWVFGGGTKLTVL

40

表 1F. 抗体 D8 可変領域核酸配列

D8 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:13)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGCGCTTATGCTTTACCTGGGTGCGGCAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGCATCACCGGAA  
TGTTTGGCACAGCAAACACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAACTCACGAGCACAGCCTAC  
ATGGAGTTGAGCTCCCTGACATCTGAAGACACGGCCCTTTATTATTGTGCGAGAGGATTGTATTACTATGAGAGTAGTCT  
TGACTATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAG

D8 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:17)

CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCCGCGTCCGGGTCTCCTGGACAGTCAGTCACCATCTCCTGCACTGGAACCAGCAG  
TGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTACCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCAAACTCATGATTTATGAGGTCA  
CTAAGCGGCCCTCAGGGTCCCCTGATCGCTTCTCTGCCTCCAAGTCTGGCAACACGGCTCCCTGACCGTCTCTGGGCTC  
CAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTTCTGTGCTCATATGCAGGCCACAGTGCTTATGTCTTCGGAACCTGGGACCAAGGT  
CACCGTCCTG

10

表 1G. 抗体 D80 可変領域核酸配列

D80 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:15)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAGGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGCGCTTATGCTTTACCTGGGTGCGGCAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGCATCACCGGAA  
TGTTTGGCACAGCAAACACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAACTCACGAGCACAGCCTAC  
ATGGAGTTGAGCTCCCTGACATCTGAAGACACGGCCCTTTATTATTGTGCGAGAGGATTGTATTACTATGAGAGTAGTCT  
TGACTATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAG

20

D80 の V<sub>K</sub> 鎖(配列番号:19)

GAAATTGTGCTGACTCAGTCTCCAGGCACCCTGTCTTTGTCTCCAGGGGAAAGAGCCACCCTCTCCTGCAGGGCCAGTCA  
GAGTCTTAGCAGCAAGTACTTAGCCTGGTATCAGCAGAAACCTGGCCAGGCTCCAGGCTCCTCATCTATGGTGCATCCA  
GCAGGGCCACTGGCATCCAGACAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACCCTCACCATCAGTAGACTGGAG  
CCTGAAGATTTGCAGTGTATTCTGTGTCAGCAGTATGATGGCGTACCTCGGACGTTTCGGCAAGGGACCACGGTGGAAAT  
CAAA

表 1H. 抗体 D8 及び D80 可変領域鎖アミノ酸配列

D8 及び D80 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:12)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSAYFTWVRQAPGQGLEWMGGITGMFGTANYAQKFQGRVTITADELTSTAY  
MELSSLTSEDALYYCARGLYYYESSLDYWGQGTLLTVSS

D8 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:14)

QSVLTQPPSASGSPGQSVTISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKAPKLMIEVTKRPSGVPDRFSASKSGNTASLTVSGL  
QAEDEADYFCCSYAGHSAYVFGTGTKVTVL

D80 の V<sub>K</sub> 鎖(配列番号:16)

EIVLTQSPGTLISLSPGERATLSCRASQSLSSKYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLE  
PEDFAVYSCQQYDGVPRFTFGQGTVEIK

30

40

表 1I. 抗体 F10 可変領域核酸配列

F10 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:21)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCACGTCCTCTGAAGT  
CACCTTCAGTAGTTTTGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGCTGGGAGGGATCAGCCCTA  
TGTTTGGAAACACCTAATTACGCGCAGAAGTTCCAAGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACCAGTCCACGAGGACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTGTATTATTGTGCGAGATCTCCTTCTTACATTTGTTCTGGTGG  
AACCTGCGTCTTTGACCATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

F10 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:25)

CAGCCTGGGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCCAAGGGCTTGAGACAGACCGCCACACTCACCTGCACTGGGAACAGCAA  
CAATGTTGGCAACCAAGGAGCAGCTTGGCTGCAGCAGCACCAGGGCCACCCTCCCAAACCTCTATCCTACAGGAATAATG  
ACCGGCCCTCAGGGATCTCAGAGAGATTCTCTGCATCCAGGTGAGGAAACACAGCCTCCCTGACCATTACTGGACTCCAG  
CCTGAGGACGAGGCTGACTATTACTGCTCAACATGGGACAGCAGCCTCAGTGCTGTGGTATTCTGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

10

表 1J. 抗体 E90 可変領域核酸配列

E90 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:23)

CAGGTACAGCTGCAGCAGTCAGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCACGTCCTCTGAAGT  
CACCTTCAGTAGTTTTGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGCTGGGAGGGATCAGCCCTA  
TGTTTGGAAACACCTAATTACGCGCAGAAGTTCCAAGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACCAGTCCACGAGGACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTGTATTATTGTGCGAGATCTCCTTCTTACATTTGTTCTGGTGG  
AACCTGCGTCTTTGACCATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

E90 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:27)

GACATCCAGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAGGAGACAGAGTCACCATCACTTGCCGGGCAAGTCA  
GAGCATTAGCAGCTATTTAAATTGGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGCCCCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATCCAGTT  
TGCAAAGAGGGGTCCCATCAAGGTTCAAGTGGCAGTGGATCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATTAGCAGCCTGCAGCCT  
GAAGATTTTGCAGTGTATTACTGTCAGCAGTATGATAGTTTACCGTACACTTTTGGCCAGGGGACCAAGGTAGAGATCAA  
A

20

表 1K. 抗体 F10 及び E90 可変領域アミノ酸配列

F10 及び E90 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:18)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVCSSTSEVTFSSFAISWVRQAPGQGLEWLGGISPMFGTPNYAQKFQGRVTITADQSTRTAY  
MDLRSLRSEDYAVYYCARSPSYICSGGTCVFDHWGQGTLVTVSS

F10 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:20)

QPGLTQPPSVSKGLRQTATLTCTGNSNNVGNQGAAWLQQHQGHPPKLLSYRNDRPSGISERFSASRSGNTASLTITGLQ  
PEDEADYYCSTWDSSLSAVVFGGKLTIVL

E90 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:22)

DIQMTQSPSSLSASVGDRVITITCRASQSISSYLNWYQQKPGKAPKLLIYAASSLQRGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQP  
EDFAVYYCQQYDSSPYTFGQGTKVEIK

30

40

表 1L. 抗体 G17 可変領域核酸配列

G17 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:29)

CAGGTGCAGCTGGTGCAATCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAAGGTCTCCTGCAAGACTTCTGGAGT  
CACCTTCAGCAGCTATGCTATCAGTTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGGATCATCGGTG  
TCTTTGGTGTACCAAAGTACGCGCAGAACTTCCAGGGCAGAGTCACAATTACCGCGGACAAACCGACGAGTACAGTCTAC  
ATGGAGCTGAACAGCCTGAGAGCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAGAGCCCGGGTACTACGTAGGAAAGAA  
TGGTTTTGATGTCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA

G17 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:31)

TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCCAAGGGCTTGAGACAGACCGCCATACTCACCTGCACTGGAGACAGCAA  
CAATGTTGGCCACCAAGGTACAGCTTGGCTGCAACAACACCAGGGCCACCCTCCCAAACCTCTATCCTACAGGAATGGCA  
ACCGGCCCTCAGGGATCTCAGAGAGATTCTCTGCATCCAGGTGAGGAAATACAGCCTCCCTGACCATTATTGGACTCCAG  
CCTGAGGACGAGGCTGACTACTACTGCTCAGTATGGGACAGCAGCCTCAGTGCCTGGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

10

表 1M. 抗体 G17 可変領域アミノ酸配列

G17 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:24)

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKTSGVTFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGGIIGVFGVPKYAQNFGQGRVTITADKPTSTVY  
MELNSLRAEDTAVYYCAREPGYYVGKNGFDVWGQGTMTVTVSS

G17 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:26)

SYELTQPPSVSKGLRQTALITCTGDSNNVGHQGTAWLQQHQGHPPKLLSYRNGNRPSGISERFSASRSGNTASLTIIIGLQ  
PEDEADYYCSVWDSLSAWVFGGGTKLTVL

20

表 1N. 抗体 H40 可変領域核酸配列

H40 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:33)

CAGGTGCAGCTGGTGAGTCTGGGGCTGAGGTGAGGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAAGGTCTCATGTAAGGCTTCTGGATA  
CACCTTCACCGTTATTATATTCACTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGACTTGAGTGGATGGGTGGATCAACCCTA  
TGACTGGTGGCACAACCTATGCACAGAAGTTTCAGGTCTGGGTACCATGACCGGGGACACGTCCATCAACACAGCCTAC  
ATGGAGGTGAGCAGGCTGACATCTGACGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGGGGGGCTTCCGTATTACGATATTTTGA  
CTGGCAGCCCGAGGCTCTTGATATCTGGGGCCTCGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA

H40 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:35)

CAGCCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCTAGTGGCCCCAGGACAGACGGCCAGCATTCCCTGTGGGGGGAACAACAT  
TGGAGGCTACAGTGTACTGTTACCAACAAAAGCCGGGCCAGGCCCCCTCTTGGTCATTTATGACGATAAAGACCGGC  
CCTCAGGGATCCCTGAGCGATTCTCTGGCGCAACTCTGGGAGCACGGCCACCCTGACAATCAGCAGGGTCGAAGCCGGG  
GATGAGGGCGACTACTACTGTCTAGGTGTGGGATAGTGGTAATGATCGTCCGCTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGT  
CCTA

30

表 1O. 抗体 H40 可変領域アミノ酸配列

H40 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:28)

QVQLVQSGAEVRKPGASVKVSKASGYTFTGYIHWVRQAPGQGLEWMGWINPMTGGTNYAQKFQVWVTMTRDTSINTAY  
MEVSRLTSDDTAVYYCARGASVLRVFDWQPEALDIWGLGTTVTVSS

H40V<sub>L</sub> 鎖 (配列番号:30)

QPVLTQPPSVSVAPGQTASIPCGNNIGGYSVHWYQQKPGQAPLLVIYDDKDRPSGIPERFSGANSSTATLTISRVEAG  
DEGDYYCQVWDSGNDRPLFGGGTKLTVL

40

表 1P. 抗体 A66 可変領域核酸配列

A66 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:37)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGCTCCTCGGTGAAGGTTTCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
 CCCCTTCAGCATGACTGCTTTACCTGGCTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGTGGGATCAGCCCTA  
 TCTTTTCGTACACCGAAGTACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCAAC  
 ATGGAGCTGACCAGCCTGAAATCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAACCCTTTCTCCTACCAACCGAATAA  
 TGATGCTTTTGCTATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA

A66 の V<sub>K</sub> 鎖 (配列番号:39)

GAAATTGTGTTGACGCAGTCTCCAGCCACCCTGTCTTTGTCTCCAGGGGAAAGAGCCACCCTCTCCTGCAGGGCCAGTCA  
 GAGTGTTAGCAGCTACTTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGCCAGGCTCCCAGGCTCCTCATCTATGATGCATCCAACA  
 GGGCCACTGGCATCCCAGCCAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATCAGCAGACTGGAGCCT  
 GAAGATTTTGCAGTCTATTTCTGTGTCAGCAGTATGGTAGCTCACCTCAATTCGGCCAAGGGACACGACTGGAGATTAAA

10

表 1Q. 抗体 A66 可変領域アミノ酸配列

A66 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:32)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGPFSTFTWLRQAPGQGLEWMGGISPIFRTPKYAQKFQGRVTITADESTNTAN  
 MELTSLKSEDTAVYYCARTLSSYPNNDAFAIWGQGTMVTVSS

A66 の V<sub>K</sub> 鎖(配列番号:34)

EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISRLEP  
 EDFAVYFCQQYGGSPQFGQGTGLEIK

20

表 1R. 抗体 E88 可変領域核酸配列

E88 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:40)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGCTCCTCGGTGAAGGTTTCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
 CCCCTTCAGCATGACTGCTTTACCTGGCTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGTGGGATCAGCCCTA  
 TCTTTTCGTACACCGAAGTACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCAAC  
 ATGGAGCTGACCAGCCTGAAATCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAACCCTTTCTCCTACCAACCGAATAA  
 TGATGCTTTTGCTATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA

E88 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:42)

CTGCCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCACCATCTCTTGTCTGGAAGCAGCTC  
 CAACATCGGAAGTAATACTGTAACTGGTACCAGCAGCTCCCAGGAACGGCCCCCAAACCTCCTCATCTATAGTAATAATC  
 AGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAGGTCAGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCATCATTGGACTCCGG  
 CCTGAGGATGAAGCTGATTATTACTGTGATCGTATGACAGCAGGCTCAGTGCTTCTCTCTTCGGAACCTGGGACCACGGT  
 CACCGTCCTC

30

表 1S. 抗体 E88 可変領域アミノ酸配列

E88 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:36)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGPFSTFTWLRQAPGQGLEWMGGISPIFRTPKYAQKFQGRVTITADESTNTAN  
 MELTSLKSEDTAVYYCARTLSSYPNNDAFAIWGQGTMVTVSS

E88 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:38)

LPVLTQPPSASGTPGQRTVITSCGSSSNIGSNTVNWYQQLPGTAPKLLIYSNNQRPSGVPDRFSGSRSGTSASLAIIGLR  
 PEDEADYYCQSYDSRLSASLFGTGTITVTVL

40

【 0 0 1 9 】

中和インフルエンザ抗体の重鎖および軽鎖の相補性決定領域のアミノ酸配列を以下の表

50

2 および図 4 に示す。

表 2

| 抗体        | CDR1                      | CDR2                          | CDR3                         |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| コンセンサス    | SYAFS (配列番号: 43)          | GIIPMFGTPTYAQQKFQG (配列番号: 51) | SSGYYYG GGFVDV (配列番号: 59)    |
| D7/H98VH  | TNAFS (配列番号: 44)          | GVIPLFRTASYAQNQQG (配列番号: 52)  | SSGYHFGSRSHFDS (配列番号: 60)    |
| D8/D80VH  | AYAFT (配列番号: 45)          | GIIGMFGTANYAQQKFQG (配列番号: 53) | GLYYYYESSLDY (配列番号: 61)      |
| F10/90VH  | SFAIS (配列番号: 46)          | GISPMFGTPTYAQQKFQG (配列番号: 54) | SPSYICSGGTCVFDH (配列番号: 62)   |
| G17VH     | SYAIS (配列番号: 47)          | GIIGVFGVPKYAQQKFQG (配列番号: 55) | EPGYVVGKNGFDV (配列番号: 63)     |
| H40VH     | GYIYH (配列番号: 48)          | WINPMTGGTNYAQQKFQV (配列番号: 56) | GASVLRVFDWQPEALDI (配列番号: 64) |
| A66VH     | MTAFT (配列番号: 49)          | GISPIFRTPKYAQQKFQG (配列番号: 57) | TLSSYQPNNDFAFI (配列番号: 65)    |
| 2AVH      | DNAIS (配列番号: 50)          | GIIPFGKPNYAQQKFQG (配列番号: 58)  | DSDAYYYGSGGMDV (配列番号: 66)    |
| CONSENSUS | TGSSSNIGNYVA (配列番号: 67)   | SNSDRPS (配列番号: 79)            | QSYDSL SAYV (配列番号: 91)       |
| D7VL      | TGSSSNIAANYVQ (配列番号: 68)  | EDDRPS (配列番号: 80)             | QSYDTNNHAV (配列番号: 92)        |
| DD8VL     | TGTSSDVGGYNSVS (配列番号: 69) | EVTKRPS (配列番号: 81)            | CSYAGHSAYV (配列番号: 93)        |
| F10VL     | TGNSNNVGNQGAA (配列番号: 70)  | RNDRPS (配列番号: 82)             | STWDSSLSAVV (配列番号: 94)       |
| G17VH     | TGDSNNVGHQGT (配列番号: 71)   | RNGNRPS (配列番号: 83)            | SVWDSSLSAWV (配列番号: 95)       |
| H40VH     | GGNNIGGYSVH (配列番号: 72)    | DDKDRPS (配列番号: 84)            | QVWDSGNDRPL (配列番号: 96)       |
| A66VH     | RASQSVSSYLA (配列番号: 73)    | DASNRAT (配列番号: 85)            | QQYGSSPQV (配列番号: 97)         |
| D80VL     | RASQSLSSKYLA (配列番号: 74)   | GASSRAT (配列番号: 86)            | QQYDGVPR (配列番号: 98)          |
| E88VL     | TGSSSNIGNYVA (配列番号: 75)   | SNNQRPS (配列番号: 87)            | QSYDSRLSASL (配列番号: 99)       |
| E90VK     | SGSSSNIGSNTVN (配列番号: 76)  | AASSLQR (配列番号: 88)            | QQYDSSPYT (配列番号: 100)        |
| H98VL     | RASQSISSYLN (配列番号: 77)    | SNEQRPS (配列番号: 89)            | ASWDDNLSGWV (配列番号: 101)      |
| 2AVL      | TLSSGHSNYIA (配列番号: 78)    | VNSDGSHTKGD (配列番号: 90)        | ETWDTKIHV (配列番号: 102)        |

当業者は、異なる結合親和性を有する更なる s c F v やモノクローナル抗体が治療的に有効となりうることを理解するであろう。例えば、およそ 1 p M からおよそ 2 0 0 m M の結合親和性を有する抗体および s c F v もまた治療的に有効となりうる。

【 0 0 2 0 】

抗インフルエンザ抗体による H 5 N 1 の中和。

H - 5 偽型ウイルスは、二価の s c F v と完全長抗体と共にインキュベートし、抗体 - ウイルス混合物を 2 9 3 T 細胞と接触させた。感染力は、標的細胞におけるルシフェラーゼ活性を測定することによって定量化した。D 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0 および H 9 8 抗体は、H 5 に対して強力な中和活性を有する。また、D 8、F 1 0 および A 6 6 抗体は、H 1 N 1 を交差中和し、株 H 1 - S C / 1 9 1 8 を強力に中和し、株 H 1 - P R - 3 4 を中程度に中和した(図 6)。

【 0 0 2 1 】

8、10、66のエピトープの特徴づけ。

インフルエンザヘマグルチニン(HA)タンパク質に対する8、10及び66の結合の一次エピトープマッピングにより、これら3つの抗体のエピトープが類似しており、HA1の位置307に、そして、HA2の位置52、59、65および93に位置することが示された。このエピトープは、ウイルスによって脱落されないヘマグルチニンタンパク質を含む。ウイルスによって脱落されるノイラミニダーゼタンパク質を結合するほとんどの他の公知の抗インフルエンザ抗体とは異なっている。

#### 【0022】

nAbエピトープの構造的特徴づけ

3.2 解像度のHA(H5-VN04)と複合体化したscFv断片の結晶構造を解析することと突然変異誘発による、nAbの一つであるF10のエピトープと結合様式。(図6および表4)。

複合体において、各々のH5三量体は、1抗体当たりおよそ1500<sup>2</sup>のタンパク質表面を埋没している、対称性-関連部位で、F10の3つの分子を結合する。H5自体の構造はF10結合によってほとんど変化されない。HAは単鎖のHA0として合成され、2つのサブユニット、HA1およびHA2にタンパク質分解性切断される。切断により、膜近位ステムに「融合ペプチド」(HA2の初めのおよそ21残基を含む)が埋没される。F10結合はもっぱらこの領域でのみ起こり(図6)、融合ペプチド、中性pH配座の場所に該ペプチドを固定するHA1とHA2のエレメント(いずれもこの領域の構造に不可欠なもの)、並びに酸性pHで大きな構造変化を受ける大きなHA2のらせん状ヘアピンと密接に接触し、このウイルス膜近位のポケットからウイルスの遠位の表面へ該融合ペプチドを押し出す。これがエンドソーム膜との融合を引き起こす。

#### 【0023】

F10の重鎖はH5結合に主に役割があり、その3つの相補性決定領域(CDR)の先端を利用する。各F10分子は、HA三量体の単一の単量体内のHA1及びHA2サブユニットの両方と接触する(図6)。接触領域は、HA2融合ペプチドの一部によって形成されるポケットと、一端にHA1のエレメントと他端にHA2のヘリックスαAの露出面とを含む(図4および6)。主要な接触点の3組の抗体残基 - CDR H2のF55及びM54とCDR H3のY102。F55のフェニル環は、融合ペプチドループの突出したループ(HA2残基DGW19<sub>2</sub> - 21<sub>2</sub>(H3番号付け様式; 下つき文字の1および2はHA1およびHA2鎖を指す))と、ポケットの背面を形成する2つの隣接ヒスチジン(残基18<sub>1</sub>および38<sub>1</sub>)およびトリプトファンの芳香族側鎖、W21<sub>2</sub>によって形成される平坦な表面全体に位置する。また、M54の側鎖は、W21<sub>2</sub>およびH38<sub>1</sub>の芳香族環、並びにヘリックスαAのI45<sub>2</sub>の側鎖と接するが、主鎖のカルボニル酸素はH38<sub>1</sub>の側鎖と水素結合する。Y102は、その側鎖を、αAヘリックスの4つの側鎖と、融合ペプチドの主鎖カルボニル(D192)に対する水素結合によってつくられる疎水性間隙(crevise)に嵌入する。CDR H1ループは、ヘッド領域の基部のHA1のループとヘリックスαAのC末端と複数回接触する(図12d、e)。

同時に、エピトープを定めるためにヘリックスαA上で突然変異誘発実験を行った(図6)。抗体と直接接触する3つの残基の突然変異: V52A/E、N53AおよびI56Aは抗体の結合を有意に低減又は取り除いたのに対して、保存的突然変異であるV52Lは効果がなかった。コントロールとして、抗体と接触しないヘリックスの異なる露出面上の突然変異は抗体結合に対して効果がなかった(図12b-c)。ゆえに、αAヘリックスの突然変異誘発は、F10について結晶学的に定められるエピトープと十分に一致している。さらに、他の2つのnAb(構造的データはない)がほぼ同じ変異-nAb結合性質を示したことから、密接にオーバーラップするエピトープが示唆され、競合的結合と一致していた(図6、図9)。まとめると、我々は、3つすべてのnAbが、ある領域内のHAの中性pH構造を安定化することによってウイルスを中和し、この領域が膜融合状態を引き起こす構造変化の引き金(ポケットからの融合ペプチドの起こりうる放出)となると結論づけた。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 2 4 】

## 抗体

本明細書中で用いる「抗体」なる用語は、免疫グロブリン分子および免疫グロブリン(Ig)分子の免疫学的に活性な部位、すなわち抗原を特異的に結合する(と免疫応答する)抗原結合部位を含む分子を指す。「特異的に結合する」又は「免疫応答する」とは、抗体が所望の抗原の一又は複数の抗原決定基と反応して、他のポリペプチドとは反応しないことを意味する。抗体には、ポリクローナル、モノクローナル、キメラ、dAb(ドメイン抗体)、単鎖、 $F_{ab}$ 、 $F_{ab'}$ 、及び $F_{(ab')_2}$ 断片、scFvおよびFab発現ライブラリが含まれるがこれらに限定されない。

単鎖Fv(「scFv」)ポリペプチド分子は、共有結合したVH::VLヘテロ二量体であり、ペプチドコードリンカーによって連結したVH-及びVL-コード遺伝子を含む遺伝子融合から発現されうる。(Huston et al. (1988) Proc Nat Acad Sci USA 85(16): 5879-5883を参照)。自然に凝集するが化学的に分離される、抗体V領域の軽鎖及び重鎖のポリペプチドをscFv分子に転換するための化学構造を識別するための多くの方法が記載されている。このscFv分子は抗原結合部位の構造と実質的に類似する三次元構造にホールドする。例として米国特許第5091513号；同第5132405号；及び同第4946778号を参照。

## 【 0 0 2 5 】

大量の標的分子に対して再編成された抗体遺伝子の大きな供与源を提供するために、非常に大きなナイーブヒトscFvライブラリがあり、作製されうる。疾患特異的な抗体を単離するために、感染症を有する個体から小さいライブラリが造られうる。(Barbas et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:9339-43 (1992); Zebedee et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:3175-79 (1992)を参照)。

通常、ヒトから得られた抗体分子は、クラスIgG、IgM、IgA、IgEおよびIgDの何れかに関連しており、分子に存在する重鎖の性質によって互いに異なる。あるクラスは、同様にIgG<sub>1</sub>、IgG<sub>2</sub>及びその他のようなサブクラスを有する。さらに、ヒトでは、軽鎖はκ鎖又はλ鎖であってよい。

## 【 0 0 2 6 】

「抗原結合部位」又は「結合部分」なる用語は、抗原結合に参加する免疫グロブリン分子の一部を指す。抗原結合部位は、重鎖(「H」)及び軽鎖(「L」)のN末端可変(「V」)領域のアミノ酸残基によって形成される。重鎖および軽鎖のV領域内の3つの非常に異なる範囲(stretch)は、「高頻度可変領域」と称され、「フレームワーク領域」又は「FR」として知られる保存された隣接範囲の間に配置する。ゆえに、「FR」なる用語は、免疫グロブリン内の高頻度可変領域間に天然に見られ、その領域に隣接しているアミノ酸配列を指す。抗体分子において、軽鎖の3つの高頻度可変領域と重鎖の3つの高頻度可変領域は、三次元空間内で互いに関連して整理され、抗原結合界面を形成する。抗原結合界面は、結合した抗原の三次元界面に相補的であり、重鎖および軽鎖各々3つの高頻度可変領域は「相補性決定領域」又は「CDR」と称される。11Aおよび256の抗体のVHおよびVL領域のCDRはそれぞれ図1および図6に示される。

本明細書中で用いる「エピトープ」なる用語には、免疫グロブリンに特異的に結合することができる任意のタンパク質決定基、scFv又はT細胞レセプターが含まれる。エピトープ決定基は、アミノ酸や糖側鎖のような分子の化学的に活性な表面グルーピング(grouping)から成り、特定の三次元構造特性並びに特定の電荷特性をもつのが普通である。例えば、抗体は、ポリペプチドのN末端又はC末端ペプチドに対して生じうる。

## 【 0 0 2 7 】

本明細書中で用いる「免疫学的結合」及び「免疫学的結合性質」なる用語は、免疫グロブリン分子と免疫グロブリンが特異的である抗原との間に生じる非共有的相互作用の類を指す。免疫学的結合相互作用の強度又は親和性は、相互作用の解離定数( $K_d$ )により表され、小さい $K_d$ は大きな親和性を表す。選択されたポリペプチドの免疫学的結合性質は当分野で周知の方法を使用して定量化されてよい。ある一つの方法は、抗原結合部位/抗原

10

20

30

40

50

複合体形成と解離の速度を計測することを伴うものであり、このときこの速度は複合体パートナーの濃度、相互作用の親和性、および両方向の速度に等しく影響する幾何級数的パラメータに依存する。ゆえに、「会合速度定数」( $K_{on}$ )及び「解離速度定数」( $K_{off}$ )の両方は、濃度と会合および解離の実際の速度の計算によって決定されうる。(Nature 361:186-87 (1993)を参照)。 $K_{off} / K_{on}$ の比率は、親和性に関連しないすべてのパラメータを解除することが可能であり、解離定数 $K_d$ に等しい。(概して、Davies et al. (1990) Annual Rev Biochem 59:439-473を参照)。平衡結合定数( $K_d$ )が当分野の技術者に公知の放射性リガンド結合アッセイ又は類似のアッセイによって測定するところの、およそ $1 \mu M$ 以下、好ましくは $100 nM$ 以下、より好ましくは $10 nM$ 以下、最も好ましくは $100 pM$ 以下～およそ $1 pM$ である場合に、本発明の抗体は、インフルエンザエ

10

ピトープに特異的に結合するという。

本発明のインフルエンザタンパク質(例えばHA又はノイラミニダーゼ)、又はその誘導体、断片、アナログ、ホモログ又はオルソログは、これらのタンパク質成分を免疫特異的に結合する抗体の生成における免疫原として利用されてよい。

#### 【0028】

当業者は、過度な実験を行うことなく、ヒトモノクローナル抗体がインフルエンザウイルスのHAタンパク質への本発明のヒトモノクローナル抗体の結合を妨げるか否かを確認することによって、前者のヒトモノクローナル抗体が後者の本発明のヒトモノクローナル抗体と同じ特異性を有することを決定することができる。本発明のヒトモノクローナル抗体による結合の減少で示されるように、試験するヒトモノクローナル抗体が本発明のヒトモノクローナル抗体と競合する場合、それはおそらく、2つのモノクローナル抗体が同じエ

20

ピトープに結合するか又は非常に関連するエピトープに結合する。

ヒトモノクローナル抗体が本発明のヒトモノクローナル抗体の特異性を有するか否かを決定するもう一つの方法は、本発明のヒトモノクローナル抗体を通常反応するインフルエンザHAタンパク質とプレインキュベートし、次いで、試験するヒトモノクローナル抗体を添加して、試験するヒトモノクローナル抗体のHAタンパク質を結合する能力が阻害されるか否かを決定することである。試験するヒトモノクローナル抗体が阻害される場合、おそらく、本発明のモノクローナル抗体と同じ、又は機能的に等価なエピトープ特異性を有する。また、インフルエンザウイルスを利用して、試験モノクローナル抗体がインフルエンザウイルスを中和することができるか否かを決定することによって、本発明のヒトモノクローナル抗体のスクリーニングを行うことができる。

30

#### 【0029】

当分野で公知の様々な手順が、本発明のタンパク質に対する、または、その誘導体、断片、アナログ、ホモログ又はオルソログに対するポリクローナル抗体又はモノクローナル抗体の産生のために用いられてよい。(例として、出典明記によって本明細書中に援用される、Antibodies: A Laboratory Manual, Harlow E, and Lane D, 1988, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NYを参照)。

抗体は周知の技術、例えば、主に免疫血清のIgG分画を供給するプロテインA又はプロテインGを用いた親和性クロマトグラフィによって精製されてよい。その後又はあるいは、調査する免疫グロブリンの標的又はそのエピトープである特異的な抗原をカラムに固定し、免疫アフィニティークロマトグラフィによって免疫特異抗体を精製してよい。免疫グロブリンの精製は、例えばD. Wilkinson (The Scientist, published by The Scientist, Inc., Philadelphia PA, Vol. 14, No. 8 (April 17, 2000), pp. 25-28)によって述べられている。

40

#### 【0030】

本明細書中で用いられる「モノクローナル抗体」又は「MAb」又は「モノクローナル抗体組成物」は、固有の軽鎖遺伝子産物と固有の重鎖遺伝子産物からなる抗体分子の唯一の分子種を含む抗体分子の集団を指す。特に、モノクローナル抗体の相補性決定領域(CDR)は集団のすべての分子において同一である。MAbは、エピトープに対する固有の結合親和性によって特徴が表される抗原の特定のエピトープと免疫応答することができる

50

抗原結合部位を含む。

モノクローナル抗体は、Kohler and Milstein, Nature, 256:495 (1975)によって記述されるようなハイブリドーマ法を使用して調製されうる。ハイブリドーマ法では一般に、マウス、ハムスター又は他の適切な宿主動物を免疫化剤にて免疫化し、免疫化剤に特異的に結合する抗体を産生するか又は産生することができるリンパ球を誘発する。あるいは、リンパ球をインビトロで免疫化してもよい。

免疫化剤には一般的に、タンパク質抗原、その断片又はその融合タンパク質が含まれる。一般に、ヒト起源の細胞が望ましい場合、末梢血液リンパ球が使われ、または、非ヒト哺乳類の供与源が望ましい場合、脾細胞又はリンパ節細胞が使われる。次いで、適切な融合剤、例えばポリエチレングリコールを用いて、リンパ球を不死化細胞株と融合させ、ハイブリドーマ細胞を形成させる(Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, Academic Press, (1986) pp. 59-103)。不死化細胞株は通常、形質転換した哺乳動物細胞、特に齧歯類、ウシ及びヒト起源の骨髓腫細胞である。通常、ラット又はマウスの骨髓腫細胞株が使用される。ハイブリドーマ細胞は、融合していない不死化細胞の増殖又は生存を阻害する一又は複数の物質を好ましくは含む適切な培養培地中で培養されうる。例えば、親の細胞が酵素ヒポキサンチンゲアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ(HGPRT又はHPRRT)を欠いている場合、ハイブリドーマの培養培地は通常、HGPRT欠乏細胞の増殖を妨げる、ヒポキサンチン、アミノプテリンおよびチミジン(「HAT培地」)を含む。

#### 【0031】

好適な不死化細胞株は、効率よく融合し、選択された抗体産生細胞により安定して高いレベルで抗体を発現するものであり、HAT培地などの培地に影響されやすい。より好適な不死化細胞株はマウスの骨髓腫細胞株であり、例えばSalk Institute Cell Distribution Center, San Diego, California and the American Type Culture Collection, Manassas, Virginiaから入手することができる。ヒト骨髓腫およびマウスヒトヘテロメラノーマ細胞株も、ヒトモノクローナル抗体の産生について記述されている。(Kozbor, J. Immunol., 133:3001 (1984); Brodeur et al., Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications, Marcel Dekker, Inc., New York, (1987) pp. 51-63)を参照)。

そして、ハイブリドーマ細胞が培養された培養培地が、抗原に対するモノクローナル抗体の存在についてアッセイされてよい。好ましくは、ハイブリドーマ細胞によって産生されるモノクローナル抗体の結合特異性は、免疫沈降法、または、インビトロ結合アッセイ、例としてラジオイムノアッセイ(RIA)又は酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)によって決定される。このような技術およびアッセイは当分野で公知である。モノクローナル抗体の結合親和性は、例えばMunson and Pollard, Anal. Biochem., 107:220 (1980)のスカッチャード分析によって測定されてよい。さらに、モノクローナル抗体の治療的適用法では、標的抗原に対して高い特異性と高い結合親和性を有する抗体を同定することが重要である。

#### 【0032】

所望のハイブリドーマ細胞が同定されたあと、限界希釈手順によってクローンをサブクローニングし、標準的な方法によって増殖させてよい。(Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, Academic Press, (1986) pp. 59-103を参照)。このための適切な培養培地には、例えば、ダルベッコの変更イーグル培地およびRPMI 1640培地が含まれる。あるいは、ハイブリドーマ細胞は哺乳動物の腹水のようなインビボで増殖させてよい。

サブクローンによって分泌されるモノクローナル抗体は、従来の免疫グロブリン精製手順、例えばプロテインAセファロース、ヒドロキシルアパタイトクロマトグラフィ、ゲル電気泳動、透析又はアフィニティクロマトグラフィによって、培養培地又は腹水液から単離されるか又は精製されてよい。

#### 【0033】

また、モノクローナル抗体は、組換えDNA法、例えば米国特許第4816567号に

において記述されるものによって作製されてよい。本発明のモノクローナル抗体をコードするDNAは、従来の手順を用いて(例えば、マウス抗体の重鎖および軽鎖をコードする遺伝子に特異的に結合することができるオリゴヌクレオチドプローブを用いて)、容易に単離され、配列決定されうる。本発明のハイブリドーマ細胞はこのようなDNAの好適な供与源として役立つ。一旦単離されると、DNAは発現ベクターに入れられ、次いで、宿主細胞、例えばサルのCOS細胞、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞、又は免疫グロブリンタンパク質を産生しない骨髓腫細胞に形質移入し、組換え宿主細胞においてモノクローナル抗体を合成させることができる。また、DNAは、例えば、相同なマウス配列をヒトの重鎖及び軽鎖の定常ドメインのコード配列に置換するか(米国特許第4816567号; Morrison, Nature 368, 812-13 (1994)を参照)又は、免疫グロブリンコード配列のすべて又は非免疫グロブリンポリペプチドのコード配列の一部に共有的に系都合させることによって変更してよい。このような非免疫グロブリンポリペプチドを、本発明の抗体の定常ドメインと置換させるか、または本発明の抗体の一つの抗原結合部位の可変ドメインと置換させて、キメラ二価抗体を作製してよい。

完全なヒト抗体は、CDRを含む軽鎖及び重鎖の配列全体がヒト遺伝子に起因する抗体分子である。このような抗体は、本明細書中では「ヒト抗体」又は「完全ヒト抗体」と称する。ヒトモノクローナル抗体は、トリオーマ技法; ヒトのB細胞ハイブリドーマ技術(Kozbor, et al., 1983 Immunol Today 4: 72を参照); 及び、ヒトモノクローナル抗体を生産するためのEBVハイブリドーマ技術(Cole, et al., 1985: MONOCLONAL ANTIBODIES AND CANCER THERAPY, Alan R. Liss, Inc., pp. 77-96を参照)を用いて調製されうる。ヒトモノクローナル抗体が利用され、ヒトハイブリドーマを用いて(Cote, et al., 1983. Proc Natl Acad Sci USA 80: 2026-2030を参照)又はインビトロのエプスタインバーウイルスによるヒトB細胞形質転換により(Cole, et al., 1985 In: MONOCLONAL ANTIBODIES AND CANCER THERAPY, Alan R. Liss, Inc., pp. 77-96を参照)産生されてよい。

#### 【0034】

さらに、ヒト抗体は、ファージディスプレイライブラリを含む更なる技術を使用して生産されてよい。(Hoogenboom and Winter, J. Mol. Biol., 227:381 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol., 222:581 (1991)を参照)。同様に、ヒト抗体は、ヒト免疫グロブリン遺伝子座をトランスジェニック動物、例えば内在性免疫グロブリン遺伝子が部分的に又は完全に不活性化されているマウスに導入することによって作製されてよい。抗原刺激によりヒト抗体産生が観察され、それは遺伝子再構成、集合(assembly)および抗体レパートリ(repertoire)を含むすべての点においてヒトで観察されるものと非常に似ている。この手法は、例えば、米国特許第5545807号; 同第5545806号; 同第5569825号; 同第5625126号; 同第5633425号; 同第5661016号、及びMarks et al., Bio/Technology 10, 779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368 856-859 (1994); Morrison, Nature 368, 812-13 (1994); Fishwild et al, Nature Biotechnology 14, 845-51 (1996); Neuberger, Nature Biotechnology 14, 826 (1996); 及びLonberg and Huszar, Intern. Rev. Immunol. 13 65-93 (1995)に記載されている。

#### 【0035】

さらに、抗原による刺激に応答して動物の内在性抗体よりもむしろ完全ヒト抗体を生産させるために、変更されているトランスジェニック非ヒト動物を用いてヒト抗体を生産してよい。(PCT刊行国際公開94/02602を参照)。非ヒト宿主の重鎖及び軽鎖の免疫グロブリン鎖をコードする内在性遺伝子の活動能力を無くし、ヒトの重鎖及び軽鎖免疫グロブリンをコードする活性な遺伝子座を宿主ゲノム内に挿入する。例えば必要なヒトDNAセグメントを含む酵母人工染色体を用いて、ヒト遺伝子を組み込む。次いで、完全な変更の構成成分をあまり含まない中間のトランスジェニック動物を交雑することによって、望ましい変更を完全に提供する動物をプロジェニーとして得る。このような非ヒト動物の好ましい実施態様はマウスであり、PCT刊行物国際公開96/33735および国際公開96/34096に開示されるゼノマウス<sup>TM</sup>と呼ばれる。この動物は、完全なヒト免疫グロブリンを分泌するB細胞を生産する。抗体は、所望の免疫原による免疫化後の動

物から直接、例えばポリクローナル抗体の調製物として、あるいは、モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマのような動物由来の不死化B細胞から得られうる。さらに、ヒト可変領域を有する免疫グロブリンをコードする遺伝子を回収し、発現させて抗体を直接得るか、又は、さらに変更して、例えば単鎖Fv(scFv)分子のような抗体のアナログを得てもよい。

#### 【0036】

内在性免疫グロブリン重鎖の発現を欠いているマウスに例証される、非ヒト宿主の作製方法の一例は、米国特許第5939598号に開示される。胚性幹細胞内の少なくとも一の内在性重鎖遺伝子座からJセグメント遺伝子を欠失させて、遺伝子座の再編成を妨げると同時に再編成された免疫グロブリン重鎖遺伝子座の転写の形成を妨げることと(この欠失は選択マーカーをコードする遺伝子を含むターゲティングベクターによって達成される)、その胚性幹細胞から、その体細胞および生殖系細胞に選択マーカーをコードする遺伝子を含むトランスジェニックマウスを生産することを含む方法によって得られる。

ヒト抗体などの所望の抗体を製造する一つの方法は、米国特許第5916771号に開示される。この方法は、培養物中の一方の哺乳動物宿主細胞に重鎖をコードするヌクレオチド配列を含む発現ベクターを導入し、他方の哺乳動物宿主細胞に軽鎖をコードするヌクレオチド配列を含む発現ベクターを導入し、そして、2つの細胞を融合してハイブリッド細胞を形成することを含む。ハイブリッド細胞は重鎖および軽鎖を含む抗体を発現する。

#### 【0037】

この手順の更なる改善法では、免疫原上の臨床的に関連するエピトープの同定方法、及び高い親和性で関連のエピトープに免疫特異的に結合する抗体の選択相関方法は、PCT刊行物国際公開99/53049に開示される。

抗体は、前記の一本鎖抗体をコードするDNAセグメントを含むベクターにより発現されうる。

これらには、ベクター、リボソーム、ネイキッドDNA、アジュバント支援DNA、遺伝子銃、カテーテルなどが含まれる。ベクターには、国際公開93/64701に記載されるような、ターゲティング部分を有する化学的コンジュゲート(例えば細胞表面レセプターに対するリガンド)、および核酸結合部分(例えばポリリジン)、ウイルスベクター(例えばDNA又はRNAウイルスベクター)、PCT/US95/02140(国際公開95/22618)に記述されるような、標的部分(例えば標的細胞に特異的な抗体)および核酸結合部分(例えばプロタミン)を含む融合タンパク質である融合タンパク質、プラスミド、ファージなどが含まれる。このベクターは、染色体制、非染色体性又は合成されたものであってよい。

#### 【0038】

好ましいベクターには、ウイルスベクター、融合タンパク質および化学的コンジュゲートが含まれる。レトロウイルスベクターにはモロニー Maus 白血病ウイルスが含まれる。DNAウイルスベクターが好ましい。これらのベクターには、オルソボックス又はアピボックスベクターのようなボックスベクター、単純ヘルペスIウイルス(HSV)ベクターのようなヘルペスウイルスベクター(Geller, A. I. et al., J. Neurochem, 64:487 (1995); Lim, F., et al., in DNA Cloning: Mammalian Systems, D. Glover, Ed. (Oxford Univ. Press, Oxford England) (1995); Geller, A. I. et al., Proc Natl. Acad. Sci.: U.S.A. 90:7603 (1993); Geller, A. I., et al., Proc Natl. Acad. Sci USA 87:1149 (1990)を参照)、アデノウイルスベクター(LeGal LaSalle et al., Science, 259:988 (1993); Davidson, et al., Nat. Genet 3:219 (1993); Yang, et al., J. Virol. 69:2004 (1995)を参照)およびアデノ関連ウイルスベクター(Kaplitt, M. G., et al., Nat. Genet. 8:148 (1994)を参照)が含まれる。

ボックスウイルスベクターは遺伝子を細胞質に導入する。アピボックスウイルスベクターにより核酸の短期発現が生じる。アデノウイルスベクター、アデノ関連ウイルスベクターおよび単純ヘルペスウイルス(HSV)ベクターは、核酸を神経細胞に導入するために適する。アデノウイルスベクターにより、アデノ関連ウイルス(およそ4か月)より短い期間の

発現(およそ2か月)が生じ、それはHSVベクターよりも短い期間である。選択される特定のベクターは、治療される標的細胞および状態に依存するであろう。導入は、標準的な技術、例えば感染、形質移入(トランスフェクション)、形質導入(トランスダクション)又は形質転換(トランスフォーム)によるものであってよい。遺伝子導入の様式の例には、例えば、ネイキッドDNA、CaPO<sub>4</sub>沈殿、DEAEデキストラン、エレクトロポレーション、プロトプラスト融合、リポフェクション、細胞マイクロインジェクションおよびウイルスベクターが含まれる。

#### 【0039】

ベクターを用いて、基本的に任意の所望の標的細胞をターゲティングすることができる。例えば、定位注射を用いて、ベクター(例えばアデノウイルス、HSV)を所望の場所に 10  
あててもよい。さらに、ミニポンプ注入システム、例えばSynchroMed注入システムを用いた脳室内(icv)注入によって粒子が運搬されてよい。また、対流(convection)と称されるバルク流量に基づく方法は、脳の拡張領域への大分子の運搬に有効であり、標的細胞へのベクターの運搬に有用である。(Bobo et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:2076-2080 (1994); Morrison et al., Am. J. Physiol. 266:292-305 (1994)を参照)。用いられうる他の方法には、カテーテル、静脈内、非経口、腹膜内、及び皮下の注射や、投与や他の公知の投与経路が含まれる。

これらのベクターを用いて、さまざまな方法で用いられうる大量の抗体を発現させることができる。例えば、試料中のofanインフルエンザウイルスを検出するためである。 20  
また、抗体を用いて、結合させ、インフルエンザウイルス細胞膜融合を破壊しようと試みることができる。

#### 【0040】

本発明の抗原タンパク質に特異的な単鎖抗体の産生のための技術を応用することができる(例えば米国特許第4946778号を参照)。さらに、F<sub>a</sub>b<sub>2</sub>発現ライブラリの構築のための方法を応用して(例えばHuse, et al., 1989 Science 246: 1275-1281を参照)、タンパク質又はその誘導体、断片、アナログないしはホモログに対する所望の特異性を有するモノクローナルF<sub>a</sub>b断片を迅速かつ効率よく同定することができる。タンパク質抗原 30  
に対するイディオタイプを含む抗体断片は当分野で公知の技術によって製造され得、限定するものではないが以下のようなものがある。(i) 抗体分子のペプシン消化によって製造されるF<sub>(a b)</sub><sub>2</sub>断片、(ii) F<sub>(a b)</sub><sub>2</sub>断片のジスルフィド架橋を還元することによって製造されるF<sub>a b</sub>断片、(iii) パパインや還元剤により抗体分子が処理されて製造されるF<sub>a b</sub>断片、及び(iv) F<sub>v</sub>断片。

また、ヘテロコンジュゲート抗体も本発明の範囲内である。ヘテロコンジュゲート抗体は2つの共有結合して接合された抗体から成る。このような抗体は、例えば、不必要な細胞に対して免疫系細胞を標的化するため(米国特許第4676980号を参照)、そして、HIV感染の治療のため(国際公開91/00360; 国際公開92/200373; 欧州特許第03089号を参照)に提唱された。抗体が架橋剤を伴うものを含む合成タンパク質化学における公知の方法を使用してインビトロで調製されてよいことは考えられる。 40  
例えば、イムノトキシンは、ジスルフィド交換反応を使用して、またはチオエーテル結合を形成することによって構築されうる。この目的のための適切な試薬の例には、イミノチオレートおよびメチル-4-メルカプトブチルイミダートおよび、例えば米国特許第4676980号において開示されるものが含まれる。

#### 【0041】

例えば、インフルエンザを治療する際の抗体の有効性を上げるために、エフェクター機能に関して本発明の抗体を修飾することが望ましい。例えば、システイン残基(一又は複数)はFc領域に導入され、それによって、この領域の鎖間ジスルフィド結合が形成される。したがって、生成されるホモ二量体抗体は内部移行する能力を改善する、および/または、補体媒介性細胞殺傷能および抗体依存性細胞障害作用(ADCC)を増加することができる。(Caron et al., J. Exp Med., 176: 1191-1195 (1992)およびShopes, J. Immunol., 148: 2918-2922 (1992)を参照)。あるいは、二重Fc領域を有し、このことにより補 50

体細胞溶解および A D C C 能を亢進した抗体が設計されてよい。(Stevenson et al., *Anti Cancer Drug Design*, 3: 219-230 (1989)を参照)。

#### 【 0 0 4 2 】

また、本発明は、細胞障害性剤、例えば毒素(例えば細菌、真菌、植物又は動物の起源の酵素活性を有する毒素ないしはその断片)、又は放射性同位体(すなわちラジオコンジュゲート)にコンジュゲートされた抗体を含む免疫コンジュゲートに関する。

使われうる酵素活性を有する毒素およびその断片には、ジフテリア A 鎖、ジフテリアトキシンの非結合活性断片、エキソトキシンの A 鎖(緑膿菌から)、リシン A 鎖、アブリン A 鎖、モデシン A 鎖、 $\alpha$  サルシナ、アブラギリ f o r d i i タンパク質、d i a n t h i n タンパク質、ヨウシュヤマゴボウ(*Phytolacca americana*)タンパク質(P A P I、P A P I I および P A P S)、ニガウリ(*Momordica charantia*)インヒビター、c u r c i n、クロチン、sapaonaria officinalis インヒビター、ゲロニン、m i t o g e l l i n、レストリクトシン、フェノマイシン、エノマイシン、トリコテシンが含まれる。様々な放射性核種がラジオコンジュゲートされた抗体の産生に利用できる。例として、 $^{212}\text{Bi}$ 、 $^{131}\text{I}$ 、 $^{131}\text{In}$ 、 $^{90}\text{Y}$ 、 $^{186}\text{Re}$  などがある。

#### 【 0 0 4 3 】

抗体と細胞障害性剤のコンジュゲートは、様々な二官能性タンパク質カップリング剤、例えば N-スクシンイミジル-3-(2-ピリジルジチオール)プロピオナート(S P D P)、イミノチオラン(I T)、イミドエステルの二官能性誘導体(例えばアジブイミド酸ジメチル H C L)、活性なエステル(例えばスベリン酸ジサクシンイミジル)、アルデヒド(例えばグルタルアルデヒド)、ビス-アジド化合物(例えばビス-(p-アジドベンゾイル)-ヘキサレンジアミン)、ビス-ジアゾニウム誘導体(例えばビス-(p-ジアゾニウムベンゾイル)-エチレンジアミン)、ジイソシアナート(例えばトリエン-2,6-ジイソシアナート)、およびビス-活性フッ素化合物(例えば 1,5-ジフルオロ-2,4-ジニトロベンゼン)を用いて作製される。例えば、リシンイムノトキシンは、Vitetta et al., *Science* 238: 1098 (1987)に記載されるように調製されてよい。カルボン-14-標識 1-イソチオシアネートベンジル-3-メチルジエチレン トリアミン五酢酸(M X-D T P A)は、抗体への放射性ヌクレオチドのコンジュゲートのための例示的なキレート剤である。(国際公開 94/11026 を参照)。

当分野の通常の技術者は、多種多様な可能な部分が結果として生じる抗体に、または、本発明の他の分子に連結されてよいことを認識するであろう。(例として"Conjugate Vaccines", *Contributions to Microbiology and Immunology*, J. M. Cruse and R. E. Lewis, Jr (eds), Carger Press, New York, (1989)を参照、この内容全体は出典明記によって本明細書中に援用される)。

#### 【 0 0 4 4 】

カップリングは、抗体および他の部分がそれらそれぞれの活性を保持する限り、2つの分子を結合する任意の化学反応によって達成されうる。この結合には、多くの化学機構、たとえば共有結合、親和性結合、インターカレーション、座標結合および複合体生成が含まれうる。しかしながら、好適な結合は共有結合である。共有結合は、既存の側鎖の直接的な縮合によって又は外的架橋分子の取込みによって達成されうる。多くの二価又は多価の連結剤は、他の分子に対する、本発明の抗体のようなカップリングタンパク質分子において有用である。例えば、代表的なカップリング剤には、有機化合物、例えばチオエステル類、カルボジイミド類、スクシンイミドエステル類、ジイソシアナート類、グルタルアルデヒド、ジアゾベンゼン類およびヘキサメチレンジアミン類が含まれうる。このリストは、当分野で公知のカップリング剤の様々な種類を網羅しているものではなく、むしろ、一般的なカップリング剤の例示である。(Killen and Lindstrom, *Jour. Immun.* 133:1335-2549 (1984); Jansen et al., *Immunological Reviews* 62:185-216 (1982); 及び Vitetta et al., *Science* 238:1098 (1987)を参照)。好適なリンカーは文献に記述されている。例として、M B S (M-マレイミドベンゾイル-N-ヒドロキシスクシンイミドエステル)の使用を記述している Ramakrishnan, S. et al., *Cancer Res.* 44: 201-208 (1984)を参

照のこと。また、オリゴペプチドリンカーにより抗体にカップリングされるハロゲン化されたアセチルヒドラジド誘導体の使用を記述している、米国特許第5030719号も参照のこと。特に好適なリンカーには以下のものなどがある。(i) EDC(1-エチル-3-(3-ジメチルアミノ-プロピル)カルボジイミド)、(ii) SMPT(4-サクシニミジルオキシカルボニル- $\alpha$ -メチル- $\alpha$ -(2-ブリジル-ジチオ)-トルエン(Pierce Chem. Co.、カタログ番号(21558G))、(iii) SPDP(サクシニミジル-6[3-(2-ブリジルジチオ)プロピオンアミド]ヘキサノエート(Pierce Chem. Co.、カタログ番号21651G))、(iv) スルホ-LC-SPDP(スルホサクシニミジル-6[3-(2-ブリジルジチオ)-プロピアンアミド]ヘキサノエート(Pierce Chem. Co.、カタログ番号2165-G))、及び(v) EDCにコンジュゲートしたスルホ-NHS(N-ヒドロキシスルホ-サクシニミジル: Pierce Chem. Co.、カタログ番号24510)。

#### 【0045】

上記のリンカーは異なる特質を有する構成成分を含み、ゆえに、異なる生理化学的な性質を有するコンジュゲートとなる。例えば、アルキルカルボキシレートのスルホ-NHSエステル類は、芳香族のカルボキシレート類のスルホ-NHSエステル類より安定している。NHS-エステル含有リンカーはスルホ-NHSエステル類より可溶性が低い。さらに、リンカーSMPTは、立体障害型ジスルフィド結合を含み、コンジュゲートを形成して安定性を増しうる。ジスルフィド結合はインビトロ切断されるので、ジスルフィド結合は他の結合より一般的に安定性が低く、コンジュゲート利用性が低くなる。特に、スルホ-NHSはカルボジイミドカップリングの安定性を上げうる。カルボジイミドカップリング(例えばEDC)は、スルホ-NHSとともに使われる場合に、カルボジイミドカップリング反応単独より加水分解に対して抵抗力があるエステル類を形成する。

また、本明細書において開示される抗体は免疫リボソームとして調製されてもよい。抗体を含むリボソームは当分野で公知の方法によって調整され、例えばEpstein et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 82: 3688 (1985); Hwang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 77: 4030 (1980); 及び米国特許第4485045号及び同第4544545号に記載されている。増加した循環時間を有するリボソームは、米国特許第5013556号において開示される。

特に有用なリボソームは、ホスファチジルコリン、コレステロール及びPEG誘導体化ホスファチジルエタノールアミン(PEG-PE)を含有する脂質組成物を用いた逆相蒸発法により産生することができる。リボソームは定められた細孔径のフィルターにて押し出され、所望の直径を有するリボソームが得られる。本発明の抗体のFab'断片は、ジスルフィド相互交換反応によりMartin et al., J. Biol. Chem., 257: 286-288 (1982)に記載されるリボソームにコンジュゲートされてよい。

#### 【0046】

インフルエンザウイルスに対する抗体の使用

所望の特異性を有する抗体を選別する方法には、非限定的に酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)及び当技術分野で公知の他の免疫仲介技術が含まれる。

例えばHA(又はそのフラグメント)等のインフルエンザウイルス・タンパク質に対する抗体を、インフルエンザウイルス・タンパク質の局在化及び/又は定量化に関連する、当技術分野で公知の方法において使用することができる(例えば、適切な生理学的試料におけるインフルエンザウイルス・タンパク質のレベルの測定での使用、診断法における使用、蛋白質の画像診断における使用等)。所定の実施形態では、抗体誘導抗原結合性ドメインを含む、インフルエンザウイルス・タンパク質、またはその誘導体、フラグメント、類似体、又はホモログに特異的な抗体が、(以下に「療法」と呼ばれる)薬理学的な活性体として用いられる。

#### 【0047】

本発明のインフルエンザウイルス・タンパク質に特異的な抗体を使用して、例えば免疫アフィニティー、クロマトグラフィー、又は免疫沈降等の標準技術によって、インフルエンザウイルスポリペプチドを単離することができる。インフルエンザウイルス・タンパク

質（又はそのフラグメント）に対する抗体を、例えば、所定の治療計画の効能を判定するための臨床試験方法の一部として診断上使用して、細胞中の蛋白質レベルを監視することができる。検出は、抗体を検出可能な物質に連結させる（すなわち物理的に結合させる）ことによって促進できる。検出可能な物質の例としては、様々な酵素、接合団、蛍光物質、発光物質、生物発光物質、及び放射性物質が挙げられる。好適な酵素の例としては、西洋ワサビペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ、ベータガラクトシダーゼ、又はアセチルコリンエステラーゼが挙げられ；好適な接合団複合体の例としては、ストレプトアビジン／ビオチン及びアビジン／ビオチンが挙げられ；好適な蛍光物質の例として、ウンベリフェロン、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート、ローダミン、ジクロロトリアジニラミンフルオレセイン、ダンシルクロリド、又はフィコエリトリンが挙げられ；発光物質の例としては、ルミノールが挙げられ；生物発光物質の例として、ルシフェラーゼ、ルシフェリン、及びエクオリン、そして好適な放射性物質の例として<sup>125</sup>I、<sup>131</sup>I、<sup>35</sup>S又は<sup>3</sup>Hが挙げられる。

ポリクローナル、モノクローナル、ヒト化及び、完全ヒト抗体を含む本発明の抗体は治療薬として使用することができる。この種の薬品は通常、被検体のインフルエンザウイルス関連の疾患または病理学（例えば鳥インフルエンザ）を治療するまたは予防するために用いられる。抗体の製剤、好ましくは標的抗原に対する高い特異性及び高い親和性を有する抗体の製剤は被検体に投与され、通常、製剤が標的と結合することにより効果が発揮される。抗体の投与は、細胞へのウイルスの内部移行を無効にする、又は阻害する又は干渉することができる。この場合、抗体が標的と結合して、自然発生的なりガンドの結合部位をマスキングすることにより、ウイルスの細胞膜への融合を妨げて、ウイルスの内部移行を阻害する。

#### 【0048】

本発明の抗体の治療上有効量は一般に、治療の目的を達成するために必要な量に関連している。上述したように、これは特定の場合において標的の機能に干渉する、抗体とその標的抗原との間の結合相互作用であってよい。必要な投与量は、さらに、特定の抗原に対する抗体の結合親和性に依存する、また、投与された抗体が、その抗体が投与される他の被検体の自由体積から減少する率に依存する。本発明の抗体又は抗体フラグメントの治療上有効量の一般的な範囲は、非限定的な実施例として、約0.1～50 mg/kgの体重であってよい。一般的な投与頻度は例えば一日2回から一週間に1回の範囲であってよい。

本発明の、特にインフルエンザウイルス・タンパク質と結合する抗体又はそのフラグメントだけでなく、本明細書に開示されるスクリーニング・アッセイによって特定される他の分子を、医薬組成物の形態で、インフルエンザウイルス関連の疾患の治療のために投与することができる。上記組成物の調製に関連する原理および考察だけでなく、構成要素の選択におけるガイダンスは、例えば、Remington: The Science And Practice Of Pharmacy 19th ed. (Alfonso R. Gennaro, et al., editors) Mack Pub. Co., Easton, Pa., 1995; Drug Absorption Enhancement: Concepts, Possibilities, Limitations, And Trends, Harwood Academic Publishers, Langhorne, Pa., 1994; and Peptide And Protein Drug Delivery (Advances In Parenteral Sciences, Vol. 4), 1991, M. Dekker, New Yorkにおいて提供されている。

抗体フラグメントが使用されるところでは、特に標的タンパク質のドメインと結合する最も小さい抑制フラグメントが好まれる。例えば、抗体の可変領域配列に基づいて、標的タンパク質配列を結合する能力を保持するペプチド分子を構成することができる。上記ペプチド分子は、化学的に合成することができる及び／又は組み換えDNA技術によって生成することができる。(例えば Marasco et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90: 7889-7893 (1993)参照)。製剤はまた、必要に応じて治療中の特定の適応症の複数の活性化化合物、好ましくは相互に悪影響を及ぼさない相補的な活性を有する活性化化合物を含むこともできる。代わりに又は加えて、組成物は、その機能、例えば細胞毒性薬剤、サイトカイン、化学療法剤または増殖抑制薬剤を強化する薬剤を含むことができる。上記分子は、意図

する目的に効果的な量で好適に組み合わせられる。

【0049】

活性成分はまた、例えばそれぞれコロイド薬物送達系（たとえば、リボソーム、アルブミン微小球体、ミクロエマルジョン、ナノ粒子、そして、ナノ・カプセル）又はマクロエマルジョン類のヒドロキシ・メチルセルロース又はゼラチン・マイクロカプセル及びポリ（メタアクリル酸メチル）マイクロカプセル等の、例えばコアセルベーション技術によって又は界面重合によって調製されたマイクロカプセルに封入することができる。

生体内投与に使用される製剤は、無菌でなければならない。これは、無菌の濾過膜を介した濾過によって、容易に達成される。

徐放性製剤を調合することができる。徐放性製剤の好適な実施例には、抗体（マトリックスが造形品、例えばフィルムまたはマイクロカプセルの形である）を含んでいる固体の疎水性ポリマーの半透性マトリックスが含まれる。徐放性マトリックスの実施例は、ポリエステル、ヒドロゲル（例えばポリ（2-ヒドロキシエチルメタクリレート）、又はポリ（ビニルアルコール）、ポリ・ラクチド（米国特許第3773919号明細書）、Lグルタミン酸およびγエチルLグルタミン酸塩の共重合体、分解不能なエチレン酢酸ビニル、LUPRON DEPOSIT<sup>TM</sup>（乳酸グリコール酸共重合体および酢酸ロイプロリドから構成される注射可能なマイクロステリア）等の分解可能な乳酸グリコール酸共重合体、およびポリ-D-（-）3-ヒドロキシ酪酸を含む。エチレン酢酸ビニルおよび乳酸グリコール酸等のポリマーにより100日間以上の分子の放出が可能になるとともに、特定のヒドロゲルがより短い期間にタンパク質を放出する。

【0050】

本発明による抗体は、試料中のインフルエンザウイルス（またはタンパク質またはそのタンパク質フラグメント）の存在を検出するための薬剤として使用することができる。好ましくは、抗体は、検出可能な標識を含む。抗体は、ポリクローナル、より好ましくはモノクローナルであってよい。無傷の抗体、又はそのフラグメント（例えば、F<sub>ab</sub>、scFv又はF<sub>(ab)<sub>2</sub></sub>）を使用することができる。プローブまたは抗体に関する用語「標識」は、直接標識化された別の試薬との反応性によるプローブ又は抗体の間接的な標識化だけでなく、検出可能な物質をプローブまたは抗体に結合する（すなわち、物理的に連結する）ことによるプローブまたは抗体の直接的な標識化を含む。間接的な標識化の実施例には、主要抗体を蛍光標識ストレプトアビジンによって検出できるように、第2の蛍光標識抗体とビオチンを有するDNAプローブの末端標識化を使用した主要抗体の検出が含まれる。用語「生物学的試料」は、被検体内に存在する組織、細胞及び体液だけでなく、被検体から分離される組織、細胞および体液を含む。したがって、用語「生物学的試料」の使用には、血液および血清、血漿またはリンパを含む血液の部分又は構成要素が含まれる。すなわち、本発明の検出方法は、インビボのみでなくインビトロで生物学的試料の被検体mRNA、タンパク質またはゲノムDNAを検出するのに使用することができる。例えば、被検体mRNA検出のインビトロ技術には、ノーザンハイブリダイゼーションと、インサイツハイブリダイゼーションが含まれる。被検体タンパク質検出の生体外技術には、酵素結合免疫吸着アッセイ（ELISA）、ウエスタンブロット、免疫沈降、及び免疫蛍光検査が含まれる。被検体ゲノムDNA検出のインビトロ技術には、サザンハイブリダイゼーションが含まれる。免疫アッセイを実施する手順は、例えばELISA: Theory and Practice: Methods in Molecular Biology<sup>TM</sup>, Vol. 42, J. R. Crowther (Ed.) Human Press, Totowa, NJ, 1995; “Immunoassay”, E. Diamandis and T. Christopoulos, Academic Press, Inc., San Diego, CA, 1996; and “Practice and Theory of Enzyme Immunoassays”, P. Tijssen, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1985に記載されている。さらに、被検体タンパク質検出のインビボ技術には、標識非被検体タンパク質抗体を被検体に導入することが含まれる。例えば、抗体は、被検体内での存在及び位置が標準撮像技術によって検出可能な放射性マーカーによる標識化が可能である。

【0051】

医薬組成物

本発明の抗体又は薬剤（また、本明細書において「活性化合物」とも称される）、及びその誘導体、フラグメント、類似体及び相同体は、投与に好適な医薬組成物に組み込むことができる。上記組成物は通常、抗体又は薬剤、及び薬学的に受容可能な担体を含む。本明細書で使用しているように、用語「薬学的に受容可能な担体」は、薬学的投与に適合する、任意の及び全ての溶媒、分散媒、コーティング、抗菌及び抗真菌剤、等浸透及び吸収遅延剤等が含まれる。好適な担体は、参照により本明細書に組み込まれる当技術分野における標準参照テキストである、Remington's Pharmaceutical Sciencesの最新版に記載されている。上記担体又は希釈剤の好適な実施例は、非限定的に、水、食塩水、リンガー溶液、ブドウ糖溶液および5%のヒト血清アルブミンを含む。不揮発性油等のリポソームおよび非水性ビヒクルを使用することもできる。薬学的活性物質に対する上記媒体及び薬剤の使用は当技術分野において公知である。任意の従来の媒体又は薬剤が活性化合物と適合しない場合以外は、上記媒体及び薬剤の組成物における使用が考察される。補助活性化合物を組成物に組み込むことも可能である。

本発明の医薬組成物は、意図された投与ルートに適合するように調合される。投与ルートの実施例には、例えば静脈内、皮内、皮下、経口（例えば吸入）、経皮（すなわち局所の）、経粘膜、直腸投与等の非経口投与が含まれる。非経口、皮内、皮下投与に使用する溶液または懸濁液は以下の構成要素を含むことができる：例えば注射用の水、食塩液、不揮発性油、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール又は他の合成溶媒等の無菌の希釈剤；例えばベンジルアルコール又はメチルパラベン等の抗菌剤；例えばアスコルビン酸または亜硫酸水素ナトリウム等の酸化防止剤；例えばエチレンジアミン四酢酸（EDTA）等のキレート剤；例えば塩化ナトリウム又はブドウ糖等の張度調整用の酢酸塩、クエン酸塩またはリン酸塩及び薬品等のバッファ。pHは例えば、塩酸又は水酸化ナトリウム等の酸または塩基によって調整可能である。非経口製剤は、アンプル、使い捨て注射器又はガラス若しくはプラスチック製の複数回投与瓶に封入することができる。

#### 【0052】

注射可能な用途に好適な医薬組成物には、無菌の注射可能な溶液または分散液の即時調製のための滅菌水溶液（水溶性の）、又は分散液及び無菌粉が含まれる。静脈内投与については、好適な担体は、生理的食塩水、静菌水、Cremophor EL<sup>TM</sup>（BASF, Parsippany, N.J.）、またはリン酸塩緩衝食塩水（PBS）を含む。全ての場合において組成物は無菌であり、容易に注射針を通過できる程度に流動的でなければならない。組成物は、製造及び保管の条件下で安定しているべきであり、例えばバクテリア及び菌類等の微生物の汚染作用に対して保存されなければならない。担体は、例えば、水、エタノール、ポリオール（例えば、グリセロール、プロピレングリコール、液状ポリエチレングリコールなど）及びこれらの好適な混合物を含む溶媒又は分散媒であってよい。例えば、レシチンなどのコーティングの使用により、分散液の場合は必要な粒径を維持することにより、および界面活性剤の使用により、適切な流動性を維持することができる。様々な抗菌剤及び抗真菌剤、例えば、パラベン、クロロブタノール、フェノール、アスコルビン酸、チメロサル等により微生物の作用を防止することができる。多くの場合において、組成物中に等張化剤、例えば、糖、マンニトール、ソルビトールのようなポリアルコール、塩化ナトリウムを含むことが好ましい。注入可能な組成物の持続的な吸収は、組成物中に吸収を遅らせる薬剤、例えばモノコテアリン酸アルミニウムおよびゼラチンを含ませることにより成すことができる。

無菌の注射可能な溶液は、必要に応じて必要量の活性化合物を上記に列挙された成分を組合せた適切な溶媒に組み込むことによって調製することができ、その後フィルタ殺菌が行われる。通常、分散液は活性化合物を基本的な分散媒及び上記に列挙したうちの必要な他の成分を含む無菌ビヒクルへ組み込むことによって調製される。無菌の注射可能な溶液の調整用の無菌粉の場合、調整の方法は真空乾燥及び凍結乾燥であり、この方法により、事前に無菌のフィルタ処理された溶液から、活性成分と任意の所望の添加成分の粉が生成される。

#### 【0053】

経口用組成物は一般に、不活性希釈剤または食用の担体を含む。これらは、ゼラチン・カプセルに格納するまたは錠剤に圧縮することができる。経口治療投与の目的で、活性化合物を賦形剤と合わせて、錠剤、トローチまたはカプセルの形態で用いることができる。経口用組成物はまた、うがい薬として使用するために流体担体を使用して調整することができ、この場合流体担体の化合物は経口投与され、口内でかき回されて、嚥出される又は嚥下される。薬学的に混合可能な結合剤、及び／又は補助材料を、組成物の一部として含むことができる。錠剤、ピル、カプセル、トローチなどは、以下の成分のいずれか又は類似の性質の化合物を含むことができる：例えば微晶質性セルロース、トラガカントゴムまたはゼラチン等のバインダ；例えば澱粉またはラクトース等の賦形剤、例えば澱粉またはラクトース、例えばアルギン酸、プリモゲル又はコーンスターチ等の崩壊剤；例えばステアリン酸マグネシウム又はステロート等の潤滑剤；例えばコロイド状二酸化ケイ素等の流動促進剤；例えばスクロース又はサッカリン等の甘味剤；例えばペパーミント、メチルサリチレートまたはオレンジ香味料等の香味剤。

吸入による投与のために、化合物はエアロゾルスプレーの形態で、好適な噴霧剤、例えば二酸化炭素等のガスを含む加圧容器またはディスペンサ、又はネブライザーから送出される。

#### 【 0 0 5 4 】

全身投与はまた、経粘膜的又は経皮的手段によるものであってよい。経粘膜的又は経皮的投与には、浸透するべきバリアに対する適切な浸透剤が製剤中に使用される。この種の浸透剤は従来技術において一般に公知であり、例えば、経粘膜的投与には、洗剤、胆汁酸塩及びフシジン酸誘導体が含まれる。経粘膜的投与は、鼻噴霧または坐薬の使用を通して行うことができる。経皮的投与には、活性化合物は、当技術分野で一般に知られているような軟膏、膏薬またはクリームに調合される。

化合物はまた、直腸送達のために、坐薬（例えば、カカオバター及び他のグリセリド等の従来の坐薬基剤によって）又は停留浣腸の形に調製可能である。

一実施形態においては、活性化合物は、インプラント及びマイクロカプセル封入送達システムを含む、放出制御製剤等の体内からの急速な排出から化合物を保護する担体で調製される。例えばエチレン酢酸ビニル、ポリ無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステル及びポリ乳酸等の、生物分解性で生物学的適合性を有するポリマーを用いることができる。この種の製剤の調製方法は、当業者にとって明らかである。材料はまた、Alza Corporation及びNova Pharmaceuticalsから市販されている。（ウイルス抗原にモノクローナル抗体を有する感染した細胞を標的とするリボソームを含む）リボソームの懸濁は、また、薬学的に受容可能な担体としても用いることができる。これらは、例えば、米国特許第 4 5 2 2 8 1 1 号に記載されているように、当業者に公知の方法に従って調製することができる。

#### 【 0 0 5 5 】

経口又は非経口的組成物を投薬量単位の形態で製剤することは、投与の容易さ及び投薬量の均一性のために特に有利である。本明細書で使用される投薬量単位は、治療される被検体均一な投薬量として適した物理的に個別の単位を意味し、各単位は必要な薬学的担体に関連する所望の治療効果を生み出すように計算された活性化合物の所定量を含む。本発明の投薬量単位の形態の規格は、活性化合物の独特の特徴及び達成される特定の治療効果、及び個人の治療向けのこの種の活性化合物の当技術分野に特有の限界によって決定され、直接依存している。

医薬品組成物は、投与説明書と共に、容器、パックまたはディスペンサに含むことができる。

#### 【 0 0 5 6 】

##### スクリーニング方法

本発明は、モジュレータ、（本明細書においては「スクリーニング分析」とも称される）、すなわち変調するかまたはさもないと細胞膜へのインフルエンザウイルスの融合を調整する又はそうでなければ干渉する候補または試験化合物または薬剤（例えばペプチド、

10

20

30

40

50

ペプチド模倣薬、小さい分子または他の薬)を識別する方法を提供する。インフルエンザ感染症を治療するのに役立つ化合物を識別する方法も提供されている。本発明はまた、本明細書において記載されているスクリーニング分析を使用して識別される化合物も含む。

例えば、本発明は、インフルエンザウイルス及び細胞膜の間の相互作用を調整するスクリーニング候補または試験化合物のための分析を提供する。本発明の試験化合物は、当技術分野で公知の組合せライブラリ法の多数の方法のいずれかを用いて得ることができ、組合せライブラリ法には：生物学的ライブラリ；空間的にアドレス可能な平行した固体位相または溶液位相ライブラリ；逆重畳積分が必要である合成ライブラリ法；「一ビーズ一化合物」ライブラリ法；及び親和性クロマトグラフィ選択を使用する合成ライブラリ法が含まれる。生物学的ライブラリ法はペプチド・ライブラリに限られる一方、その他の4つの方法は化合物のペプチド、非ペプチド・オリゴマー又は小さい分子ライブラリに適用可能である。(例えば Lam, 1997. *Anticancer Drug Design* 12: 145参照)。

#### 【0057】

本明細書において使われる「小分子」は、約5 kD未満及び最も好ましくは約4 kD未満の分子量を有する組成物を指す。小さい分子は、例えば、核酸、ペプチド、ポリペプチド、ペプチド模倣薬、炭水化物、脂質または他の有機又は無機分子であってよい。例えば菌類、細菌、藻類抽出物等の化学及び/又は生物学的混合物のライブラリは、当技術分野で公知であり、本発明の任意の分析によってスクリーニングすることができる。

分子ライブラリの合成方法の実施例は、当技術分野において例えば：DeWitt, et al., 1993. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 90: 6909; Erb, et al., 1994. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 91: 11422; Zuckermann, et al., 1994. *J. Med. Chem.* 37: 2678; Cho, et al., 1993. *Science* 261: 1303; Carrell, et al., 1994. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 33: 2059; Carrell, et al., 1994. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 33: 2061; and Gallop, et al., 1994. *J. Med. Chem.* 37: 1233に見受けられる。

化合物のライブラリは溶液内に(例えばHoughten, 1992. *Biotechniques* 13: 412-421参照)、又はビーズ上に(Lam, 1991. *Nature* 354: 82-84参照)、チップ上に(Fodor, 1993. *Nature* 364: 555-556参照)、バクテリア(米国特許第5,223,409号明細書参照)、胞子(米国特許第5,233,409号明細書参照)、プラスミド(Cull, et al., 1992. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 89: 1865-1869参照)、又はファージに(Scott and Smith, 1990. *Science* 249: 386-390; Devlin, 1990. *Science* 249: 404-406; Cwirla, et al., 1990. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 87: 6378-6382; Felici, 1991. *J. Mol. Biol.* 222: 301-310; 及び米国特許第5,233,409号明細書参照)含まれることが可能である。

#### 【0058】

一実施形態において、候補化合物は抗体-抗原複合体に導入されて、候補化合物が抗体-抗原複合体を崩壊させるかどうかを決定し、この複合体の崩壊は候補化合物がインフルエンザウイルスおよび細胞膜の間の相互作用を調整することを表す。例えば、抗体はモノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90およびH98であってよく、抗原はインフルエンザウイルスのHAタンパク質上に位置することができる。

別の実施形態では、少なくとも一つのHAタンパク質は形成され、このタンパク質は少なくとも一つの中和モノクローナル抗体に曝露される。抗体-抗原複合体の形成が検出され、一又は複数の候補化合物が複合体に導入される。抗体-抗原複合体が一又は複数の候補化合物の導入後に崩壊する場合、候補化合物は、例えば鳥インフルエンザ等のインフルエンザウイルス関連の疾患又は障害を治療するのに有用である。例えば、少なくとも一つのインフルエンザウイルス・タンパク質をインフルエンザウイルス分子として、供給することができる。

#### 【0059】

抗原またはその生物学的に活性な部分に対する試験化合物の結合が、複合体の標識化合物を検出することによって決定できるように、試験化合物を放射性同位体または酵素標識に連結することにより、試験化合物の、抗体-抗原複合体を干渉するかまたは崩壊させる

10

20

30

40

50

能力を決定することができる。例えば、試験化合物は直接又は間接的に、 $^{125}\text{I}$ 、 $^{35}\text{S}$ 、 $^{14}\text{C}$ または $^3\text{H}$ で標識化することができ、放射性同位体は電波放射の直接計数によって又はシンチレーション計数によって検出される。あるいは、試験化合物は例えば、セイヨウワサビ・ペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ又は発光酵素で酵素的に標識化することができ、酵素的標識は、適切な物質の製品への転換の決定によって検出される。

一実施形態において、分析は、抗体-抗原複合体を試験化合物に接触させて、抗原と相互作用する又はさもなければ、既存の抗体-抗原複合体を崩壊させる試験化合物の能力を決定することを含む。本実施形態では、抗原と相互作用する又はさもなければ、既存の抗体-抗原複合体を崩壊させる試験化合物の能力を決定することは、抗原又は抗原の生物学的に活性な部分と優先的に結合する試験化合物の能力を決定することを含む。

10

#### 【0060】

別の実施形態では、分析は、抗体-抗原複合体を試験化合物に接触させて、抗体-抗原複合体を調整する試験化合物の能力を決定することを含む。抗体-抗原複合体を調整する試験化合物の能力を決定することは、例えば、試験化合物の存在下で、抗体と結合する又は相互作用する抗原の能力を決定することによって達成可能である。

当業者は、本明細書において開示されるスクリーニング方法全てにおいて、抗原は、モノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90およびH98等のインフルエンザウイルス中和口外であってよい。さらに、抗原はHAタンパク質又はその一部であってよい。本明細書に記載された全ての分析において、モノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90およびH98とHAタンパク質との間の結合に干渉する候補化合物の能力は、候補化合物がインフルエンザウイルス及び細胞膜との融合に干渉するまたは調整することが可能であることを表している。さらに、HAタンパク質の細胞への結合は、細胞へのインフルエンザウイルスの侵入の原因となるため、上記候補化合物は、例えば鳥インフルエンザ等のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害の治療にも役立つ。

20

#### 【0061】

本願明細書に開示されるスクリーニング方法は、細胞に基づいた分析として又は無細胞分析として実行可能である。本発明の無細胞分析は、HAタンパク質とその一部の可溶形態または膜結合形態の両方の使用に修正可能である。HAタンパク質の膜結合形態を含む無細胞分析の場合、タンパク質の膜結合形態が溶液中に維持されるように、可溶化剤を用いることが望ましいことであり得る。上記可溶化剤の実施例には、例えばn-オクチルグルコシド、n-ドデシルグルコシド、n-ドデシルマルトシド、オクタノイル-N-メチルグルカミド、デカノイル-N-メチルグルカミド、Triton（登録商標）X-100、Triton（登録商標）X-114、Thesit（登録商標）、イソトリデシルポリ(エチレン・グリコール・エーテル)<sub>n</sub>、N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸塩(CHAPS)、又は3-(3-コラミドプロピル)ジメチルアンモニオ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホン酸塩(CHAPSO)等の非イオン洗剤が挙げられる。

30

複数の実施形態において、以下の候補化合物の導入の一方または両方の非複合形態からの複合体の分離を容易にする抗体又は抗原を静止させると同時に、分析の自動化を図ることは、望ましいことであり得る。候補化合物の有無における抗体-抗原複合体の観察は、反応物を含むのに適した全ての容器にもおいて行うことができる。上記容器の実施例には、マイクロタイタープレート、試験管、及びマイクロ遠心分離管が含まれる。一実施形態では、タンパク質の一方または両方がマトリックスに結合することが可能になるドメインを加える融合タンパク質が提供可能である。例えば、GST抗体融合タンパク質またはGST抗原融合タンパク質はグルタチオンセファロースビーズ（ミズーリ州セントルイスのシグマケミカル社）又はグルタチオン誘導体化マイクロタイタープレート上へ吸着することができ、その後試験化合物と結合し、この混合物は複合体形成（例えば、塩およびpHの生理的条件で）につながる条件下で培養される。培養後、ビーズ又はマイクロタイター

40

50

プレートウェルは洗浄されて未結合の構成要素が全て除去され、ビーズの場合はマトリックスが固定化され、複合体が直接又は間接的に決定される。あるいは、複合体はマトリックスから分離可能であり、抗体-抗原複合体形成のレベルは標準の技術を使用して決定することができる。

#### 【0062】

マトリックス上のタンパク質を固定化することの他の技術を、本発明のスクリーニング分析に用いることができる。例えば、抗体又は抗原は、ビオチン及びストレプトアビジンの共役を用いて固定化できる。ビオチン化抗体又は抗原分子は、当技術分野で公知の技術（例えばイリノイ州ロックフォードのピアスケミカル社のビオチン化キット）を使用して、ビオチン-NHS（N-ヒドロキシ-スクシンイミド）から調製し、ストレプトアビジンでコーティングされた96ウェルプレート（ピアスケミカル社）のウェルにおいて固定化することができる。あるいは、対象の抗体または抗原と反応するが、対象の抗体-抗原複合体の形成には干渉しない他の抗体を、プレートのウェルに誘導体化させて、抗体コンジュゲートによってウェルに捕獲された抗体又は抗原を開放することができる。上記複合体を検出する方法は、GSTが固定化された複合体について上述したものに加えて、抗体又は抗原と反応する上記の他の抗体を使用する複合体の免疫検出を含む。

本発明は、更なる本発明は処理のために任意の前述したスクリーニング分析およびその使用によって識別される新規の薬剤さらに関連する。

#### 【0063】

##### 診断分析

本発明の抗体は、適切な分析、例えば従来の種類の免疫測定法によって検出が可能である。例えば、ある分析は、インフルエンザ・タンパク質（例えばHA1、HA2又はノイラミニダーゼ）又はそのフラグメントが固相に加えられる方法で実行することができる。培養は、試料中の抗体が固相上の固定化されたポリペプチドと結合することができるように、十分な期間維持される。この最初の培養後に、固相が試料から分離される。この固相は洗浄されて、試料中にも存在しえる未結合材料と例えば非特異的タンパク質等の干渉物質が除去される。ポリペプチドと結合した関心対象の抗体を含む固相は次に、第2の標識化抗体又はビオチンまたはアビジン等の結合剤と結合した抗体で培養される。この第2の抗体は、他の抗インフルエンザ抗体又は他の抗体であってよい。抗体の標識は、当技術分野において公知であり、放射性核種、酵素（例えばマレアート・デヒドロゲナーゼ、西洋ワサビ・ペルオキシダーゼ、ブドウ糖オキシダーゼ、カタラーゼ）、蛍石（フルオレッseinイソチオシアネート、ローダミン、フィコシアニン、フルオレカミン(fluorescamine)）、ビオチンなどを含む。標識化抗体は固体で培養され、固相に結合される標識が測定される。これらの、及び他の免疫分析は、当業者によって容易に実行されることができる。

生体試料中のインフルエンザウイルスの有無を検出する事例となる方法は、インフルエンザウイルスの存在が生体試料において検出されるように、被検体から生体試料を得て、生体試料を本発明による標識化モノクローナル又はscFv抗体と接触させることを含む。

#### 【0064】

本明細書で使用している、プローブ又は抗体に関連する用語「標識化」は、検出可能な物質をプローブ又は抗体に結合させる（すなわち物理的に連結させる）ことによってプローブ又は抗体を直接標識化することだけでなく、直接標識化された別の試薬との反応によるプローブ又は抗体の間接的な標識化を含む。間接的な標識化の実施例には、蛍光標識されたストレプトアビジンで検出することができるように、蛍光標識された第2の抗体及びビオチンによるDNAプローブの末端標識化を使用した主要抗体の検出が含まれる。用語「生体試料」には、被検体内に存在する組織、細胞及び体液と同様に、被検体から分離された組織、細胞および生体液が含まれる。すなわち、本発明の検出方法は、生体外だけでなく生体内における生体試料のインフルエンザウイルスを検出するために用いることができる。例えば、インフルエンザウイルス検出の生体外技術は、酵素結合免疫吸着法（EL

I S A )、ウエスタンブロット、免疫沈降、及び免疫蛍光法を含む。さらに、インフルエンザウイルスを検出する生体内技術は、標識抗インフルエンザウイルス抗体を被検体に導入することを含む。例えば、抗体は、被検体の存在および位置が標準の撮像技術によって検出可能な放射性マーカーで標識することができる。

一実施形態では、生体試料は被検体からのタンパク質分子を含む。ある好適な生体試料は、被検体から従来の手段によって分離された末梢血白血球の試料である。

本発明はまた、生体試料におけるインフルエンザウイルスの存在を検出するためのキットを含む。例えばキットは：生体試料のインフルエンザウイルス（例えば抗インフルエンザ s c F v 又はモノクローナル抗体）を検出することができる標識化合物または薬剤；試料中のインフルエンザウイルスの量を決定するための手段；及び試料中のインフルエンザウイルスの量を標準と比較するための手段を含むことができる。化合物または薬剤は、好適な容器にパッケージ化することができる。キットはさらに、キットを使用して試料中のインフルエンザウイルスを検出する説明書を含むことができる。

#### 【 0 0 6 5 】

##### 受動免疫法

受動免疫法は、ウイルス疾患の予防および治療に対する効果的で安全な戦略であると説明した。(Keller et al., Clin. Microbiol. Rev. 13:602-14 (2000); Casadevall, Nat. Biotechnol. 20:114 (2002); Shibata et al., Nat. Med. 5:204-10 (1999); and Igarashi et al., Nat. Med. 5:211-16 (1999) 参照。各文献は参照することによって本明細書に組み込まれる。) 中和ヒトモノクローナル抗体を使用した受動免疫法は、鳥インフルエンザ等のインフルエンザの救急予防及び治療のための緊急治療戦略を提供する一方で、代替的な、そして時間のかかるワクチン及び新薬の開発が進行中である。

サブユニットワクチンは潜在的に、従来の免疫原に勝る重要な利点を提供する。サブユニットワクチンは、従来の死菌又は弱毒化全病原体ワクチンの製造、配布及び配送特有の安全上の問題を回避する。さらにサブユニットワクチンは、承認された防御エピトープのみを含むように合理的に構成することができ、これにより、抑制 T エピトープ (Steward et al., J. Virol. 69:7668 (1995) 参照)、又は効果のない非保護反応 (例えば、「デコイ」エピトープ) を生じさせることによって免疫システムを破壊する、免疫優勢 B エピトープを回避する (Garritty et al., J. Immunol. 159:279 (1997) 参照)。

さらに、当業者は、多くの異なるウイルス、チャレンジ・ルートおよび動物モデルに対する生体外の抗体中和作用及び生体内での予防の間に良い創刊関係があることを認識する (Burton, Natl. Rev. Immunol. 2:706-13 (2002); Parren et al., Adv. Immunol. 77:195-262 (2001) 参照)。本明細書において示されるデータは、D 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0 及び H 9 8 ヒトモノクローナル交代を更に開発し生体内動物試験において試験して、インフルエンザの救急予防及び治療向けの良く効くウイルス侵入阻害剤としての臨床有用性を決定することができることを示している。

#### 【 0 0 6 6 】

##### ワクチンの抗体 - I g キメラ

第 1 抗体が、免疫システムに対する抗原決定基の効果的な提示のための骨格として使用されて 1 0 年以上がたつ (Zanetti, Nature 355:476-77 (1992); Zaghoulani et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92:631-35 (1995) 参照)。ペプチドが I g G 分子 (例えば本明細書において記載されている 1 1 A 又は 2 5 6 I g G 1 モノクローナル抗体) の一部部分として含まれるときに、ペプチド・エピトープの抗原性および免疫原性は遊離したペプチドと比較して非常に強化される。この種の強化は、おそらく抗原 - I g G キメラの、それらの自然構造を模倣するより長い半減期、より良い提示、及び拘束配座に起因する。

さらに、抗原 - I g キメラを使用することの更なる利点は、変数又は抗原 - I g キメラの F c 領域を使用して、プロフェッショナル抗原提示細胞 (A P C) のターゲティングすることができる。今までは、重鎖可変遺伝子 (V<sub>H</sub>) の相補性決定領域 (C D R) が B 又は T 細胞によって認識される様々な抗原ペプチドに置換される、組み換え I g が生成されてきた。この種の抗原 - I g キメラは、体液及び細胞免疫反応の両方を誘発するために

用いられてきた (Bona et al., Immunol. Today 19:126-33 (1998) 参照)。

#### 【0067】

C D R 3 ループに移植された特定のエピトープを有するキメラは、H I V - 1 g p 1 2 0 V 3 - ループ又はヒト C D 4 レセプタの第 1 の細胞外ドメイン ( D 1 ) に対する体液反応を誘導するために用いられてきた (Lanza et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:11683-87 (1993); Zaghouani et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92:631-35 (1995) 参照)。免疫血清により、H I V - 1 M N (抗 - g p 1 2 0 V 3 C) によって C D 4 S u p T 1 細胞の感染を予防する又はシンシチウム形成 (抗 - C D 4 - D 1) を阻害することが可能であった。C D R 2 及び C D R 3 は同時にペプチド・エピトープと置換することができ、挿入されるペプチドの長さは最大 1 9 アミノ酸長にもなり得る。

10

あるいは、あるグループは、ペプチド抗原が I g 一定の ( C ) 領域のループで提示され、キメラの可変領域を B 細胞の表層上の I g D 又は B 細胞、樹枝細胞 ( D C ) 及び大食細胞を含むプロフェッショナル A P C 上の M H C クラス II 分子をターゲティングするために用いることができる「troybody」戦略を開発した (Lunde et al., Biochem. Soc. Trans. 30:500-6 (2002) 参照)。

抗原 - I g キメラはまた、直接抗原を I g G 分子の F c 部分と融和させることによって生成することもできる。You et al., Cancer Res. 61:3704-11 (2001) は、この方法を使用して、非常に高いレベルの抗体から B 型肝炎ウイルス核抗原までを含む特定の免疫反応の全てのアームを得ることができた。

20

#### 【0068】

##### D N A ワクチン接種

D N A ワクチンは安定しており、抗原が自然に処理される機会を提供することができ、比較的長く続く反応を誘発することができる。非常に魅力的な免疫化戦略ではあるが、D N A ワクチンの免疫反応を誘発する効力はしばしば非常に限られている。例えば樹枝細胞 ( D C ) 等のプロフェッショナル A P C によって注入された D N A の取り込み不足が、上記限界の主な原因であり得る。抗原 - I g キメラ・ワクチンと組み合わせて、D C の表層上の F c レセプタ ( F c γ R ) の存在を利用する、A P C 抗原提示の促進に基づく有望な新規 D N A ワクチン戦略が報告された (Casares, et al., Viral Immunol. 10:129-36 (1997); Gerloni et al., Nat. Biotech. 15:876-81 (1997); Gerloni et al., DNA Cell Biol. 16:611-25 (1997); You et al., Cancer Res. 61:3704-11 (2001) 参照)。

30

抗原 ( A g ) - I g キメラをコード化する D N A ワクチンを生成することは可能である。免疫処置においては、D N A 分子を処理する細胞によって A g - I g 融合タンパク質が発現し、分泌される。分泌された A g - I g 融合タンパク質は、B 細胞反応を誘発すると共に、D C 表層上の F c γ R を有する F c フラグメントの相互作用によって捕獲され、取り込まれることが可能であり、これにより、効率的な抗原提示を増進し、抗原特有の免疫反応を大幅に促進する。機能性抗 M H C II 特異的 s c F v 領域遺伝子を担持している D N A コード化抗原 - I g キメラはまた、同じ原理を適用して、免疫原を A P C の全 3 種類にターゲティングすることもできる。免疫反応は、必要に応じて、生体外で生成される (すなわちプライム及びブースト) 同じタンパク質抗原を使用して、さらに促進することができる。この戦略を使用して、インフルエンザウイルスの感染に対する特定細胞及び体液の免疫反応は、D N A ワクチンの筋肉内 ( i . m . ) 注射によって達成された (Casares et al., Viral. Immunol. 10:129-36 (1997) 参照)。

40

#### 【0069】

##### ワクチン組成物

治療又は予防組成物は本明細書において提供されており、これらは一般に、一又は複数のモノクローナル抗体または S c F v の混合物及びこれらの組合せを含む。予防ワクチンは、インフルエンザウイルス感染を予防するために用いることができ、治療ワクチンは、インフルエンザウイルスに感染した人を治療するために用いることができる。予防的な使用には、ワクチンの接種対象者のインフルエンザウイルスに、増加した抗体価を供給することが含まれる。このように、インフルエンザにかかるリスクが高い被検体に、インフル

50

エンザウイルスに対する受動免疫を付与することができる。

これらワクチン組成物は、補助免疫調節剤とともに投与することができる。例えば、非限定的に I L - 2、変性 I L - 2 ( C y s 1 2 5 → S e r 1 2 5 )、G M - C S F、I L - 1 2、 $\gamma$ -インターフェロン、I P - 1 0、M I P 1  $\beta$ 、及び R A N T E S を含む、サイトカイン、リンフォカイン及びケモカインである。

#### 【 0 0 7 0 】

##### 免疫化の方法

本発明のワクチンは、他の抗ウイルス・ワクチンよりも優れた免疫保護及び免疫療法特性を有する。

本発明は被検体の免疫化、例えば免疫反応を誘発する方法を提供する。被検体は、病原体外膜ウイルスの膜融合タンパク質を含む組成物を被検体へ投与することによって、免疫化される。融合タンパク質は、生物学的に適合したマトリックスで覆われている又は埋め込まれている。

融合タンパク質はグリコシル化され、例えば糖鎖を含む。糖鎖は、単糖類、一又は複数の二糖類、一又は複数のオリゴ糖類、一又は複数の多糖類又はそれらの誘導体（例えばスルホ又はホスホ置換された）の形であってよい。炭水化物は、直鎖状である又は分岐している。糖鎖は、ポリペプチドに N 結合又は O 結合している。N - 結合グリコシル化はアスパラギン側鎖のアミド窒素へ、O - 結合グリコシル化はセリン及びトレオニン側鎖のヒドロキシ酸素へ結合している。

糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体に対し内在性である。あるいは、糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体に対し外生的である。糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体のポリペプチドに通常発現しない糖鎖である。例えば、炭水化物半分は、植物特異的な炭水化物である。植物特異的な糖鎖は、例えばコア結合  $\alpha$  1, 3 フコース又はコア結合 1, 2 キシロースを有する N - 結合型グリカンを含む。あるいは、糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体のポリペプチド又は脂質に発現する糖鎖である。例えば、多くの宿主細胞は、ヒト様糖付着子を有するヒトタンパク質を生成するために遺伝子操作が行われてきた。

#### 【 0 0 7 1 】

例えば、融合タンパク質は、三量体赤血球凝集素タンパク質である。任意に、赤血球凝集素タンパク質は、例えば植物細胞等の非哺乳類細胞において生成される。被検体は、ウイルス感染症を発症する又はウイルス感染症に苦しむ危険にさらされている。外膜ウイルスは例えば、エプスタイン・バーウイルス、単純疱疹ウイルス、1 及び 2 型、ヒトサイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、8 型、水痘帯状疱疹ウイルス、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、インフルエンザウイルス、はしかウイルス、耳下腺炎ウイルス、パラインフルエンザウイルス、呼吸器合胞体ウイルス、狂犬病ウイルス及び風疹ウイルスを含む。本明細書に記載した方法により、ウイルス感染の一又は複数の症状の重症度が軽減又は緩和される。感染症は、標準的な手順を使用する医師によって診断される及び又は監視される。予防接種が必要な被検体は、当技術分野で公知の方法によって識別される。例えば、被検体には、C D C の General Recommendation on Immunization ( 51 ( R R 0 2 ) pp1-36 ) に概説されているように予防接種が行われる。癌は例えば物理的な試験、生検、血液検査または X 線によって診断される。被検体は例えば、全ての哺乳類、例えばヒト、霊長類、マウス、ネズミ、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ブタ、魚または鳥である。処置は、感染症の診断の前に行われる。あるいは、処置は診断後に行われる。

処置の効果は、特定の障害または感染症を診断する又は治療する全ての公知の方法に関連して決定される。障害の一又は複数の症状の緩和は、化合物が臨床的利点をもたらすことを示す。

#### 【 0 0 7 2 】

##### ワクチンの可能性のための抗原性タンパク質フラグメント ( A P F ) の評価

体液性免疫を標的とするワクチン候補は、少なくとも 3 つの基準を満たさなければ成功

しない：強い抗体反応（「免疫原性」）を引き起こさなければならない；それが引き起こす抗体の重要なフラグメントは、病原体（「免疫原性適合性」）と交差反応しなければならない；それが引き起こす抗体は、保護するものでなければならない。免疫原性が佐剤又は担体を使用してしばしば促進可能である一方で、免疫原性適合性及び（中和によって明白なように）保護を誘導する能力は、ワクチン構成要素としてのその抗原の成功を最終的に決定する抗原の固有特性である。

#### 【 0 0 7 3 】

##### 免疫原性適合性の評価

「免疫原性適合性」は、病原体と交差反応する抗原によって誘導される抗体の一部として定義される（Matthews et al., J. Immunol. 169:837 (2002)参照）。これは、病原体と交差反応しない抗体を含む抗原によって誘導された全ての抗体の力価によって測定される免疫原性とは別のものである。不十分な免疫原性適合性は、おそらく今までペプチド・ワクチンの期待外れの実績に寄与してきた。抗体に高い親和性で結合し、高い抗体価を引き出すペプチドはしばしば十分な免疫原性適合性に欠くため、見込みのあるワクチン構成要素としては不合格である。したがって、インフルエンザ・ワクチン候補を選ぶ基準の一つとして、免疫原性適合性を含むことは重要である。

低い免疫原性適合性の一般的な理由は、一番短いペプチドの立体配座の柔軟性である。具体的には、可撓性ペプチドは、患者からの抗体と良好に結合することができ、未投与の被検体において実質的な抗体価を導き出すことができる。しかしながら、ペプチドが多数の配座のレパートリを有する場合、それが未投与の被検体に引き起こす抗体の優位により、完全な病原体上の対応するネイティブエピトープと交差反応できない可能性がある。

短いペプチドのように、ある A P F は非常に可撓性である可能性があり、従って、ワクチンの構成要素としてはふさわしくない。最も免疫原的に適切な A P F は、総タンパクの状況とは別に本質的に拘束されている自己折りたたみ型タンパク質サブドメインで構成される傾向にある。免疫原性適合性は主に A P F 自体のものであって、反応する免疫システムのものではないため、最終的には A P F はヒトにおいて作用しなければならないが、動物モデル（例えばマウス）において免疫原性適合性を評価することが可能である。

#### 【 0 0 7 4 】

A P F によって達成される免疫原性適合性は、Matthews et al., J. Immunol. 169:837 (2002)に記載されたものに類似した手順で、精製されたスパイクまたは膜タンパク質を有する抗 A P F 血清の免疫吸収によって評価される。I g G は、予防接種をされたマウスから採取された血清から精製される。精製され、ビオチン化されたタンパク質（マウスが予防接種された特定の A P F により必要に応じて）は、マウスの I g G と混合されて、培養される。ストレプトアビジンでコーティングされた十分な量のセファロースビーズが次に添加され、全ての結合 I g G とともに、ビオチン化されたタンパク質を全て捕捉する。ストレプトアビジンでコーティングされたビーズは、それぞれ、タンパク質に対する抗体が枯渇された I g G を残す、マイクロ遠心分離機において 13, 000 r p m の遠心分離によって除去される。偽免疫吸収は、ビオチン化された B S A が偽吸収剤としてインフルエンザ・タンパク質と置換される以外は、同じように平行して行われる。

A P F の免疫原性適合性を測定するために、吸収された抗体および偽吸収された抗体は、免疫 A P F に対する E L I S A において並んで滴定される。ファージ提示 N P L から選択される A P F の親和性については、これら E L I S A の抗原が、精製された A P F - G S T 融合タンパク質となる。哺乳類細胞提示 N P L からの潜在的にグリコシル化された A P F については、これら E L I S A の抗原が、哺乳類細胞によって分泌され、プロテイン A によって精製された A P F - F c 融合タンパク質となる。偽吸収された抗体と比較して、吸収された抗体の抗 A P F 滴定量の減少率により、A P F の免疫原性適合性の量が得られる。

#### 【 0 0 7 5 】

##### 治療方法

本発明は、インフルエンザウイルス関連の疾患または障害の（又はこれに感染しやすい

）危険にさらされている被検体を治療する、予防的及び治療的な方法の両方を提供する。例えば、この種の疾患または障害は、鳥インフルエンザを含むが、これに限定されるものではない。

#### 【0076】

##### 予防方法

一態様では、本発明は、本発明のモノクローナル抗体又はs c F v抗体、あるいは本発明の方法にしたがって識別された薬剤を投与することによって、被検体のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害を予防する方法を提供する。例えば、s c F v及び/又はモノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90及びH98の治療上有効量を投与することができる。任意には、2つ以上の抗インフ

10

ルエンザ抗体が同時投与される。  
インフルエンザウイルス関連の疾患または障害の危険にさらされている被検体は、感染者と接触した患者、又は、何らかの他の方法でインフルエンザウイルスにさらされた患者を含む。予防薬剤の投与は、インフルエンザウイルス関連の疾患または障害に特有の症状の徴候が現れる前に行うことができ、これにより、疾患または障害が予防される、又は、その進行が遅らされる。

適切な薬剤は、本明細書に記載されているスクリーニング分析に基づいて決定することができる。代わりに又は加えて、投与される薬剤は、本発明の方法に従って識別されたインフルエンザウイルスを中和するs c F v又はモノクローナル抗体である。

20

#### 【0077】

##### 治療方法

本発明の別の態様は、患者のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害を治療する方法に関連する。一実施形態では、この方法には、疾患または障害を患っている患者に、インフルエンザを中和する薬剤（例えば、本明細書に記載されているスクリーニング分析によって識別される薬剤及び/又は本発明の方法に従って識別されるs c F v抗体又はモノクローナル抗体）又は薬剤の組合せを投与することが含まれる。

#### 【0078】

##### 組み合わせ方法

本発明は、例えばHAタンパク質の同じエピトープと結合するD7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90及びH98等の2つ以上の抗体を投与することによって、患者のインフルエンザ関連の疾患又は障害（例えば鳥インフルエンザ等）を治療することを提供する。

30

#### 【0079】

本発明は、請求項に記載されている本発明の範囲を制限しない以下の実施例において更に説明される。

#### 【実施例】

#### 【0080】

##### 実施例1：一般的な方法

ファージ提示抗体ライブラリの選択のための様々なパニング抗原の発現及び調製

HA1 HA1は(A/Thailand/2(SP-33)/2004(H5N1)のN末端フラグメント(aa17-338)である。遺伝子は、コドン最適化し、C末端9アミノ酸タグ(C9-タグ:GETSQVAPA)を有する融合タンパク質として発現させた。融合タンパク質HA1-C9は、293T細胞において一時的に発現させ、分泌されたタンパク質は親和性クロマトグラフィによって上澄みから精製した。HA1-C9の精製のために、抗C9抗体1D4(国立細胞培養センター)に共有結合的に結合するプロテインAセファロースを使用した。

40

三量体HA0 前述したプロトコル<sup>33</sup>を適応させることにより、A/Viet Nam/1203/2004の赤血球凝集素(HA)遺伝子の細胞外ドメイン(HA0)を昆虫細胞において融合タンパク質として発現させた。このコンストラクトは三量体化構造を安定させるためのバクテリオファージT4フィブリチンからのC末端三量体化「フォールド

50

ン」シーケンスと、その後にトロンピン・サイト及びHis6タグを含む。融合タンパク質のcDNAは、バキュロウイルス移入ベクター、pAcGP67A（マサチューセッツ州ベッドフォードのBDバイオサイエンス社）にクローニングし、組み換えタンパク質の効率的な分泌を可能とした。 $9 \times 10^6$ 細胞は、ウイルス株によって感染した。感染3日後に細胞を沈降させ、そして、上澄みは6mlのNi-NTAビーズ（カリフォルニア州バレンシアのQiagen社）で培養した。ビーズは、10mMのイミダゾールを有するTBS緩衝液（10mMのTris・HCl / 80mMのNaCl、pH8.0）で洗浄し、250mMのイミダゾールを有するTBSによって溶出させた。溶出させたHA5タンパク質は、TBS緩衝液で透析処理して、Mono Q HR10 / 10カラム（ニュージャージー州ピスカタウェイのGEヘルスケア社）を使用したイオン交換によって更に精製した。精製したHA5を終夜トロンピンによって消化させた。HA0三量体の完全性及び性質は、ゲル濾過（Superdex 200カラム）及びSDS-PAGEを使用して調べた。

#### 【0081】

ファージ抗体ライブラリの選択及びH5に対する抗体のスクリーニング

57人のワクチン接種を受けていない提供者のB細胞から構成される2つのヒト非免疫性scFvライブラリ（合計 $2.7 \times 10^{10}$ メンバー）を、精製されたHA1又は三量体HA0に対するscFvsの選択のために用いた。各々のライブラリから調製される $5 \times 10^{11}$ pfuのファージ-scFvsを、別々に、10 $\mu$ gのHA1又はHA0でコーティングされたイムノチューブ（イリノイ州ネーバービルのアムンク社）で培養した。選択手順は前述したのと同じであった。選択手順を2回繰り返した後で、ランダムに選択した単一のファージ-scFvクローンを前述したように、酵素免疫吸着法（ELISA）によってHA1又はHA0への特異結合のためにスクリーニングした。 $> 1.0$ の $A_{450}$ 値を有するHA1又はHA0と結合したクローンは陽性として記録し、その一方で負のクローンの値は $< 0.1$ であった。HA1又はHA0特異結合クローンについては、重鎖（VH）及び軽鎖（VL）の可変領域の遺伝子を配列決定し、それらの対応するアミノ酸配列は、抗体を更に特徴づけするために異なる配列で識別するように整列配置した。

#### 【0082】

可溶性scFv-Fcs及び完全長ヒトIgG1の発現及び精製

ファージ・ライブラリを作製するのと同じ方法を使用して、中和分析のために個々のクローンのファージ-scFvsを生成した。ファージ粒子は、PEG/NaCl沈殿を利用して25倍に濃縮した。前述したように、scFv-Fcs及び完全ヒトIgG1sを生成した。簡単に言うと、選択されたscFvsを、scFvを、ヒトIgG1のCH2及びCH3領域を含むが、CH1を欠くヒンジを含むFc発現ベクターpcDNA3.1-Hingeへサブクローニングすることによって、scFv-Fcsへ変換した。完全ヒトIgG1については、scFvのVH及びVL遺伝子のフラグメントを、ヒトIgG1カップ軽鎖又はラムダ軽鎖発現ベクター、TCAE5又はTCAE6へ別々にサブクローニングした。scFv-Fcs又はIgG1は、一時的な移入によって293T又は293F細胞（インビトロゲン）において発現させ、タンパク質Aセファロース親和性クロマトグラフィによって精製した。

#### 【0083】

表層プラズモン共鳴（SPR）分析

組み替え型HA0（VietNam1203/04）三量体に結合するH5 HA Mabsの動態分析を、Biacore T100（Biacore）上で25で行った。抗ヒトIgG Fc抗体（Biacore）を、アミン結合キット（Biacore）を使用して、アミン結合によってCM4センサチップの個々のフローセル表面に、共有結合的にコーティングを施した。HA Mabを、Mab-HA0結合が均一の1:1ラングミュア相互作用として行われるように、HBS緩衝液（Biacore）において10ul / 分の流動率で抗ヒトIgG Fc表面上で捕捉させた。HA0は、HBS緩衝液において30ul / 分の流動率、及び0.31 ~ 20nMの範囲の濃度で、各フローセルを通

10

20

30

40

50

して注入した。緩衝注射は、負の制御として機能した。全ての実験には付加的な抗ヒト Ig G F c 抗体コントロール表面を含め、緩衝屈折指標の変化を考慮し、また H A 0 と抗ヒト Ig G F c の間の潜在的な非特異性相互作用を検査した。各々の会合及び解離サイクルが完成したときに、表層は、3 M M g C l<sub>2</sub> 溶液によって再構成した。会合速度 (k a)、解離速度定数 (k d) 及び親和定数 (K D) は、B i a c o r e T 1 0 0 評価用ソフトを使用して算出した。各適合度は、実験データ及び算出された適合との一致に基づいており、ここで、C h i<sup>2</sup> 値は 1.0 未満であった。H A 0 に対する M a b の表面密度は、質量移動を最小限に抑え、親和効果の寄与を完全になくすために最適化された。本明細書で報告される全ての k a、k d、K D は、3 つの実験の手段及び標準誤差を表す。

【0084】

#### ウイルス及び細胞

A / A n n A r b o r / 6 / 1 9 6 0 ( H 2 N 2 ) の低温適応ワクチン株だけでなく、野生型インフルエンザ A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ; H 5 - V N 0 4 ) 型、A / H o n g K o n g / 4 8 3 / 1 9 9 7 ( H 5 N 1 ; H 5 - H K 9 7 ) 型、A / N e t h e r l a n d s / 2 1 9 / 2 0 0 3 ( H 7 N 7 ; H 7 - N L 0 3 )、及び A / O h i o / 4 / 1 9 8 3 ( H 1 N 1 ; H 1 - O H 8 3 ) ウイルスは、W H O 世界インフルエンザサーベイランスネットワークから入手し、アレキサンダー・クリモフ氏 (米国アトランタの C D C ) によって提供された。H 1 - P R 3 4 及びメイディン・ダービー犬の腎臓 (M D C K) 細胞は、アメリカ合衆国培養細胞系統保存機関から入手し、10% のウシ胎仔血清を有するダルベッコ変法イーグル培地において増殖させた。ウイルスの感染力は、M D C K 細胞のプラーク分析で判定した。活野生 H 5 N 1 型ウイルスは、米国農務省の選択物質プログラム (<http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmb15/bmb15toc.htm>) によって要求される強化を含む、バイオセーフティレベル 3 の格納容器内で取り扱った。

【0085】

#### H A - 偽型ウイルスの中和分析

##### プラスミド及びコンストラクト

A / T h a i l a n d / 2 ( S P - 3 3 ) / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) の全長 H A 遺伝子、H 5 - S P 3 3、及び A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 2 0 0 4 のノイラミダーゼ遺伝子、N 1 をコドン最適化し、p c D N A 3 . 1 ベクトルへクローン化して、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3 及び p c D N A 3 . 1 - N 1 発現プラスミドを別々に生成した。p C A G G S - H 1 ( S C ) プラスミドコード化 A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1 9 1 8 ( H 1 N 1 ) 全長 H A タンパク質は、P . P a l e s e 博士 (米国シナイ山医学部) によって、好意で提供された。p C A G G S - H 1 ( P R ) プラスミドコード化 A / P u e r t o R i c o / 8 / 3 4 ( H 1 N 1 ) H A タンパク質は、M . F a r z a n 博士 (米国ハーバード・メディカル・スクール) からの寛大な贈り物である。

【0086】

#### H A - 偽型ウイルスの生成

H 5 - S P 3 3、H 1 - S C / 1 9 1 8 又は H 1 - P R / 3 4 によって偽型化された H 5 N 1 又は H 1 N 1 の single-round H I V 発光酵素リポータ・ウイルスを、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、H I V - 1 G a g - P o l をコードする H I V パッケージ化ベクター p C M V Δ R 8 . 2<sup>57</sup>、H I V - 1 L T R 制御下に H I V - 1 ホタル・ルシフェラーゼリポータ遺伝子をコードするトランスファベクター p H I V - L u c、発現プラスミド p c D N A 3 . 1 - N 1 の 4 つのプラスミドによる 2 9 3 T 細胞の同時移入により作製した。36 時間の移入後に、ウイルス上澄みを採取し、4 で保管した。

【0087】

#### 中和分析

細胞を導入する前に、H 1 - S C / 1 9 1 8 又は H 1 - P R / 3 4 F 偽型ウイルスのウイルス上澄みを、16 μ g / m L の T P C K 処理トリプシンで 25 で 1 時間培養し、次に 1 : 1 ( V / V ) の比率のトリプシン中和溶液 (TNS、Cambrex) で中和した。試験抗体又は血清は、R T において 30 分間、十分な量の H 5 - S P 3 3 偽型又はトリプシン処

10

20

30

40

50

理 H 1 偽型ウイルスで培養した。混合物はその後、96 ウェルプレートの 293 T 細胞に加えて、48 時間培養を継続した。ウイルス侵入レベルは、マイクロプレート照度計で標的細胞のルシフェラーゼ活性を測定することによって評価した。

#### 【0088】

抗体 8、10 及び 66 のエピトープ・マッピング

プラスミド及びコンストラクト p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、p C A G G S - H 1 ( S C ) 及び p C A G G S - H 1 ( P R ) は、上に説明したのと同様である。A / F P V / R o s t o c k / 3 4 ( H 7 N 1 ) の H A タンパク質をコード化する p C A G G S - H 7 ( F P V ) は、X . ヤン博士 ( ベス・イスラエルディーコネス医療センター ) によって、好意的に提供された。p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3 又は p C A G G S - H 7 ( F P V ) の変異体は全て、QuikChange 方法 ( ストラタジーン ) によって作製した。抗 H 5 抗体の H A 発現細胞への結合のフローサイトメトリー分析である。H 1、H 5 又は H 7 のプラスミドを発現している様々な完全長野生型 H A 及び H A 変異体を、293 T 細胞に一時的に移入した。移入の 48 時間後に、抗 H 5 抗体 ( 10  $\mu$ g / ml ) は 4 において、移入された 293 T 細胞と共に 1 時間培養した。次に細胞を、0 . 5 % の B S A 及び 0 . 1 % の N a N 3 を含む P B S で 3 回洗浄した。H A 移入細胞に結合する抗 H 5 抗体を検出するために、F I T C 標識ヤギ抗ヒト I g G ( ピアス ) を第 2 の抗体として使用して、細胞とともに 30 分間 4 で培養した。細胞を上記したように再度洗浄し、CellQuest ソフトウェアを有する Becton Dickinson FACScaliber with CellQuest software を使用して分析した。

#### 【0089】

マイクロ中和分析

本方法は、前述したように<sup>48</sup>行った。簡単に説明すると、ウイルスの T C I D<sub>50</sub> ( 半組織培養感染量 ) を、96 - ウェル組織培養プレートにおいて等しい容量の抗体貯蔵液 ( 1 mg / ml ) の log<sub>2</sub> 希釈剤と混合し、37 で 1 時間培養した。指示薬 M D C K 細胞 ( 1 . 5  $\times$  10<sup>4</sup> 細胞 / ウェル ) をプレートに加えて、37 で 20 時間で培養した。エンドポイントを確立するために、細胞単分子層を次に、アセトンに固定された P B S で洗浄し、ウイルス抗原をインフルエンザ A 型 N P ( A - 3、Accurate ) に対する m A b を有する間接的な E L I S A によって検出した。

#### 【0090】

ブランク減少分析

A / V i e t N a m 1 2 0 3 / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) 又は A / N e t h e r l a n d / 2 1 9 / 0 3 ( H 7 N 7 ) ウイルス ( 10 , 000 p f u ) を、抗 H 5 s c F v - F c s で、37 で 30 分間、3 つの異なる濃度 100  $\mu$ g / ml、10  $\mu$ g / ml 及び 1  $\mu$ g / ml で培養した。ウイルス - 抗体混合物を、12 - ウェルプレートの M D C K 細胞単分子層に移して 37 で 1 時間培養し、その後細胞を洗浄し寒天で覆った。4 日間の培養後に寒天の覆いを廃棄し、斑をクリスタル・バイオレットに染色して視覚化した。

#### 【0091】

赤血球凝集阻止 ( H I ) 分析

鳥インフルエンザウイルスは、優先的に N - アセチルノイラミン酸  $\alpha$  2 , 3 - ガラクトース (  $\alpha$  2 , 3 G a l ) を含むシアル酸レセプターと結合するが、ヒトウイルスは優先的に N - アセチルノイラミン酸  $\alpha$  2 , 6 - ガラクトース (  $\alpha$  2 , 6 G a l ) 結合を含むシアル酸レセプターと結合する。レセプター特性の分子基礎は、ウイルス H A の複合的な残留物でおそらく測定される。赤血球凝集阻止 ( H I ) 試験は、インフルエンザ赤血球凝集素に対する抗体反応を評価する、単純で広く使われている方法である。スティーブンソン氏は、ウマ赤血球を使用することにより、結合に利用可能な  $\alpha$  2 , 3 G a l 結合の比率を増やすことによって、赤血球凝集分析の感度が改善されたと報告している。加えて、H I 分析の滴定濃度は、マイクロ中和分析の滴定濃度と良好に相関した。偽型ウイルスは、説明したようにウマ赤血球の赤血球凝集を使用して、最初に滴定される。最初のハイスループットスクリーニングは同様に、ウマ赤血球懸濁液を使用し、滴定された H 5 / N 1 ウイ

10

20

30

40

50

ルスのH Iエンドポイントを阻害するファージ抗体の能力を分析することによって行われる。H 5 N 1 リポータ・ウイルス侵入及びH Iを抑制するためのより詳細な第2のスクリーニングは、一時的に移入された2 9 3 T細胞によって生成したタンパク質Aビーズによって精製された可溶s c F v F cタンパク質で用量反応研究を使用して行われる。

#### 【0092】

##### ウイルス結合抑制分析

0.5 × 10<sup>6</sup>の2 9 3 T細胞を、抗H 5 m A b、コントロールm A bの存在下、または抗体のない状態で、H 5 - T H 0 4 - 偽型H I Vウイルス(p 2 4のおよそ5 0 0 n g)とともに、0.5%のB S A及び0.02%のN a N<sub>3</sub>を含むP B S緩衝液において4で培養した。1時間培養した後に、細胞を遠心沈殿させた。上澄みを採取して、H I V - 1 p 2 4<sup>C A</sup>捕捉E L I S Aキット(N C I、フレデリック、N I H)を使用し、未結合のウイルスを定量化した。細胞を次に1又は2回洗浄して、同様の方法を使用して細胞結合ウイルスを定量化するために溶解した。

10

#### 【0093】

##### 細胞融合抑制分析

(6つのウェルプレートにおいて融合性が最高90%の)2 9 3 T細胞に、リポフェクタミン2 0 0 0(インビトロゲン)を使用して4:1の比率(D N A / ウェル合計3 µ g)で、p c D N A 3.1 - H 5 - T H 0 4 プラスミド及びp c D N A 3.1 - N 1を移入させた。トランスフェクションの6時間後に培養基に1 m lの抗H 5、制御又は模擬m A b sを追加し、細胞を3 6時間培養した。細胞を位相差顕微鏡でシンシチウム形成について観察した。顕微鏡写真は1 0 xの倍率で撮影した。

20

#### 【0094】

##### パニングのための様々なH Aタンパク質の発現及び調製

H A 1は、H 5 N 1 A / T h a i l a n d / 2 ( S P - 3 3 ) / 2 0 0 4 ( H 5 - T H 0 4 )のH AのN末端フラグメントであり、残留物は1 1 ~ 3 2 5である(H 3ナンバリング)。遺伝子をコドン最適化して、C末端9アミノ酸タグ(C 9 - タグ: G T E T S Q V A P A)を有する融合タンパク質として発現させた。融合タンパク質H A 1 - C 9を一時的に2 9 3 T細胞において発現させ、トランスフェクションから4 8時間後に上澄み中の分泌タンパク質を回収し、抗C 9抗体1 D 4(国立細胞培養センター)と共有結合的に結合したタンパク質Aセファロースを使用した親和性クロマトグラフィーによって上澄みから精製した。H 5 - V N 0 4のH A 0タンパク質を生成する方法は、furin-開裂のためのbaculovirus重感染がない以外は、下記に記載するH 5 - F 1 0複合体の結晶化の方法と同様である。

30

#### 【0095】

##### E L I S A

0.2 µ gの純粋なH 5 H Aタンパク質を2 µ g / m l含むP B Sにて9 6ウェルM a x i s o r b E L I S Aプレート(Nunc, NY)を4で終夜をかけてコートした。プレートをP B Sにて3回洗浄し、コートしていないタンパク質を除去した。通常のE L I S Aのために、1 µ g / m lの抗H 5 s c F v - F cの後にH R P - 抗ヒトI g G 1を用いて、H 5 H Aタンパク質への抗H 5 s c F v - F cの結合を検出した。競合E L I S Aのために、5 0 µ L (1 0<sup>-12</sup> p f u)の抗H 5 ファージ - s c F vを、5 µ g / m lの抗H 5 s c F v - F cと混合し、H 5 - V N 0 4 H AコートE L I S Aプレートに適用した。H A 0に対するファージ - s c F vの結合についてのs c F v - F cの競合は、H R P - 抗M 1 3を用いたファージ - s c F vの残りの結合を測定することによって決定した。ペルオキシダーゼテトラメチルベンジジン(T M B)基質システム(KPL, Gaithersburg MD)の培養の後に4 5 0 n mの光学濃度を測定した。

40

#### 【0096】

##### H 5 - F 1 0複合体の発現、精製および結晶化

単鎖(V H - リンカー - V L)F 1 0(s c F v)をコードする遺伝子を、N末端周辺質分泌シグナルp e l BおよびC末端6 x H i s タグを含むp S y n Iベクターにクローニン

50

グした。F 1 0 s c F v は、0 . 5 m M の I P T G と 1 5 時間おき、2 5 の 0 . 1 % グルコース(w / v)を含む 2 Y T 培地中で X L 1 0 細胞において発現させた。タンパク質は、始めに製造業者の指示に従って H i s b i n d N i - N T A (Novagen)にて、次いで 5 0 m M トリス-H C l、0 . 5 M N a C l、p H 8 の S u p e r d e x 2 0 0 (Amersham Biosciences)にて精製した。

既に記載されているプロトコール 6 を用いて、H 5 - V N 0 4 H A 遺伝子の外部ドメインを融合タンパク質として昆虫細胞において発現させた。このコンストラクトは、三量体構造を安定させるためのバクテリオファージ T 4 フィブリチンの C 末端三量体形成「f o l d o n」配列と、その後にトロンピン部位および H i s 6 タグを含む。融合タンパク質の c D N A を、バキュロウイルス導入ベクターである p A c G P 6 7 A (BD Biosciences, Bedford, MA)にクローニングし、組み換えタンパク質を効率よく分泌させた。十分に切断された H A (H A 1 - H A 2 三量体)を得るために、s f 9 細胞を、経験的に得られた比率の H A 0 およびフューリンのバキュロウイルス系統と共に同時感染させた。フューリン c D N A は、Dr. Robert Fuller (University of Michigan)からの贈り物であった。感染の 3 日後に、細胞を遠心にかけ、上清を N i - N T A ビーズ(Qiagen Inc., Valencia, CA)と共にインキュベートした。ビーズは、1 0 m M イミダゾールを有する T B S バッファ(1 0 m M T r i s . H C l、8 0 m M N a C l、p H 8 . 0)にて洗浄し、2 5 0 m M イミダゾールを有する T B S にて溶出した。溶出した H 5 タンパク質は、T B S バッファに対して透析し、さらに M o n o Q H R 1 0 / 1 0 カラム(GE Healthcare, Piscataway, NJ)を用いたイオン交換によって精製した。精製された H 5 は終夜をかけてトロンピンによって消化させ、さらに T B S バッファの S u p e r d e x 2 0 0 カラムにて精製した。

H 5 - F 1 0 複合体は、2 つの精製した構成成分を混合することによって形成され、T B S バッファの S u p e r d e x 2 0 0 にて単離した(補足図 1 b)。ピークの分画をプールし、およそ 1 1 m g / m l に濃縮した。H 5 三量体の完全性は、ゲルろ過法(S u p e r d e x 2 0 0 カラム)および S D S - P A G E を用いて調べた。結晶は 2 2 の懸滴蒸気拡散法にて大きくした。2  $\mu$  L の H 5 - F 1 0 を、等しい体積の 1 2 . 5 % P E G 1 K、2 5 % エチレングリコール、1 0 0 m M トリス、p H 8 . 5 と混合した。結晶は液体窒素にて急速冷凍し、データ採取した。

#### 【 0 0 9 7 】

H 5 - F 1 0 複合体の共結晶化

H 5 - F 1 0 の共結晶化のために、F 1 0 を大腸菌において発現させ、N i - N T A およびゲル濾過によって精製した。H 5 は、H 5 及びフューリンバキュロウイルス系統の共感染により s f 9 細胞において発現させ、N i - N T A、陰イオン交換およびゲル濾過クロマトグラフィにて精製した。H 5 - F 1 0 複合体は、H 5 を過剰量の F 1 0 と混合することによって得、ゲル濾過にて単離した。結晶は、2 2 の懸滴蒸気拡散法を用いて、2  $\mu$  L の複合体(およそ 1 1 m g / m l)を、等しい体積の 1 2 . 5 % P E G 1 K、2 5 % エチレングリコール、1 0 0 m M トリス、p H 8 . 5 と混合することによって大きくした。結晶構造は、分子置換(M o l e c u l a r R e p l a c e m e n t)による 3 . 2 分解能で測定し、優れた幾何学を有する 0 . 2 9 の R<sub>F R E E</sub> に精密化した。

#### 【 0 0 9 8 】

データ採取、構造決定および分子構造精密化

X 線回折データは、Stanford Synchrotron Radiation Laboratory(S S R L)ビームライン 7 . 1 および 9 . 2 で採取した。データは、X D S<sup>7</sup> および H K L 2 0 0 0 パッケージにて処理した。

H 5 - F 1 0 複合体の構造は、探索モデルとして、H 5 (A / V i e t n a m / 1 1 9 4 / 0 4 ; P D B コード 2 I B X)の構造と S A R S n A b 8 0 R (P D B コード 2 G H W)の s c F v 構造を使用した P H A S E R による分子置換によって測定した。s c F v 構造相同モデルを W H A T I F 9 にて構築した。非対称性ユニットは 2 つの H 5 三量体および 6 つの F 1 0 分子を含む。

分子置換の溶液は、C o o t および X t a l v i e w による手動モデル再構築と C N S

における模擬アニーリングを有するプログラム R E F M A C 5 による数ラウンドの分子構造精密化に用いた。最終モデルは、6つの H A コピーについてそれぞれ 5 0 6 / 5 0 3 / 5 0 3 / 4 9 6 / 4 9 5 / 4 9 6 残基、各 n A b 1 0 について 2 3 3 残基、24の N - アセチル - d - グルコサミンおよび 6 β - d - マンノース、0の水分子を含む。幾何学的なパラメータは、P R O C H E C K および R a m p a g e にて評価した。

#### 【 0 0 9 9 】

H 5 に対する h M a b によるマウスの保護

すべてのマウス実験は、C D C 動物保護と使用委員会にて承認されるプロトコールに従って、U S D A および C D C 公認の生物学的安全性レベル 3 ( B S L 3 ) 動物施設において実施した。雌 8 ~ 1 0 週齢の B a l b / C マウス ( 1 群につき 5 匹 ) をすべての実験に用いた。すべての群について、マウスを 2 週間観察し、加重させ、死亡を毎日確認した。

予防的マウス研究。 1 0 m g / k g および 2 . 5 m g / k g <sup>5 3</sup> の 2 用量の 3 つの h M a b ( D 8 - I g G 1、F 1 0 - I g G 1 および A 6 6 - I g G 1 ) 又はコントロール h M a b 8 0 R - I g G 1 をマウスの腹膜内に投与した ( i . p . ) 。 h M a b 投与の 2 4 時間後に、すべてのマウス群を、軽い麻酔下で、1 0 M L D <sub>5 0</sub> ( 5 0 % のマウス致死量 ) ウイルス用量の A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 ( H 5 N 1 ) 又は A / H K / 4 8 3 / 9 7 ( H 5 N 1 ) を鼻腔内投与 ( i . n . ) することにより抗原刺激した。

治療的マウス研究。 マウスは、始めに A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 ( H 5 N 1 ) 又は A / H K / 4 8 3 / 9 7 ( H 5 N 1 ) の 1 0 M L D <sub>5 0</sub> にて i . n . 感染させた。次いで、1 0 m g / k g の H 5 に対する 3 つの h M a b またはコントロール h M a b を、A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 ( H 5 N 1 ) 感染の 2 4、4 8 および 7 2 時間後にマウスに腹腔内投与した。A / H K / 4 8 3 / 9 7 ( H 5 N 1 ) 感染マウスでは、h M a b をウイルス抗原刺激の 2 4 時間後にのみ注入した。

#### 【 0 1 0 0 】

抗 H 5 ファージ抗体の同定。

H A 1 に対する抗体。 精製した組み換え H A 1 を用いて、2つの非免疫性ヒト s c F v ライブラリから別々に抗体を選択した。H A 1 について 2 ラウンドの選別の後、E L I S A によってスクリーニングされた 9 6 のうち 5 8 のクローンは、H A 1 特異的なポジティブクローンであった。5 8 の H A 1 ポジティブクローンの配列決定分析によって、3つの固有の抗 H A 1 s c F v が同定された ( 3 8 B および 1 C ) 。同種の選別およびスクリーニング実験を繰り返した。新規なクローンは同定されなかったが、上記と同じ 3 つの s c F v が得られた。2 A のアミノ酸配列を図 4 に示す。

H 5 の外部ドメイン ( H A 0 ) に対する抗体。 精製した組み換え三量体 H A 0 を用いて、H A 1 について使用したのと同じ抗体ライブラリを選択した。H A 0 について 2 ラウンドの選別の後、E L I S A により、H A 0 特異的結合について合計 3 9 2 のクローンがスクリーニングされた。9 7 のクローンは H A 0 タンパク質を特異的に認識した。配列分析によって 1 0 の固有の抗 H A 0 s c F v ( 7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 および 9 8 ) が同定された。6 の異なる V H と 1 0 の異なる V L 遺伝子が明らかとなった (いくつかの s c F v は同じ V H 遺伝子を共有していた)。6 のうち 5 の異なる V H は、一つの遺伝子ファミリー、I G H V 1 - 6 9 に属する。V L 遺伝子は V H 遺伝子より非常に多様であり、1 0 のうち 3 つの V L はカップ鎖である。(図 4)。

#### 【 0 1 0 1 】

確実な単回ラウンドレポーターウイルスシステムの確立

H 5 - S P 3 3、H 1 - S C / 1 9 1 8 又は H 1 - P R / 3 4 によって偽型化した H 5 N 1 又は H 1 N 1 の単回ラウンド H I V ルシフェラーゼレポーターウイルスは、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、H I V - 1 G a g - P o l をコードする H I V パッケージベクター p C M V R 8 . 2、H I V - 1 L T R のコントロール下にホタルルシフェラーゼレポーター遺伝子をコードしている導入ベクター p H I V - L u c、及び発現プラスミド p c D N A 3 . 1 - N 1 である 4 つのプラスミドにより 2 9 3 T 細胞を共形質移入することによって作製した。形質移入の 3 6 時間後、ウイルス上清を回収し、4 に保存した。H A

10

20

30

40

50

0 偽型ウイルスの力価は293T細胞を感染させて、測定した。偽型ウイルスを作製する形質移入においてN1発現プラスミドを含めることにより、H5偽型ウイルスの力価が劇的に増加しうる。H5偽型ウイルスの適切な行動はH5N1(A/Viet Nam/2004)に対するフェレット免疫血清を使用して調べた。これらのウイルスは抗血清によって強力に中和されうるが、出血前(pre-bleeding)血清によっては中和されない。ゆえに、中和抗体の効率的なスクリーニングのために、確実な単回ラウンド高効率レポーターウイルスシステムが確立した。

#### 【0102】

実施例2：H5-S P 3 3により偽型化されたウイルスを用いたH5N1に対する中和抗体の同定とマイクロ中和アッセイ

偽型化されたウイルスを用いた中和アッセイの結果。

抗H5抗体の二価のscFvFcを産生し、HA0-偽型ウイルスに対する中和活性について試験した。我々は、2Aが中程度の中和抗体であり、38Bおよび1Cが中和抗体でないことを発見した(データは示さない)。以下に示す他のアッセイ(エピトープマッピング)のための有用な抗HA試薬として2A抗体を用いた。HA0三量体を標的として使用して、我々はHA0に対する10の新規な固有の抗体を同定した。これらのAbは、我々の研究室において最近設けられた新しいハイスループットファージ-scFvスクリーニング法を用いて、中和活性についてスクリーニングした。簡単にいうと、個々のクローンのファージ-scFvを、直接中和アッセイに用いて、その後すぐに96ウェルプレートにおいてポジティブクローンについてELISAによってスクリーニングした。この計画では、中和活性は48時間でみられるであろう。こうすることによって、我々は、時間を要する可溶性Abのサブクローニングと発現の工程を回避する。

図に示されるように、ファージ-scFvによって示された中和Ab(図6の上段左パネル)は、可溶性scFvFc Abにて確認した場合に強力に中和していることがわかった(図6の上段真ん中パネル)。ファージ-scFvによってスクリーニングされた10すべての抗体は強力な中和Abである。また、我々は、10のうちの3つの抗体(D8、F10およびA66)を完全長ヒトIgG1に変換したところ、H5-S P 3 3偽型ウイルスにも強力な活性がみられた(図6の下段左パネル)。また、3つの抗体はH1N1を交差中和した。H1-SC/1918の強力に中和された菌株(図6の下段左パネル)およびH1-PR/34の中程度に中和された菌株(図6の下段右パネル)。

#### 【0103】

マイクロ中和アッセイの結果。図6の上段右パネルに示されるように、10の抗H5抗体は異なるレベルの中和を表した。F10-Fc、A66-Fc、E88-FcおよびE90-Fcは最も強力な阻害薬であるようであり、10ug/mlで10000pfuウイルスの95%以上、そして1ug/mlで50%以上を中和する。また、我々は、10ug/mlまたは1ug/mlのこれら4つの抗体に100pfuを用いた場合に完全なブランク減少を観察した(データは示さない)。

10の抗体(scFv-Fc)は、この場合クレイド1ウイルス、A/Thailand/2-S P -33/2004(H5N1)のH5偽-ウイルス(表面にH5を提示するHI V-1コアのみを有するウイルス様粒子)(「H5-TH04」)を中和することが明らかとなった。また、10すべての抗体は、ストリンジェントなブランク減少アッセイ(図9)においてH5-VN04(クレイド1)およびA/Indonesia/5/2005(「H5-IN05」、クレイド2.1)ウイルスに対して高いが異なるレベルの中和を示したことから、中和エピトープ(一又は複数)は異なるH5クレイド間で保存されていることが示唆される。しかしながら、いずれのAbもグループ2ウイルス、HPAI H7N7株、A/Netherlands/219/03(H7N7)(H7-NL03)を中和しなかった(図4)。

10すべてのnAbが三量体H5を結合し、互いに対して交差競合したことから(図16)、これらのnAbはオーバーラップするエピトープを認識することが示される。この発見とVH配列多様性および中和作用強度に基づいて、3つのnAb(D8、F10およ

10

20

30

40

50

び A 6 6) が選択され、完全長ヒト I g G 1 に変換した。3 つすべての n A b I g G 1 は、高い親和性 ( $K_d$  およそ  $100 \sim 200 \text{ pM}$ ) および非常に遅い解離速度 ( $k_d$  およそ  $10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ) で、インビトロで組み換え H 5 (H 5 - V N 0 4) に結合した (図 1 7)。

#### 【0104】

実施例 3 : B I A c o r e T - 1 0 0 を用いることによる D 8 - I g G 1、F 1 0 - I g G 1 および A 6 6 - I g G 1 に対する H A 0 (A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4 の H A の外部ドメイン) の結合の動態学的特徴づけ

M a b は抗ヒト I g G 1 により C M 4 チップに捕獲させ、様々な濃度 (2 0、1 0、5、2.5、2.5、1.25、0.625 nM) の三量体 H A 0 をチップ表面に注入した。結合動態は、1 : 1 ラングミュア結合モデルを使用して評価した。記録された結合曲線 (ブランク比較対象を減算したもの) を黒で、算出カーブを赤で示す。すべての  $k_a$ 、 $k_d$ 、 $KD$  は、3 回の実験の平均と標準誤差を表す。我々は、B i a c o r e T 1 0 0 および B i a c o r e T 1 0 0 評価用ソフトウェアを使用して、1 : 1 ラングミュアモデルにフィッティングさせることによって、3 つの抗 H A M A b の動態学的速度および親和定数を決定した。下記の図に示すように、D 8 および F 1 0 では類似した  $k_a$ 、 $k_d$  および  $KD$  が観察され、A 6 6 はその他 2 つの抗体より相対的に速い解離速度のため、8 および 1 0 より 1.8 倍低い  $KD$  を有していた。M a b と H A 0 との複合体は安定しており、これは非常に遅い解離速度 ( $8.8 \pm 1.1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \sim 1.8 \pm 0.3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ) と p M レベルで H 5 三量体との高い親和性結合により示された。(図 7)

#### 【0105】

実施例 4 : 抗 H 5 抗体の予防的および治療的効果

H 5 N 1 および H 1 N 1 ウイルス感染に対するヒト n A b の予防効果を、B A L B / c マウスモデルにおいて評価した。マウスは、致死性ウイルス抗原刺激の前又は後に異なる用量の n A b にて処置した。

予防効果 (図 7、b、g 及び h)。マウスは、1 0 半致死量 ( $MLD_{50}$ ) の H 5 N 1 又は H 1 N 1 の鼻腔内投与 (i . n .) による致死性抗原刺激の 2 4 時間前に、抗 H 5 n A b 又はコントロール m A b にて処置した。1 0 m g / k g の 3 つの n A b 何れかの腹腔内 (i . p .) 投与により、H 5 - V N 0 4 (A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1)、クレイド 1) にて抗原刺激したマウスは完全に予防された。低い抗体用量 (2.5 m g / k g) でも高い予防作用であった (図 7 a)。1 0 m g / k g の 3 つの n A b 何れかにて処置したマウスの 8 0 ~ 1 0 0 % において、H 5 - H K 9 7 (A / H o n g K o n g / 4 8 3 / 9 7 (H 5 N 1)、クレイド 0) ウイルスに対する予防効果が観察された (図 7 b)。3 つ何れかの n A b (1 0 m g / k g の単回注射) により、H 1 - W S N 3 3 (A / W S N / 1 9 3 3 (H 1 N 1)) ウイルスにて抗原刺激したマウスが完全に予防された (図 7 g)。1 0 m g / k g の単回注射の場合、D 8 および F 1 0 は、H 1 - P R 3 4 (A / P u e r t o R i c o / 8 / 3 4 (H 1 N 1)) にて抗原刺激したマウスを完全に予防した。2 5 m g / k g の抗体を単回注射した場合、A 6 6 はマウスを完全に予防した (図 7 h)。

治療効果 (図 7 c - f)。マウスに H 5 - V N 0 4 を接種し、2 4、4 8、7 2 h p i (図 7 c、e および f) の n A b、または、2 4 h p i に H 5 - H K 9 7 (図 7 d) を注射した。接種後 2 4 時間 (2 4 h p i) に 1 5 m g / k g (ヒトにおいて治療上達成可能な用量) の 3 つの n A b の何れかを腹腔内投与することにより、1 0 倍  $MLD_{50}$  の H 5 - V N 0 4 又は H 5 - H K 9 7 ウイルスにて抗原刺激したマウスの 8 0 ~ 1 0 0 % が予防された (図 7 c - d)。H 5 - V N 0 4 にて 4 8 又は 7 2 h p i に同じ用量の n A b にて処置したマウスは、類似又はより高いレベルの予防を示した (図 7 2 e - f)。すべての抗 H 5 n A b 処置群における生存マウスは健康なままであり、2 週間の診察期間にわたって体重損失は僅かであった (データは示さない)。

#### 【0106】

実施例 5 : 治療的動物実験における抗 H 5 抗体による組織でのウイルス力価の抑制

更に、治療上用いられる n A b の抗ウイルス効果を、局所的な複製の抑制の指標として肺での、又は H 5 N 1 感染の特徴である全身の蔓延を表す脾臓及び脳での、抗原刺激後 4

10

20

30

40

50

日目のウイルス力価を測定することによって調べた。n A b は、抗原刺激後 48 時間内に投与された場合、コントロールと比較して、H5 n A b 処置マウスの肺におけるウイルス複製を有意に抑制した(図 12)。特に、D8 および F10 の 2 つの n A b は 72 h p i に投与された場合抗ウイルス効果を示した。脳への全身性ウイルス蔓延はコントロール動物において低く、n A b 治療の何らかの効果を不明瞭にするものであった。しかしながら、3 つの n A b が 72 h p i 以内に投与される場合であってもウイルスの脾臓への蔓延が 1000 倍以上抑制されることから、n A b 治療の全身蔓延に対する劇的な効果が示された。

#### 【0107】

実施例 6：抗体 D8、F10 および A66 の初期エピトープマッピング

H5-S P33 の、様々な完全長野生型 H A および H A 変異発現プラスミドを、293 T 細胞に過渡的に形質移入した。形質移入の 48 時間後に、抗 H5 抗体(10 u g / m l)を、形質移入した 293 T 細胞と共に 4 で 1 時間インキュベートした。次いで、細胞を、0.5 % B S A および 0.1 % N a N 3 を含む P B S にて 3 回洗浄した。H A 形質移入細胞に対する抗 H5 抗体の結合の検出のために、F I T C 標識ヤギ抗ヒト I g G (P i e r c e) を二次抗体として用い、細胞と共に 4 で 30 分間インキュベートした。各変異体の発現を示すために、抗体 2 A をコントロール抗体として用いた。以下の表からわかるように、M a b D8、1 F 0 および A 66 のエピトープは類似しており、H A 1 上の位置 307 および H A 2 上の 52、59、65、93 に位置している。これらのアミノ酸の位置は、H5 (A / V i e t n a m / 1203 / 04 (H5 N1)) の結晶構造において強調して示す。

#### 【0108】

実施例 7：クラスター H1 ウイルスの結合と中和。

H5 N1 ウイルスの交差クレイド中和(図 4)により、グループ 1 H1 クラスター内の他の H A サブタイプとの中和についての試験を行った(図 11)。3 つすべての n A b は、完全長 H1 (A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1918 (H1 N1)) (「H1-SC1918」) 及び A / P u e r t o R i c o / 8 / 34 (H1 N1)) (「H1-PR34」)、H2 (A / J a p a n / 305 / 57 (H2 N2)) (「H2-JP57」)、H6 (A / c h i c k e n / N e w Y o r k / 14677-13 / 1998 (H6 N2)) (H6-NY98) を発現する細胞には結合したが、グループ 2 サブタイプ、H7 ((A / F P V / R o s t o c k / 34 (H7 N1)) (「H7-FP34」)) には結合しなかった(図 4)。また、これらは、H1-SC1918 - 及び H1 - P R 34 - 偽型ウイルス感染も中和した(図 4)。加えて、F10 は、P R 34 (H1 N1)、A / O h i o / 83 (H1 N1)) (「H1-OH83」) および A / A n n A r b o r / 6 / 60 (H2 N2) 感染を中和した(図 4)。これらの結果から、これらの n A b が H5 クレイドの間で高く保存されているだけでなく、H1、H2 および H6 サブタイプ及び他のクラスター内の潜在的なサブタイプにも存在する H A 上のエピトープを認識することが示唆される。したがって、我々は、ウイルス中和のメカニズムを詳細に調査することに決めた。

#### 【0109】

実施例 8：n A b は細胞融合を阻害するがウイルス結合を阻害しない。

抗 H A A b が中和を媒介する 2 つの方法は、その細胞レセプターへの H A 結合をブロックすることと、低 pH により誘導される H A の立体構造変化を妨げることによるウイルス-宿主膜融合の阻害である。我々は、3 つの n A b は細胞へのウイルス結合に影響せず、また血球凝集反応(赤血球の結合および架橋結合)も阻害しなかったのに対して、血球凝集反応を阻害するマウス抗 H5 n A b、17A2.1.2 およびフェレット抗 H5 N1 血清はバックグラウンドレベルにまで結合を低減した。

次に、我々は、H5-T H04 の H5 と N1 との発現プラスミドが高密度の 293 T 細胞に同時形質移入されているモデルシステムを用いて、宿主細胞膜の融合を阻害する n A b の能力を試験した。表面に発現されたウイルスタンパク質によって細胞が融合し、融合細胞が形成される。これは、通常の培養条件下で形質移入後 36 ~ 48 時間以内に自発的

に起こる。形質移入の6時間後にn A bを添加し、36時間後に観察した場合、3つすべての場合において融合細胞形成の完全な阻害が観察された。n A bがない場合、形質移入の30時間目に酸性培地(p H 5)に短時間(3~4分)さらした細胞はたくさんの融合細胞を形成する。また、n A b(5 μ g / m l)は、これらの条件下で融合細胞形成を完全に妨げた(データは示さない)。まとめると、これらの結果は、3つすべてのn A bは、レセプター結合を妨げることなく膜融合を阻害することを示す。

#### 【0110】

実施例9：n A bエピトープの構造的特徴づけ

次に、我々は、3.2 分解能のH A(H 5-V N 0 4)と複合体化したs c F v断片の結晶構造の解析と突然変異により、n A bの一つであるF 1 0の結合のエピトープと様式

10

を決定した。(図6および表4)。  
複合体では、各H 5三量体は、抗体1つにつきタンパク質表面のおよそ1500<sup>2</sup>を覆っている対称性関連部位で、F 1 0の3つの分子を結合する。H 5自体の構造はF 1 0結合によってほとんど変わらない。H Aは、H A 1およびH A 2の2つのサブユニットへのタンパク分解性切断によって活性化される、単鎖、H A 0として合成される。切断により、膜近位のステムに「融合ペプチド」(H A 2の始めのおよそ21残基を含む)が覆われる。F 1 0結合はもっぱらこの領域で起こり(図6)、融合ペプチド、中性p H立体構造内の場所にペプチドを固定するH A 1とH A 2の成分(いずれもこの領域の構造に不可欠なもの)、並びに酸性p Hで多くの立体構造変化を受けるH A 2の大きならせん状ヘアピンと密接に接触し、これによりウイルス膜近位のポケットからウイルスの遠位の表面へ融合ペプチドが押し出される。これはエンドソーム膜との融合の引き金となりうる。

20

#### 【0111】

F 1 0の重鎖はH 5結合において主に働くことから、その3つの相補性決定領域(C D R)の先端を利用する。各々のF 1 0分子は、H A三量体の一つの単量体内でH A 1及びH A 2サブユニットの両方と接触する(図6)。接触領域はH A 2融合ペプチドの一部によって形成されるポケットを含み、一端にH A 1の成分を他端にH A 2のヘリックスα Aの露出面を有する(図4および6)。3組の抗体残基-C D R H 2のF 5 5とM 5 4、及びC D R H 3のY 1 0 2は主要な接触点を形成する。F 5 5のフェニル環は、融合ペプチドループの突出ループ(H A 2残基D G W 1 9<sub>2</sub>-21<sub>2</sub>(H 3番号付けスキーム;下付き文字1および2はH A 1鎖およびH A 2鎖を指す))と、2つの隣接ヒスチジン(残基18

30

1および381)及びトリプトファン、W 2 1<sub>2</sub>の芳香族側鎖とによって形成される平坦表面全体に位置する。また、M 5 4の側鎖は、W 2 1<sub>2</sub>およびH 3 8<sub>1</sub>の芳香族環、並びにヘリックスAのI 4 5<sub>2</sub>の側鎖と接触するのに対して、その主鎖はH 3 8<sub>1</sub>の側鎖とカルボニル酸素水素結合する。Y 1 0 2は、その側鎖を、Aヘリックスの4つの側鎖によって造られる疎水性クレバスに嵌入し、更に、融合ペプチドの主鎖カルボニル(D 1 9<sub>2</sub>)に水素結合する。C D R H 1ループは、ヘリックスα AのC末端と先端領域の基部のH A 1のループと複数接触する(図12 d、e)。  
並行して、エピトープ決定の補助のためにらせんα Aについて突然変異誘発実験を行った(図6)。抗体と直接接触する3つの残基の突然変異：V 5 2 A / E、N 5 3 AおよびI 5 6 Aは抗体結合を有意に低減するか又は抗体結合を除くが、保存的突然変異であるV 5

40

#### 【0112】

50

# 実施例 10：広域スペクトル中和の構造的基

F 10 エピトープによって定められる H A の領域は、16 の H A サブタイプ間で高く保存されている(図 6 および表 5)。融合ペプチドは、中性 p H 立体構造においても膜融合の過程の間においても明確な構造をとっており、突然変異誘発研究により許容される配列変化はほとんどないことが示された。また、H A 2 α A の露出したらせん状の表面は、両群全体でほとんど変化していない。その理由はおそらく、その表面が、膜融合状態において長い三量体のコイルドコイルの内側表面を形成するために再編成されるためであろう。ゆえに、2 つの異なる環境において 2 つの非常に異なる構造を取るためのこれらセグメントの必要性はおそらく、配列に対する進化の上での強い制約であり、16 の H A サブタイプにわたる保存の明確な理論的根拠となりうる。

グループ 1 のサブタイプ H 1、H 5 および H 9、そしてグループ 2 の H 3 および H 7 について結晶構造を決定し、構造を、系統発生分析によって定まる 2 つのグループと一致する 2 つの異なるクラスに分けた。更なる比較により、2 つのクラスが F 10 エピトープによって定まる領域内の詳細な三次元レベルで容易に区別されることが示唆される。各々のクラスの特徴であるコア内に覆われた 2、3 の重要なアミノ酸(例えば 17<sub>1</sub> および 111<sub>2</sub>)において配列が異なることにより、エピトープ内の様々な側鎖の定位と、らせん α A に関するポケットの配置が一致して異なる。

各グループ/クラス内で、エピトープ領域は高く保存されており、所定のクラスター内の相違が非常に僅かであり、たった 2、3 しか変化しておらず、一般にクラスター間で保存されている(例えば位置 18<sub>1</sub> および 38<sub>1</sub>、図 6 a)。3 つの n A b が H 1 クラスターの 4 つすべてのメンバーを認識するという我々の所見は、エピトープ周辺でのアミノ酸相違(このクラスターでは K、Q 又は V である残基 401 など)は結合に重要でないことを示す。

我々が選択した 10 の抗体は、実質的に配列と長さが異なる異なる 5 セットの V H C D R 1 - 3 を有している。しかしながら、ポケット内に挿入する C D R 2 (M 54、F 55) および C D R 3 (Y 102) の 3 つの重要な残基は保存されている。変化した C D R 内の重要な残基の保存は、ここで試験したものを越えて、n A b のこのグループによる H A サブタイプ/クラスター認識の範囲を拡大するものであってよい。しかしながら、6 のうち 4 つのグループ 2 サブタイプは位置 381 でグリコシル化されており、F 10 エピトープ周辺に位置していることは注目すべきことである。モデリング研究は立体的衝突(しかし、C D R H 1 ループとのみ)を予測するものであり、それはおそらく H 7 ウイルスの結合/中和の欠如の観察に貢献するであろう。

## 【0113】

### 実施例 11：抗 H 5 n A b はグループ 1 H A サブタイプの広範囲に結合する

グループ 1 ウイルスはインフルエンザ A ウイルスの合計 16 のうち 10 のサブタイプを含み、さらに 3 つの「クラスター」、H 1 a、H 1 b および H 9 に分類される。我々は、グループ 2 サブタイプ H 3 を除き、トリ H 5 と最も一般的なヒトインフルエンザサブタイプを含む、クラスター H 1 a および H 1 b の 7 つすべての H A サブタイプへの結合について我々の n A b を試験した。H 5 に加えて、我々は、3 つすべての n A b I g G 1 が、1918 の「スペインのインフルエンザ」；H 2 N 2 の H 2；及び H 6 N 2 からの H 6；並びにクラスター 1 b サブタイプ：H 11 N 9 の H 11；H 13 N 6 の H 13；及び H 16 N 3 の H 16 を含む、H 1 N 1 の 2 つの異なる菌株の完全長 H 1 を発現する細胞に結合したことを発見した。しかしながら、これらはいずれも、グループ 2 サブタイプ、H 7 N 1 の H 7 には結合しなかった(図 13)。図 13 についての詳細を以下に示す。H 1、H 2、H 5、H 6 (クラスタ H 1 a) および H 11、H 13 および H 16 (クラスタ H 1 b) への抗 H 5 n A b 結合の F A C S 分析。293 T 細胞は、異なる H A 発現プラスミドを過渡的に形質移入した。細胞への N A b 結合は F A C S によって分析した。H 5 - 特異的抗体 2 A および 80 R はネガティブコントロールである。グループ 2 H A、H 7 への結合の欠如も示される。ウイルス株についての詳細は以下の通りである。H 1 - S C 1918 ((A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1918 (H 1 N 1)) H 1 - P R 34 (A / P u e

r t o R i c o / 8 / 3 4 ( H 1 N 1 ) ) 、 H 2 - J P 5 7 ( A / J a p a n / 3 0 5 / 5 7 ( H 2 N 2 ) ) 、 H 5 - T H 0 4 ( A / T h a i l a n d / 2 - S P - 3 3 / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) ) 、 H 6 - N Y 9 8 ( A / C h i c k e n / N e w Y o r k / 1 4 6 7 7 - 1 3 / 1 9 9 8 ( H 6 N 2 ) ) 、 H 7 - F P 3 4 ( A / F P V / R o s t o c k / 3 4 ( H 7 N 1 ) ) 、 H 1 1 - M P 7 4 ( A / D u c k / m e m p h i s / 5 4 6 / 7 4 ( H 1 1 N 9 ) ) 、 H 1 3 - M D 7 7 ( A / G u l l / M D / 7 0 4 / 7 7 ( H 1 3 N 6 ) ) 、 および H 1 6 - D E 0 6 ( A / S h o r e b i r d / D E / 1 7 2 / 0 6 ( H 1 6 N 3 ) ) 。

#### 【 0 1 1 4 】

#### 参考文献

1. W.H.O. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs211/en/>. World Health Organization factsheet 211: influenza (2003 ). 10
2. Webster, R. G. 1918 Spanish influenza: the secrets remain elusive. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 1164-6 (1999).
3. de Wit, E. & Fouchier, R. A. Emerging influenza. *J Clin Virol* 41, 1-6 (2008).
4. Wright, P., Neumann, G. & Kawaoka, Y. in *Fields Virology* (eds. Knipe, D., Howley, P., Griffin, D., Lamb, R. & Martin, M.) 1692-1740 (Lippincott Williams & Wilkins 2006).
5. Fauci, A. S. Pandemic influenza threat and preparedness. *Emerg Infect Dis* 12, 73-7 (2006). 20
6. Fouchier, R. A. et al. Characterization of a novel influenza A virus hemagglutinin subtype (H16) obtained from black-headed gulls. *J Virol* 79, 2814-22 (2005).
7. Ha, Y., Stevens, D. J., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. H5 avian and H9 swine influenza virus haemagglutinin structures: possible origin of influenza subtypes. *Embo J* 21, 865-75 (2002).
8. Russell, R. J. et al. H1 and H7 influenza haemagglutinin structures extend a structural classification of haemagglutinin subtypes. *Virology* 325, 287-96 (2004).
9. W.H.O. ([http://www.who.int/csr/disease/avian\\_influenza/guidelines/summaryH520070403.pdf](http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/summaryH520070403.pdf), 2007). 30
10. W.H.O. Evolution of H5N1 avian influenza viruses in Asia. *Emerg Infect Dis* 11, 1515-21 (2005).
11. Subbarao, K. et al. Characterization of an avian influenza A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal respiratory illness. *Science* 279, 393-6 (1998).
12. de Jong, J. C., Claas, E. C., Osterhaus, A. D., Webster, R. G. & Lim, W. L. A pandemic warning? *Nature* 389, 554 (1997).
13. W.H.O. [http://www.who.int/csr/disease/avian\\_influenza/en/](http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/). (2008).
14. Nicholson, K. G. et al. Safety and antigenicity of non-adjuvanted and MF59-adjuvanted influenza A/Duck/Singapore/97 (H5N3) vaccine: a randomised trial of two potential vaccines against H5N1 influenza. *Lancet* 357, 1937-43 (2001). 40
15. Stephenson, I. et al. Cross-reactivity to highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses after vaccination with nonadjuvanted and MF59-adjuvanted influenza A/Duck/Singapore/97 (H5N3) vaccine: a potential priming strategy. *J Infect Dis* 191, 1210-5 (2005).
16. Stephenson, I. et al. Boosting immunity to influenza H5N1 with MF59-adjuvanted H5N3 A/Duck/Singapore/97 vaccine in a primed human population. *Vaccine* 21, 1687-93 (2003).
17. Treanor, J. J., Campbell, J. D., Zangwill, K. M., Rowe, T. & Wolff, M. Safe 50

- ty and immunogenicity of an inactivated subvirion influenza A (H5N1) vaccine. *N Engl J Med* 354, 1343-51 (2006).
18. Treanor, J. J. et al. Safety and immunogenicity of a recombinant hemagglutinin vaccine for H5 influenza in humans. *Vaccine* 19, 1732-7 (2001).
  19. Bresson, J. L. et al. Safety and immunogenicity of an inactivated split-virion influenza A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vaccine: phase I randomised trial. *Lancet* 367, 1657-64 (2006).
  20. Lin, J. et al. Safety and immunogenicity of an inactivated adjuvanted whole-virion influenza A (H5N1) vaccine: a phase I randomised controlled trial. *Lancet* 368, 991-7 (2006). 10
  21. W.H.O. <http://www.who.int/csr/disease/influenza/influenzanetwork/en/index.html>. (2008).
  22. Carrat, F. & Flahault, A. Influenza vaccine: the challenge of antigenic drift. *Vaccine* 25, 6852-62 (2007).
  23. Cinatl, J., Jr., Michaelis, M. & Doerr, H. W. The threat of avian influenza A (H5N1). Part IV: Development of vaccines. *Med Microbiol Immunol* 196, 213-25 (2007).
  24. Subbarao, K. & Luke, C. H5N1 viruses and vaccines. *PLoS Pathog* 3, e40 (2007).
  25. Leroux-Roels, I. et al. Broad Clade 2 Cross-Reactive Immunity Induced by an Adjuvanted Clade 1 rH5N1 Pandemic Influenza Vaccine. *PLoS ONE* 3, e1665 (2008). 20
  26. Baras, B. et al. Cross-Protection against Lethal H5N1 Challenge in Ferrets with an Adjuvanted Pandemic Influenza Vaccine. *PLoS ONE* 3, e1401 (2008).
  27. Marasco, W. A. & Sui, J. The growth and potential of human antiviral monoclonal antibody therapeutics. *Nat Biotechnol* 25, 1421-34 (2007).
  28. Stevens, J. et al. Structure and receptor specificity of the hemagglutinin from an H5N1 influenza virus. *Science* 312, 404-10 (2006).
  29. Sui, J. et al. Potent neutralization of severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus by a human mAb to S1 protein that blocks receptor association. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 2536-41 (2004). 30
  30. Huang, C. C. et al. Structural basis of tyrosine sulfation and VH-gene usage in antibodies that recognize the HIV type 1 coreceptor-binding site on gp120. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 2706-11 (2004).
  31. Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Receptor binding and membrane fusion in virus entry: the influenza hemagglutinin. *Annu Rev Biochem* 69, 531-69 (2000).
  32. Kida, H., Yoden, S., Kuwabara, M. & Yanagawa, R. Interference with a conformational change in the haemagglutinin molecule of influenza virus by antibodies as a possible neutralization mechanism. *Vaccine* 3, 219-22 (1985).
  33. Vanlandschoot, P. et al. An antibody which binds to the membrane-proximal end of influenza virus haemagglutinin (H3 subtype) inhibits the low-pH-induced conformational change and cell-cell fusion but does not neutralize virus. *J Gen Virol* 79 ( Pt 7), 1781-91 (1998). 40
  34. Su, Y., Zhu, X., Wang, Y., Mu, M. & Tien, P. Evaluation of Glu11 and Gly8 of the H5N1 influenza hemagglutinin fusion peptide in membrane fusion using pseudotype virus and reverse genetics. *Acta Virol* 153, 247-257 (2008).
  35. Yamada, S. et al. Haemagglutinin mutations responsible for the binding of H5N1 influenza A viruses to human-type receptors. *Nature* 444, 378-82 (2006).
  36. Stevens, J. et al. Structure of the uncleaved human H1 hemagglutinin from the extinct 1918 influenza virus. *Science* 303, 1866-70 (2004).
  37. Daniels, R. S. et al. Fusion mutants of the influenza virus hemagglutinin g 50

lycoprotein. Cell 40, 431-9 (1985).

38. Thoennes, S. et al. Analysis of residues near the fusion peptide in the influenza hemagglutinin structure for roles in triggering membrane fusion. Virology 370, 403-14 (2008).

39. Earp, L. J., Delos, S. E., Park, H. E. & White, J. M. The many mechanisms of viral membrane fusion proteins. Curr Top Microbiol Immunol 285, 25-66 (2005).

40. Godley, L. et al. Introduction of intersubunit disulfide bonds in the membrane-distal region of the influenza hemagglutinin abolishes membrane fusion activity. Cell 68, 635-45 (1992).

41. Bullough, P. A., Hughson, F. M., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Structure of influenza haemagglutinin at the pH of membrane fusion. Nature 371, 37-43 (1994). 10

42. Ha, Y., Stevens, D. J., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. X-ray structures of H5 avian and H9 swine influenza virus hemagglutinins bound to avian and human receptor analogs. Proc Natl Acad Sci U S A 98, 11181-6 (2001).

43. Wilson, I. A., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Structure of the haemagglutinin membrane glycoprotein of influenza virus at 3 Å resolution. Nature 289, 366-73 (1981).

44. Kashyap, A. K. et al. Combinatorial antibody libraries from survivors of the Turkish H5N1 avian influenza outbreak reveal virus neutralization strategies. Proc Natl Acad Sci U S A Early edition (2008). 20

45. Huang, I. C. et al. Influenza A virus neuraminidase limits viral superinfection. J Virol (2008).

46. Glaser, L. et al. A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity. J Virol 79, 11533-6 (2005).

47. Naldini, L., Blomer, U., Gage, F. H., Trono, D. & Verma, I. M. Efficient transfer, integration, and sustained long-term expression of the transgene in adult rat brains injected with a lentiviral vector. Proc Natl Acad Sci U S A 93, 11382-8 (1996).

48. Rowe, T. et al. Detection of antibody to avian influenza A (H5N1) virus in human serum by using a combination of serologic assays. J Clin Microbiol 37, 937-43 (1999). 30

【 0 1 1 5 】

表3 H5-F10 境界面の接触残基

| F10 | FRH1 | CDRH1 |     |     |     | CDRH2      |            |  | CDRH3 |      |                          |            |      |
|-----|------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|--|-------|------|--------------------------|------------|------|
|     |      | V27   | T28 | S30 | S31 | M54        | F55        |  | P100  | S101 | Y102                     | I103       | S105 |
| HA1 |      |       |     | Q40 |     | H38        | H38        |  |       |      |                          |            |      |
| HA2 |      |       |     |     | I45 | W21<br>I45 | D19<br>W21 |  | Q42   | Q42  | D19<br>K38<br>Q42<br>I45 | D19<br>K38 | K38  |

< 4.5 Å の最も近い原子間距離を有することによって定められる接触残基(コンタクト残基)。

色の組合せは結合自由エネルギーに対する個々の残基の関与を示す：

非常に好ましい(赤い(V27、T28、I45、D19、W21))、好ましい(オレンジ(S25、S291、M292、I56、V52、N53、T49、H18、V18、G20、T57、T41))、極僅かな影響(青(S30、S31、Q40、H38))、好ましくない(黒)、非常に好ましくない(黒太字)。

<http://structure.pitt.edu/servers/fastcontact><sup>1</sup> のサーバーを使用したエネルギー計算に基づく。

【 0 1 1 6 】

表 4 データ収集及び精製統計値

| H5-F10                               |                                                    |    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| データ収集                                |                                                    |    |
| 細胞パラメーター                             | a=205.3, b=118.5,<br>c=338.9<br>$\beta=99.6^\circ$ | 10 |
| 空間群                                  | C2                                                 |    |
| 分解能( $\text{\AA}$ )*                 | 3.2(3.28-3.20)                                     |    |
| 全反射                                  | 509705                                             |    |
| 固有の反射                                | 112570                                             |    |
| 完全性(%)*                              | 85.0 (68.4)                                        |    |
| 平均 $I / \sigma(I)$ *                 | 9.5 (2.0)                                          |    |
| $R_{\text{MERGE}}(\%)$ *             | 12.8 (81.0)                                        |    |
| 重複性*                                 | 4.5 (4.5)                                          |    |
| $\sigma$ カットオフ                       | -3                                                 | 20 |
| 精密化                                  |                                                    |    |
| 分解能                                  | 50-3.2(3.28-3.20)                                  |    |
| $R_{\text{WORK}}^*$                  | 0.23 (0.32)                                        |    |
| $R_{\text{FREE}}(5\% \text{ データ})^*$ | 0.29 (0.38)                                        |    |
| RMS D 結合距離( $\text{\AA}$ )           | 0.01                                               |    |
| RMS D 結合角( $^\circ$ )                | 1.31                                               |    |
| 平均 B 値                               | 75.7                                               |    |
| 溶媒原子                                 | 0                                                  | 30 |
| $\sigma$ カットオフ                       | なし                                                 |    |
| ラマチャンドランプロット                         |                                                    |    |
| 好ましい領域(%)の残基                         | 90.0                                               |    |
| 得られた領域(%)の残基                         | 9.5                                                |    |
| 外れ領域(%)の残基                           | 0.5                                                |    |

\*括弧内の数字は最大の分解能殻に対応する。

【 0 1 1 7 】

表5 16 HA サブタイプの F10 エピトープの配列比較

| グループ  | クラスター | サブタイプ | #完全配列 | #異なる配列 | HA1                  |                    |                    |                   | HA2                    |                       |                      |                |                  |                       |                  |                |                        |                        |                  |                     |                       |                  |                |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|       |       |       |       |        | 17                   | 18                 | 38                 | 40                | 291                    | 19                    | 20                   | 21             | 38               | 41                    | 42               | 45             | 49                     | 52                     | 53               | 56                  | 111                   |                  |                |
| グループ1 | H1a   | H2    | 100   | 95     | Y                    | H                  | H                  | QLEJK<br>(43)77   | T                      | (IV)<br>(20)75        | D                    | G              | W                | K                     | T                | T              | (F-V)<br>(39)56        | T                      | (IV)<br>(19)54   | N                   | I                     | H                |                |
|       |       | H5    | 1020  | 1178   | (S,T,F,Y)<br>(4)1174 | (V,D,H)<br>(2)1176 | (Q,Y,H)<br>(4)1174 | (K,Q)<br>(2)1176  | (N,T,R,S)<br>(6)1172   | (IV)<br>(9)1172       | (N,H,X,D)<br>(9)1173 | G              | (R,W)<br>(1)1177 | (Q,R,N,K)<br>(23)1155 | (S,T)<br>(3)1175 | P,Q<br>(1)1177 | (M,L,T)<br>(8)1170     | (IT)<br>(1)1177        | V                | N                   | (F,V)<br>(1)1177      | H                |                |
|       |       | H1    | 1211  | 701    | Y                    | H                  | H                  | (V)<br>(2)699     | (S,N)<br>(1)685        | (V,M)<br>(13)546      | D                    | G              | W                | (K,L,C,Q)<br>(9)641   | T                | Q              | (V)<br>(2)689          | (S,X,C,T)<br>(19)682   | (M,Y)<br>(2)689  | N                   | (V)<br>(1)709         | H                |                |
|       |       | H6    | 278   | 230    | Y                    | H                  | H                  | V                 | (IN)<br>(1)229         | (V)<br>(43)187        | D                    | G              | (R,W)<br>(1)229  | (R,K)<br>(10)128      | T                | Q              | (V)<br>(78)152         | (IT)<br>(3)227         | (IV)<br>(3)227   | N                   | I                     | H                |                |
|       |       | H13   | 16    | 16     | Y                    | L                  | S                  | (V)<br>(6)16      | N                      | I                     | N                    | G              | W                | K                     | T                | Q              | I                      | T                      | V                | N                   | I                     | H                |                |
|       |       | H1b   | 8     | 6      | Y                    | L                  | S                  | (V)<br>(2)16      | N                      | I                     | N                    | G              | W                | K                     | T                | Q              | I                      | T                      | V                | N                   | I                     | H                |                |
| グループ2 | H7    | H11   | 64    | 64     | Y                    | L                  | S                  | (V)<br>(1)64      | (T,S)<br>(1)63         | (L)<br>(1)63          | N                    | G              | W                | (R,K)<br>(9)69        | T                | Q              | (V)<br>(3)61           | (IT)<br>(1)68          | V                | N                   | (L,V)<br>(17)47       | H                |                |
|       |       | H8    | 10    | 10     | Y                    | Q                  | Q                  | M                 | S                      | I                     | D                    | G              | W                | Q                     | T                | Q              | I                      | T                      | (IV)<br>(1)9     | N                   | I                     | H                |                |
|       |       | H12   | 19    | 18     | Y                    | Q                  | Q                  | E                 | S                      | V                     | A                    | G              | W                | R                     | T                | Q              | I                      | Q                      | L                | N                   | I                     | H                |                |
|       |       | H9    | 252   | 284    | (H,Y)<br>(3)291      | (L,Q)<br>(1)233    | (D,H)<br>(1)233    | (R,E,K)<br>(5)229 | (V)<br>(1)233          | V                     | (S,A)<br>(1)233      | G              | (G,W)<br>(1)233  | (K,G,R)<br>(1)229     | T                | Q              | (V,E,M,R,H)<br>(43)191 | (IT)<br>(1)233         | V                | (S,L,D,N)<br>(3)231 | (IV)<br>(55)179       | (C,H)<br>1233    |                |
|       |       | H4    | 105   | 90     | H                    | H                  | H                  | (A,I)<br>(1)99    | (R,Q)<br>(1)99         | (A,I,S,H)<br>(10)92   | I                    | D              | G                | (G,W)<br>(1)91        | L                | T              | Q                      | I                      | (M,I)<br>(1)89   | L                   | N                     | I                | (A,I)<br>(2)90 |
|       |       | H14   | 2     | 2      | H                    | H                  | S                  | K                 | D                      | I                     | D                    | G              | W                | L                     | T                | Q              | I                      | N                      | L                | N                   | I                     | T                |                |
| グループ2 | H7    | H3    | 2302  | 1228   | H                    | H                  | N                  | (N,T)<br>(1)1227  | (N,Y,E,G,D)<br>(35)193 | (M,D)<br>(1)91(70%)30 | (15)1213             | G              | W                | (F,I)<br>(1)1227      | T                | Q              | (V,T,L,H)<br>(5)1223   | (D,S,T,A,N)<br>(2)1206 | (M,I)<br>(1)1227 | (D,N)<br>(1)1227    | (V,T,F,H)<br>(19)1209 | (A,T)<br>(7)121  |                |
|       |       | H15   | 8     | 5      | H                    | H                  | N                  | T                 | P                      | I                     | D                    | G              | W                | Y                     | T                | Q              | I                      | T                      | L                | N                   | I                     | A                |                |
|       |       | H7    | 334   | 273    | H                    | H                  | N                  | T                 | (S,R,P,N)<br>(13)1142  | (V)<br>(4)122         | (M,D)<br>(5)213      | G              | W                | (H,Y)<br>(1)22        | T                | (P,Q)<br>(2)21 | (V)<br>(3)20           | T                      | L                | N                   | I                     | (T,A)<br>(35)238 |                |
|       |       | H10   | 31    | 28     | H                    | H                  | N                  | T                 | (E,K)<br>(1)27         | V                     | (M,F,D)<br>(2)28     | (A,G)<br>(1)27 | W                | Y                     | T                | Q              | I                      | T                      | L                | N                   | (V)<br>(1)27          | A                |                |

\* この表は、2008年4月現在の公共インフルエンザ配列データベース (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/FLU/FLU.html>)において利用できる配列を表す。  
淡青色のハイライト：上段の( )、(アミノ酸変異(一又は複数))／その位置でのアミノ酸コンセンサス；下段の( )、(アミノ酸変異の数)／コンセンサスアミノ酸の数。強調されていないアミノ酸は100%保存されているか、または、サブタイプH4、H6、H9、H10、H11の位置で5回以下の変異が観察される。pHトリガーにおいて役割を有するヒスチジンH17(HA1)およびH111(HA2)は緑で強調する。

10

20

30

40


【0118】  
他の実施態様

本明細書中では特定の実施態様を詳細に開示したが、これは例示のみを目的とするものであって、以下に続く添付の特許請求の範囲を限定するものではない。特に、特許請求の範囲によって定められる本発明の精神及び権利範囲を逸脱することなく、本発明に様々な置き換え、変更および修飾がなされうことは発明者が意図するものである。他の態様、


50

便宜及び修飾は以下の特許請求の範囲内であるとみなされる。示される特許請求の範囲は、本明細書において開示される本発明の代表である。他の特許請求の範囲に記載していない発明もまた包含される。出願人は、後の特許請求の範囲の発明を取得する権利を保有する。

【図 1 A】




【図 1 B】



ポジティブ選択下にあるH5N1インフルエンザウイルスの  
HAにおけるアミノ酸残基の位置 (Smith, 2006から引用)


【 図 2 】




【 図 3 】

[illegible]

【 図 4 A 】




【 図 4 B 】







【図 6 E】




【図 7 A - C】




【図 7 D - F】




【図 8】




【 図 9 】




【 図 1 0 】




【 図 1 1 】



【 図 1 2 】



【図 13】



## 【配列表】

2015180619000001.app

## 【手続補正書】

【提出日】平成27年4月8日(2015.4.8)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

明細書に記載の発明。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

(関連出願)

本出願は、2007年12月6日出願のUS N 61 / 005725及び2008年8月25日出願のUS N 61 / 091599の優先権を主張するものであり、これらの内容は出典明記によって本明細書中に援用される。

【0002】

( 助成金支援 )

本発明は、国立衛生研究所助成 U 0 1 A I 0 7 4 5 1 8 - 0 1 の下で、米国政府支援により成された。米国政府は本発明の特定の権利を有する。

【 0 0 0 3 】

( 技術分野 )

本発明は、概して、抗ウイルス抗体並びにその使用方法に関する。

【 背景技術 】

【 0 0 0 4 】

インフルエンザの世界的流行は、ヒトの健康に最も大きな急性感染の脅威の一つである。1918～1919年のインフルエンザの世界的流行は米国の約500,000人の死を引き起こし、米国歴史上最も致命的な現象となった。高病原性鳥インフルエンザ(HPAI) H5N1インフルエンザはアジア全体に蔓延し、現在中東および北アフリカへ、新たな世界的流行の実質的なリスクとなっている。

自然変異(natural variation)並びに回避変異(escape mutant)は、ウイルスの継続した進化が菌株(一又は複数)を受動および能動的な免疫化に使うべきであるという決定に影響を与えうることを示唆する。多くの重要なエピトープマッピングおよび中和回避(neutralization escape)研究は新規の中和抗体を報告しているが、HPAI H5N1に対する免疫化方策を開発するためには関連の構造的な研究が必要とされている。HPAI H5N1に対する保護ワクチンを開発する試みは大変なものであり、常に変化する敵による人の感染を予防及び治療するためには新たな方策が必要である。受動的にも能動的にも保護的な宿主免疫を誘発するためには、治療的方策を急いで開発する必要がある。

ヒト抗体(Ab)工学の分野は甚だしく進歩している。モノクローナル抗体(MAb)ベースの免疫療法は現在、RSVを含む増えつつあるヒト疾患の標準的な治療となりつつある。デノボのヒトMAb単離およびその臨床使用に対する推移は、現在、高い親和性及び特異性を有するヒト抗体を構築するために利用される新規な抗体ディスプレイおよび他のライブラリスクリーニング技術にある程度よるものである。ヒトMAb免疫療法は、ヒトの疾患の臨床管理においてますます重要な役割を提供しうる。

【 発明の概要 】

【 0 0 0 5 】

本発明は、インフルエンザウイルス、例えばインフルエンザAウイルスを中和するモノクローナル抗体の発見に基づく。インフルエンザAウイルスはH1クラスターインフルエンザウイルスのようなグループIインフルエンザAウイルスであり、H1クラスターインフルエンザウイルスはH1aクラスター又はH1bクラスターである。モノクローナル抗体は完全にヒトである。様々な態様では、モノクローナル抗体は、二価抗体、一価抗体、単鎖抗体又はその断片である。具体的に、このようなモノクローナル抗体は、HA1又はHA2ポリペプチドのような、ヘマグルチニンタンパク質(HA)のステム領域上のエピトープに結合する。エピトープは非線形である。

場合によって、エピトープはHA-1およびHA-2を含む。エピトープは非線形である。いくつかの実施態様では、エピトープは、HA1ポリペプチドのアミノ酸位18、38、40、291と、HA2ポリペプチドのアミノ酸位18、19、20、21、38、41、42、45、49、52、53および56を含む。

例示的なモノクローナル抗体には、モノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90又はH98、または、D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90又はH98と同じエピトープに結合する抗体が含まれる。

【 0 0 0 6 】

本発明のモノクローナル抗体は、モノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90又はH98の結合親和性を有しうる。あるいは、結合親和性は、およそ1 pM～およそ200 mMであってよい。本発明のモノクローナル抗体は、ウイルスと細胞の膜融合を阻害するように機能する。

モノクローナル抗体は、配列番号：2、6、12、18、24、28、32および36を含む重鎖可変アミノ酸配列および/または配列番号：4、8、14、16、20、22、26、30、34および38を含む軽鎖可変アミノ酸配列とを有する。

モノクローナル抗体は、配列番号：1、5、13、15、21、23、29、33、37及び40を含む重鎖可変核酸配列、及び又は配列番号：3、9、11、17、19、25、27、31、35、39および42を含む軽鎖可変核酸配列を有する。

また、モノクローナル抗-インフルエンザヘマグルチニンタンパク質抗体又はその断片であって、該抗体が、アミノ酸配列SYAFS (配列番号：43)、TNAFS (配列番号：44)、AYAF T (配列番号：45)、SFAIS (配列番号：46)、SYAIS (配列番号：47)、GY YIH (配列番号：48)、MTAF T (配列番号：49)又はDNAIS (配列番号：50)を有するV<sub>H</sub> CDR1領域；アミノ酸配列GIIPMF GTPNYAQKFQG (配列番号：51)、GV IPLFR TASYAQNVQG (配列番号：52)、GIIGMF G TANYAQKFQG (配列番号：53)、GISPMF GTPNYAQKFQG (配列番号：54)、GIIGVFGV PKY AQKFQG (配列番号：55)、WINPMTGGTNYAQKFQV (配列番号：56)、GISPIFRTPKYAQKFQG (配列番号：57)又はGIIPIFGKPNY AQKFQG (配列番号：58)を有するV<sub>H</sub> CDR2領域；アミノ酸配列SSGYYYGGGFDV (配列番号：59)、SSGYHFGGRSHFDS (配列番号：60)、GLYYEYESSLDY (配列番号：61)、SPSYICSGGTCVFDH (配列番号：62)、EPGY YVGKNGFDV (配列番号：63)、GASVLR YFDWQPEALDI (配列番号：64)、TLSSYQPNND AFAI (配列番号：65)又はSDAYYYGSGGMDV (配列番号：66)を有するV<sub>H</sub> CDR3領域；アミノ酸配列TGSSSNIGNYVA (配列番号：67)、TGSSSNIAANYVQ (配列番号：68)、TGTSSSDVGGYNSVS (配列番号：69)、TGNSNNVGNQGA A (配列番号：70)、TGDSNNVGHQGT A (配列番号：71)、GGNNIGGYSVH (配列番号：72)、RASQSVSSYL A (配列番号：73)、RASQSLSSKYLA (配列番号：74)、TGSSSNIGNYVA (配列番号：75)、SGSSSNIGSNTVN (配列番号：76)、RASQSISSYLN (配列番号：77)又はTLSSGHSNYIIA (配列番号：78)を有するV<sub>L</sub> CDR1領域；アミノ酸配列SNSDRPS (配列番号：79)、EDDRPS (配列番号：80)、EVTKRPS (配列番号：81)、RNND RPS (配列番号：82)、RNGNRPS (配列番号：83)、DDKDRPS (配列番号：84)、DASN RAT (配列番号：85)、GASSRAT (配列番号：86)、SNNQRPS (配列番号：87)、AASSLQR (配列番号：88)、SNEQRPS (配列番号：89)又はVNSDGSHTKGD (配列番号：90)を有するV<sub>L</sub> CDR2領域、および/またはアミノ酸配列QSYDSL S AYV (配列番号：91)、QSYDTNNH AV (配列番号：92)、CSYAGHS AYV (配列番号：93)、STWDS SLS AVV (配列番号：94)、SVWDS SLS AWV (配列番号：95)、QVWDS GND RPL (配列番号：96)、QQYGS SPQV (配列番号：97)、QQYDGVPR T (配列番号：98)、QSYDSRLSASL (配列番号：99)、QQYDSSPYT (配列番号：100)、ASWDDNLSGWV (配列番号：101)又はETWDTKIHV (配列番号：102)を有するV<sub>L</sub> CDR3領域を有する抗体又は断片が本発明によって提供される。

#### 【0007】

更なる態様では、本発明は、単離されたモノクローナル抗-インフルエンザヘマグルチニンタンパク質抗体又はその断片であって、該抗体が、V<sub>H</sub>生殖系列遺伝子IGHV1-69\*01によってコードされるV<sub>H</sub>アミノ酸配列と、以下の位置にアミノ酸を有し、a) 27がバリンである；b) 28がスレオニンである；c) 30がセリンである；d) 31がセリンである；e) 54がメチオニンである；f) 55がフェニルアラニンである；g) 58がスレオニンである；h) 100がプロリンである；i) 101がセリンである

； j ) 1 0 2 がチロシンである； k ) 1 0 3 がイソロイシンであり、 1 0 5 がセリンである抗体又は断片を提供する。

他の態様では、本発明は、インフルエンザウイルスによって生じる疾患又は疾病を患うリスクにあるヒトに、治療的に有効量の本明細書中に記載のモノクローナル抗体又は s c F V 抗体を投与することによる、該疾患又は疾病の予防又は治療の方法を提供する。モノクローナル抗体又は s c F V 抗体は、インフルエンザウイルスを中和するために十分な用量で投与される。本発明の実施態様では、方法もまた、抗ウイルス薬、ウイルス侵入阻害薬又はウイルス接着阻害薬を投与することを含む。抗ウイルス薬は、ザナミビル又はオセルタミビルリン酸塩のようなノイラミニダーゼ阻害薬、H A 阻害薬、シアル酸阻害薬、又はアマンタジン又はリマンタジンのような M 2 イオンチャネルである。抗体はインフルエンザウイルスへの曝露の前又は後に投与される。

#### 【 0 0 0 8 】

他の態様では、本発明は、試料を本明細書中に記載のモノクローナル抗体と接触させ、抗体 - 抗原複合体の有無を検出し、これによって試料中のインフルエンザの存在を検出することによって、試料中のインフルエンザウイルスの存在の検出方法を提供する。試験試料は一般に、血液、体毛、頬擦過物又は塗布物、唾液、生検、尿、糞便、痰、鼻吸引又は精液から得られる。

さらに、本発明は、H A のステム領域の高く保存されたエピトープを標的とする広い中和ヒト抗体を生成するためのプロトコルの発見に基づく。可塑性(プラスチック)表面に吸着された無電荷のマノースと短い N - グリカンを生産するバキュロウイルスに発現される三量体 H 5 外部ドメインを用いると、正常に免疫優性球状ヘッドをマスキングしながら、ステムエピトープを優性に提示することができた。

#### 【 0 0 0 9 】

したがって、本発明はまた、単鎖又は F a b 発現ライブラリをウイルスの膜融合タンパク質にさらし、該タンパク質を特異的に結合するライブラリ中の抗体を同定し、そしてライブラリから抗体を単離することによる、病原性エンベロープウイルスを特異的に結合する単離された抗体の製造方法も包含される。好ましくは、融合タンパク質は、固形表面、例えばプラスチックに固定される。様々な態様では、融合タンパク質は、野生型融合タンパク質と比較して変更したグリコシル化を有する。例えば、融合は、昆虫細胞などの非哺乳動物細胞内で産生される。融合タンパク質は、例えば三量体ヘマグルチニン(H A )タンパク質である。

本発明はさらに、生物学的に適合性のあるマトリックスにコートされたか又は包埋された膜融合タンパク質(例えば三量体ヘマグルチニン(H A )タンパク質)を被検体に投与することによる、インフルエンザウイルスなどの病原性エンベロープウイルスに対して被検体を予防接種する方法を提供する。様々な態様では、融合タンパク質は、野生型融合タンパク質と比較して変更したグリコシル化を有する。

他の態様では、本発明は、本明細書中に記載のモノクローナル抗体を含む組成物、及び一又は複数の容器内の組成物と使用のための指示書を具備するキットを提供する。

#### 【 0 0 1 0 】

特に定義しない限り、本明細書中で用いるすべての技術的及び化学的用語は、本発明が属する分野の通常技術者によって共通して理解される意味と同じである。本明細書において記述されるものに類似する方法及び材料又はその等価物が、本発明の実施又は試験に使われうるが、適切な方法および材料は後述する。本明細書において言及されるすべての刊行物、特許出願、特許および他の文献は、出典明記によってその全体が本明細書中に援用される。紛争の場合、定義を含む本明細書は管理するであろう。さらに、材料、方法および実施例は例示のためだけのものであって、制限を目的とするものではない。

本発明の他の特徴および効果は以下の詳細な説明および特許請求の範囲から明らかである。

#### 【 図面の簡単な説明 】

#### 【 0 0 1 1 】

【図1A】A/Vietnam1203/04三量体の構造の例である。レセプター結合部位および抗原性変異部位を単量体上で強調して示す。

【図1B】ポジティブ選択下にあるH5N1インフルエンザウイルスのHAのアミノ酸残基の位置を示す例である。

【図2】H5N1の収束組合せ免疫療法の概略図である。

【図3】本発明の抗インフルエンザ抗体のVH及びVLのフレームワーク領域1-4(FR1-4)及び相補性決定領域1-3(CDR1-3)のアミノ酸配列比較を示す例である。FRおよびCDR領域はカバットデータベースを使用して定められる。VHおよびVLの遺伝子名を右に示す(IMG Tデータベースを使用する)。点はコンセンサス配列に対する配列同一性を示す。ハイフンはギャップを表す。

【図4】抗H5抗体のインビトロ中和を示す。(a)(上パネル)10のnAbを可溶性scFv-Fc(ヒンジ、CH2およびCH3に連結した可変領域の単鎖断片)に変換し、H5TH04-偽型のウイルスに対する活性の中和について評価した。2つの濃度の中和割合を標準誤差バーにて示す。mAb 80R<sup>16</sup>をコントロール(Control)として用いた。(中央及び下パネル)、ブランク減少アッセイを用いた3つの濃度の10のscFv-Fcによる野生型H5-VN04及びH5-IN05の中和。結果は、マイクロ中和アッセイから得られたデータと一致している(データは示さない)。(b)交差サブタイプ中和。nAb D8、F10及びA66すべてがH5-TH04、H1-SC1918((A/South Carolina/1/1918(H1N1))、H1-PR34(A/Puerto Rico/8/34(H1N1))、H2-JP57(A/Japan/305/57(H2N2))及びH6-NY98(A/chicken/New York/14677-13/1998(H6N2))偽型ウイルスを中和した。(c)マイクロ中和アッセイ。H5N1およびControlに対して生じたマウスmAb 21G8.6と比較したときの、野生型H5N1、H1N1(A/Ohio/83(「H1-OH83」))およびH2N2(A/Ann Arbor/6/60(「H2-AA60」))に対するF10の中和力価。80R(1mg/mL Ab原液)。「<」は20未満の力価を示す。結果は2つの独立した実験を表す。

【図5】中和メカニズムを示す。(a)H5-TH04-偽型HIV-1ウイルスの完全長HAを用いたウイルス結合阻害アッセイ。Ab処理群の細胞に対するウイルスの結合は、Abがない場合の細胞への結合(100%定める)と比較した。3つのnAb(D8、F10及びA66)はいずれも細胞へのウイルス結合を阻害しなかったが、赤血球凝集を阻害し、おそらくヘッドに結合するマウス抗H5 mAbである17A2.1.2とフェレット抗H5N1血清はいずれも有意に結合を低減した。(b)nAbによるシンシチウム(合胞体)形成の阻害。HeLa細胞にH5-TH04発現プラスミドを形質移入した。pH5.0バッファに短時間さらすことによって誘導したシンシチウム形成は、20µg/mLのnAb D8、F10及びA66によって完全に阻害されたのに対して、同じ濃度のコントロール及び抗HA1 mAb(2A)は効果を示さなかった。

【図6】H5-F10エピトープの構造と配列/構造の保存を示す。(a)F10(scFv)に結合したH5三量体の構造。H5は複合体化されなかった構造<sup>21</sup>に非常に類似している(2つの独立した三量体では、ペアワイズRMSD(Cα)=1.0及び0.63)。HA1、HA2、HA2のαAヘリックス、「融合ペプチド」(FP)およびF10(VHおよびVL)を色分けして示す。第3のF10はステムの後に隠れている。VLはH5と接触しないことを注記する。(b)中央のステム領域の表面。1つの単量体を鎖ごとに色分けする。エピトープに沿ったFPの経路(赤)の輪郭を示す。結合に作用していない突然変異を青色とする。2つの単量体において融合ペプチド(FPおよびFP')を可視化する。エピトープ残基は白色(HA2)又は黄色(HA1)で標識した。(c)F10の先端(赤リボン)と選択されたCDR側鎖を示すエピトープの拡大図。界面の1500<sup>2</sup>埋没表面の43%は疎水的相互作用を伴う。(d)HAサブタイプのオーバーレイ:H1、H5およびH9(グループ1)を赤/黄色の影(1RU7、2IBXおよび1JSD)で、H3およびH7(グループ2)を青の影(1MQLおよび1TI8)で示す。ペアワイズオーバーレイのRMSDは0.56±0.11(観察範囲、グループ1)、0.75(グループ2)、そ

してグループ間では  $1.21 \pm 0.12$  である。グループ間の一貫した相違には、 $18_1$  及び  $38_1$  での側鎖方向を交替させるために連結される  $W21_2$  の配位、 $17_1$  でのヒスチジン(グループ2)より大きなチロシン(グループ1)の埋没、そして  $W21_1$  に対して埋没した  $H1s111_2$  (グループ1)のパッキングが含まれる。他のエピトープ残基は丸で囲んだ数字で示す。 $N38_1$  はH3およびH7クラスターにおいてグリコシル化される。(e)  $16$  のHAサブタイプの配列。円は算出結合エネルギーを示す。強 = 青、中間 = 橙、弱 = 青、好ましくない = 黒。着色した強調表示は、クラスターおよびグループ内での配列の保存を示す。融合構造<sup>29</sup>を安定化させるヘリックス内接触のネットワークを配列の下に示す。

【図7】マウスの抗H5 nAbの予防及び治療的有効性を示す。マウスを、致死性ウイルス抗原投与の前又は後に異なる用量のnAbにて処理する。予防有効性(a、b、g及びh)。マウスを、H5N1又はH1N1の10半致死量( $MLD_{50}$ )の鼻腔内投与(i.n.)により、致死性抗原投与の24時間前に抗H5 nAb又はコントロールmAbにて処理した。(a)  $10\text{ mg/kg}$  の3ついずれかのnAbの腹腔内投与(i.p.)によりH5-VN04(A/Vietnam/1203/04(H5N1)、クレイド1)にて抗原刺激したマウスは完全に保護された。低用量の抗体( $2.5\text{ mg/kg}$ )でも非常に保護された。(b) H5-HK97(A/Hong Kong/483/97(H5N1)、クレイド0)ウイルスからの予防的保護は、 $10\text{ mg/kg}$  の3ついずれかのnAbにて処置したマウスの80~100%に観察された。(g) 3ついずれかのnAb( $10\text{ mg/kg}$  の単回注射)により、H1-WSN33(A/WSN/1933(H1N1))ウイルスによる抗原刺激マウスが完全に保護された。(h)  $10\text{ mg/kg}$  を単回注射すると、D8およびF10は、H1-PR34(A/Puerto Rico/8/34(H1N1))にて抗原刺激したマウスを完全に保護した。 $25\text{ mg/kg}$  の抗体が単回注射として投与されると、A66によりマウスが完全に保護された。治療有効性(c-f)。マウスは、H5-VN04を接種し、24、48、72 h p i (c、eおよびf)のnAb、または、24 h p i のH5-HK97を注入した(d)。接種後24時間目(h p i)に $15\text{ mg/kg}$  (ヒトの治療的に達成可能な用量)の3ついずれかのnAbを腹腔内処置すると、H5-VN04又はH5-HK97ウイルスの10倍の $MLD_{50}$ にて抗原刺激したマウスの80~100%が保護された。

【図8】HAタンパク質のSDS-PAGEおよびゲル濾過分析を示す。(a) H5-TH04のHA1(残基11-325)断片に対する個々のHA1標的選別から抗体2Aを得た(左パネル)。ライブラリ選別のために用いたH5-HA(H5-VN04菌株)を右パネルに示す。(b) H5-VN04(H5)およびscFv-F10複合体。HA0は、フューリンとの同時発現によりHA1およびHA2に完全に切断された(左パネル)。複合体は、初めに1:10のモル比でH5とF10を混合することによって形成させ、次いでゲル濾過によって精製した。

【図9】ELISAおよび競合ELISAによる抗H5 scFv-FcのH5又はHA1への結合を示す。(a)  $1\text{ }\mu\text{g/ml}$  の抗H5 scFv-Fcの後にHRP-抗ヒトIgG1を用いて、ELISAプレート上にコートしたHA1(H5-TH04)又はH5(H5-VN04)への抗H5 scFv-Fcの結合を検出した。HA1サブユニットに対して選別した抗体、mAb 2A scFv-FcはHA1およびH5に結合した。10の強力な中和scFv-FcはHA1でなくH5に結合した。(b)  $10^{1.2}\text{ pfu}$  の抗H5ファージ-scFvを、 $5\text{ }\mu\text{g/ml}$  の抗H5 scFv-Fcと混合し、H5(H5-VN04)-コートプレートに加え、洗浄して、その後HRP-抗M13にてH5に結合したファージ-scFvを検出した。mAb 2A-Fcは10のH5選別Abによって認識されるエピトープと競合しなかった。すべてのH5選別scFv-Fcは交差競合した。これらのうち、H5三量体に結合するAb F10(ファージ-scFv)は他のscFv-Fcによる阻害が最も低かったことから、試験したAbすべての中で最も親和性が高いことを示す。

【図10】nAb D8、F10およびA66-IgG1へのH5の結合の動態学的及び熱力学的特徴を示す。nAbは抗ヒトIgG1によりCM4チップに捕獲された。様々な濃

度(20、10、5、2.5、2.5、1.25、0.625 nM)の三量体H5(H5-VN04)をチップ表面に注入した。結合動態は1:1ラングミュア結合モデルを用いて評価した。記録された結合曲線(ブランク対照を減算したもの)と算出されたカーブは、密接に重なり合った。各々の $k_a$ 、 $k_d$ および $K_D$ 値は、3つの実験の平均および標準誤差を表す。

【図11】HAサブタイプ間の系統発生の関係および配列比較を示す。アミノ酸配列に基づくインフルエンザAウイルスの16のHAサブタイプの系統樹。HAサブタイプの4つのクラスターを異なる色で示す。分析のために使用した配列は以下の通りであった。H1(A/South Carolina/1/1918)、H2(A/Japan/305/1957)、H3(A/Aichi/2/1968)、H4(A/duck/Czechoslovakia/56)、H5(A/Vietnam1203/2004)、H6(A/chicken/California/431/00)、H7(A/Netherlands/219/03)、H8(A/turkey/Ontario/6118/68)、H9(A/swine/HK/9/98)、H10(A/chicken/Germany/N49)、H11(A/duck/England/56)、H12(A/duck/Alberta/60/76)、H13(A/gull/Maryland/704/77)、H14(A/mallard/Astrakhan/263/1982)、H15(A/shearwater/West Australia/2576/79)およびH16(A/black-headed gull/Sweden/2/99)。

【図12】H5-VN04抗原投与後、抗H5 nAbにて処置したマウスの肺、脾臓および脳のウイルス力価を示す。BALB/cマウス( $n=5$ )は、10MLD<sub>50</sub>のH5-VN04をi.n.感染させた後、24、48又は72時間目に15mg/kgのmAbを腹腔内注射した。ウイルス力価は、96hpiに採取した肺、脳および脾臓において決定した。データは、ボックスが第25から第75のパーセンタイルまで伸び、中央値に水平線を示す、箱髭様式で表す。箱の上下の髭は極値を示す。スチューデントT検定統計分析の結果は、 $p < 0.05$ を1つの星(\*)、 $p < 0.01$ を2つの星(\*\*)を付して示す。Y軸を越えた矢印は滴定の検出限界を示す。

【図13】H1、H2、H5、H6、H11、H13およびH16を含むすべてのH1クラスターHAへの抗H5 nAb結合のFACS分析を示す。293T細胞に異なるHA発現プラスミドを過渡的に形質移入し、HA発現細胞へのmAb結合をFACSによって分析した。抗SARS mAb 80Rをコントロールとして用いた。2A-FcはH5 HA特異的抗体である。グループ2 HA、H7への結合の欠如も示された。H11、H13およびH16のウイルス株詳細は以下の通りである。H11-MP74(A/Duck/memphis/546/74(H11N9))、H13-MD77(A/Gull/MD/704/77(H13N6))およびH16-DE06(A/Shorebird/DE/172/06(H16N3))。

【発明を実施するための形態】

【0012】

(発明の詳細な説明)

インフルエンザA型は、10のタンパク質をコードする8セグメントのゲノムを有するネガティブセンスの一本鎖RNAウイルスである。それは、ヌクレオキャプシッドおよびマトリクスタンパク質の抗原性によって定義されるように、インフルエンザウイルスA、BおよびCの属を含むファミリーオルソミクソウイルス科に属する。概して、インフルエンザAウイルスはヒトの重症疾患と関係している。インフルエンザAウイルスはさらに、2つの表面タンパク質、細胞侵入のための宿主細胞にウィリオンを付着するヘマグルチニン(HA)と、プロジェニーウイルス又は細胞表面に付着した宿主シアル酸を切断することによってプロジェニーウイルスの拡散を促すノイラミニダーゼ(NA)によってサブタイプ分けされる。

16のHAサブタイプと9のNAサブタイプがあり、HAとNAの様々な組合せによってインフルエンザAウイルスのすべてのサブタイプを成す。16のHAと9のNAウイルスサブタイプのすべての組合せは水鳥に見られる。トリインフルエンザAウイルスの何百

もの菌株の中で、H 5 N 1、H 7 N 3、H 7 N 7 および H 9 N 2 の 4 つだけがヒトの感染を引き起こすことが知られている。通常、これらのウイルスによるヒト感染は、軽度の症状であって重症な疾病をほとんど引き起こさない。唯一、H 7 N 7 によって引き起こされた肺炎の致命的な症例があるのみである。しかしながら、ヒトでは自然免疫がない、病原性の高い H 5 N 1 ウイルスは例外である。RNA ポリメラーゼの不信および宿主免疫の選択圧は、突然変異の蓄積とこれらのタンパク質の表面抗原性の変化をもたらさう。この抗原性変化は抗原ドリフトと呼ばれている。加えて、その分節されたゲノムの結果として、2 つの異なるサブタイプのインフルエンザ A ウイルスが同じ細胞を感染する場合、遺伝子セグメントのシャフリング(組み換え)が起こりうる。例えば、ヒトの H 3 N 2 ウイルスとトリ H 5 N 1 ウイルスは共に、ヒト又は哺乳類種の他の類に感染し、このような現象は新しい H 5 N 2 を生じうる。次いで、この新規のウイルスは、ほとんどすべての遺伝子セグメントがヒトのウイルスから生じているので、ヒトからヒトへ効率よく伝達されうる。このような遺伝子再結合により主要な抗原変化、いわゆる抗原シフトが生じ、世界的な集団のほとんどが再構成ウイルスに対する中和抗体を持っていない。インフルエンザ H 5 N 1 肺炎の高死亡率と加えて、このような状況は、公衆衛生の分野において最も恐れられる状況の一つである。

#### 【 0 0 1 3 】

インフルエンザウイルスヘマグルチニン(血球凝集素)(H A)は、インフルエンザウイルスの可変性の高い抗原であって、細胞へのウイルス侵入を担う。これは三量体前駆体ポリペプチド H A 0 として合成され、単一ジスルフィド結合によって連結される 2 つのポリペプチド H A 1 と H A 2 に翻訳後切断される。H A の H A 1 鎖は細胞表面へのウイルスの接着の原因となる。H A 2 はウイルスとエンドソームの細胞膜との融合を媒介し、細胞質へのリボヌクレオタンパク質複合体の放出を可能とする。H A 1 とは対照的に、H A 2 分子は H A の相対的に保存された部分を表す。第二免疫原性インフルエンザタンパク質はノイラミニダーゼ(N A)である。この四量体糖タンパク質は、プロデューサー細胞上の表面シアル酸からウイルス粒子を放出する原因となり、また、気道の標的細胞への接触を促す際の役割を有しうる。N A に対する中和抗体が動物およびヒトにおいて保護的であるにもかかわらず、その作用機構についての情報は不足している。N 1 ノイラミニダーゼの結晶構造についての最近の報告は、抗体を含む新規の抗インフルエンザ剤を開発するために利用されうるその活性部位に隣接するキャビティの存在を示した。この発見は、H 5 N 1 ウイルスのためのオセルタミビル(タミフル)およびザナミビル(リレンザ)に対する薬剤耐性の出現の報告を考慮すると、特に重要である。

H A の H A 1 と H A 2 鎖は免疫原性であり、ヒトの自然感染の後に両鎖と反応する抗体が示された。H A 1 に特異的な抗体は主に中和であるが、インビトロの H A 1 特異的 M a b によるウイルス中和の異なる機構は、抗体の濃度に応じて、H A 1 上のレセプター部位のブロック、ウイルス - 細胞融合の細胞内阻害、又は同時付着阻害及びウイルス - 細胞融合阻害を含み、記載されている。あまり研究されていないが、抗 H A 2 抗体による細胞融合の阻害が報告されている。

#### 【 0 0 1 4 】

20 年以上前、H 3 サブタイプの H A 分子は、抗原性ドリフト変異および回避変異の H A を配列決定することによって特徴付けされ、抗原エピトープは分子の三次元構造にマップされた。それ以来、トリ病原性ウイルスの H 1、H 2 および H 5 上の抗原性部位は H 3 の三次元構造にマップされた。1997 年の香港におけるヒトの H 5 N 1 感染の発生と、1999 年のヒトの症例からの H 9 N 2 ウイルスの単離の後、両方のタンパク質の X 線構造が解析された。しかしながら、構造解析に用いられた 1997 年のブタ単離物(A / D u c k / S i n g a p o r e / 3 / 9 7)の抗原ドリフトと、最近単離された病原性が高い菌株は意義深いものである。実際、ブタ単離物(A / D u c k / S i n g a p o r e / 3 / 9 7)と H P A I H 5 N 1 株(A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4)との間には、28 のマイナーな変化と 2 つのメジャーになりうる変化がある。

2004 ~ 2005 年の発生からの H 5 H A 遺伝子の系統学的分析により、クレイド

1 及び 2 と称される、H A 遺伝子の 2 つの異なる系統が示された。H P A I H 5 N 1 株 (A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4) はクレイド 1 のメンバーである。これらクレイドのそれぞれのウイルスは地理的にオーバーラップしていないアジア地域に分布している。インドシナからの H 5 N 1 ウイルスはクレイド 1 内に密接に集まっているのに対して、いくつかの周辺国から単離される H 5 N 1 はクレイド 1 単離物とは異なり、分岐したクレイド 2 に属する。クレイド 1 ウイルスは、ベトナム、タイおよびカンボジアのヒトとトリ、そしてラオスおよびマレーシアのトリだけから単離された。クレイド 2 ウイルスは、中国、インドネシア、日本および韓国のトリのみから単離されるウイルスに見られた。ウイルス導入、風土性および進化に関連する疑問を解決するために、最新の疫学研究は、インドネシアおよびベトナム中の家禽、並びに 11 人の南ベトナムのヒト試料から単離された 82 の H 5 N 1 型ウイルスを、公共のデータベースで利用可能な配列データと共に分析した<sup>3</sup><sup>6</sup>。系統学的分析により、インドネシアのウイルスすべてが H 5 N 1 遺伝子型 Z ウイルスの異なるサブ系統を示したことから、この発生は過去 2 年の間に国中への蔓延により単独導入から生じたであろうことが示唆される。インドネシアの継続したウイルス活動は、トリの移動による繰り返された導入というよりも、国内での家禽の移動により伝搬されたものであった。インドネシアおよびベトナム内では、H 5 N 1 ウイルスは、各々の国の中で時間とともに地理的に異なるグループに進化した。

#### 【0015】

近年、A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 4 からの H A の構造が解析された。クレイド 1 及び 2 ウイルスの H P A I 2 0 0 4 年および 2 0 0 5 年の単離物からの H A 遺伝子とそのアミノ酸配列を比較したところ、主にレセプター結合ドメイン周辺に集中しており、残りは退化したエステラーゼドメイン内にある抗原性変異の 13 の位置が同定された。抗原性変異の領域は H 1 および H 3 セロタイプにおいて同定された(図 1 A)。H 1 ではこれらの部位は S a、S b、C a および C b と称され、H 3 では A、B、C および D と称される。H 5 H A の回避変異は 3 つのエピトープに集中している。部位 1 : H 3 の抗原性部位 A と H<sup>2</sup> の C a 2 にオーバーラップする露出したループ(H A 1 1 4 0 - 1 4 5) ; 部位 2 : H 3 セロタイプの抗原性部位 B に相当する H A 1 残基 1 5 6 および 1 5 7 ; そして、3) H 1 H A と H 9 セロタイプの S a 部位に制限される H A 1 1 2 9 - 1 3 3。S m i t h による近年の研究では、アミノ酸レベルでポジティブな選別が検出されると、H A タンパク質の 8 つの残基がポジティブ選択下であったことが示された(図 1 B)。これらの残基には、抗原性部位 A および E の 5 つ(位置 8 3、8 6、1 3 8、1 4 0 および 1 4 1)が含まれ、2 つはレセプター結合に関与し(位置 1 2 9 および 1 7 5)、位置 1 5 6 はレセプター結合部位に近い潜在的な N 結合グリコシル化のための部位である。さらに、結果から、H A 内の 3 つの残基(V a l 8 6、S e r 1 2 9 および T h r 1 5 6)が、ニワトリ又はカモ単離物よりもヒトの単離物において観察されることが多く、ヒトに対する H 5 N 1 遺伝子型 Z の初期適応を表すようであることが明らかとなった。これらの研究のさらに重要な発見は、インドネシアとベトナムとのサブ系統間の系統学的相違はこれら 2 つの群のウイルス間での抗原交差反応の統計学的相違も反映していたことである。具体的には、インドネシアのウイルスは A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4 に対するフェレット抗血清に応答せず、ベトナムの代表的なウイルスはインドネシアウイルス I D N / 5 / 0 6 および D k / I D N / M S / 0 4 に対するフェレット抗血清に応答しなかった。これらの所見は、系統学的にだけでなく抗原的に異なっているヒトの 1 9 9 7 年と 2 0 0 3 年の H 5 N 1 ウイルスと免疫ヒト血清による以前の研究と一致している。ゆえに、自然変異並びに回避変異は、ウイルスの継続した進化が菌株(一又は複数)が受動的および能動的な免疫化に用いられるべきかの決定に影響を与えうることを示唆している。

本発明は、ヒト抗インフルエンザモノクローナル抗体の同定、製造及び特徴付けのための方法を提供する。

#### 【0016】

s c F v 及びモノクローナル抗体の同定と特徴付け

高親和性、交差サブタイプの広く中和するヒト抗 H A m A b が同定された。これら n

A b は、立体構造変化の重要な成分(融合ペプチドとヘリックス  $\alpha$  A の露出した表面)が非常に同格にあるポイントのステム領域内の新規の高く保存された中和エピトープを認識することによって接着後の融合プロセスを阻害する。16 すべての H A サブタイプの構造及び配列分析により、H A の 2 つの系統学的グループ分け(グループ 1 および 2)に一致する、2 つのみのエピトープの変異の存在を示す。これらの結果は、各群のサブセットから得られる n A b のわずかな反応混液が季節性で全国的に流行しているインフルエンザの幅広い予防を可能にしようという可能性を示す。

最近の報告は、H 5 N 1 感染患者の免疫細胞を利用して抗 H A n A b を単離していた。しかしながら、それらのエピトープや作用様式は報告されなかった。珍しいことに、我々は、同じ V H 生殖系統遺伝子 I G H V 1 - 6 9 \* 0 1 を利用し、Y 1 0 2 と同等の位置にチロシンを含む C D R 3 ループをコードする n A b を非免疫ライブラリから繰り返し単離した。これは、おそらく以前に H 1 に、そして 1 9 6 8 年以前に生まれたライブラリドナーでは H 2 サブタイプに曝露したために、広い抗 H A 交差免疫が H 5 ナイプ集団に既に存在していることを示唆する。この生殖系統 V H セグメントの反復使用、N 挿入および/または生殖系統 D 遺伝子アセンブリにより導入される C D R 3 チロシンの共通性、および両研究において発見された n A b による V L 遺伝子のランダムな使用は、このエピトープを認識することができる再編成された V H セグメントの前駆体頻度が重要であることを示唆する。これは、本明細書において同定された F 1 0 エピトープへの適切な曝露により、これら広域スペクトルの n A b はインビボで容易に誘導されうる可能性を示す。両群のウイルスサブタイプに対して万能的に保護するために必要とされる n A b の遺伝学的及び構造的な複雑さは以前として未知であるが、我々のデータは驚くほど単純な解決策を示すであろう。

#### 【0017】

3 つの異なる抗 H A - 1 s c F v が、5 8 の H A - 1 ポジティブクローンの配列決定分析によって同定された。これらの s c F v を 3 8 B および 1 C とした。2 A の V H および V L アミノ酸配列を表 1 B に示す。

1 0 の異なる抗 H A 0 s c F v が、9 7 の H A 0 ポジティブクローンの配列決定分析によって同定された。これらの s c F v を 7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 及び 9 8 とした。6 の異なる V H と 1 0 の異なる V L 遺伝子が明らかとなった。いくつかの s c F v は同じ V H 遺伝子を共有していた。6 の異なる V H 遺伝子のうちの 5 つは、I G H V 1 - 6 9 遺伝子ファミリーに属した。1 0 の V L 遺伝子のうちの 3 つは  $\kappa$  鎖であった。

2 A s c F v は中程度の中和抗体であり、3 8 B 及び 1 C は非中和抗体である。1 0 の s c F v、7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 および 9 8 は強力な中和抗体である(図 6)。

#### 【0018】

中和インフルエンザ抗体の核酸およびアミノ酸配列を以下に示す。

表 1A. 抗体 2A 可変領域核酸配列

2A の V<sub>H</sub> 鎖 (配列番号:1)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGTGACAATGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCAGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGGGGCATCATTCCCTA  
TCTTTGGAAAACCAAACCTACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACTGCGGACGAATCCACGAGCACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTTTATTACTGTGCGAGAGATTAGACGCGTATTACTATGGTTC  
GGGGGGTATGGACGTCTGGGGCCAAGGCACCTGGTCAACGTCTCCTCA

2A の V<sub>L</sub> 鎖 (配列番号:3)

CTGCCTGTGCTGACTCAATCATCCTCTGCCTCTGCTTCCCTGGGATCCTCGGTCAAGCTCACCTGCACTCTGAGCAGTGG  
GCATAGTAACATACATCATCGCATGGCATCAACAGCAGCCAGGGAAGGCCCTCGGTACTTGATGAAGGTTAATAGTGATG  
GCAGCCACACCAAGGGGGACGGGATCCCTGATCGTTCTCAGGCTCCAGCTCTGGGGCTGACCGCTACCTCACCATCTCC  
AACCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTAGTTATTTCTGTGAGACCTGGGACACTAAGATTATGTCTTCGGAAGTGGGACCAA  
GGTCTCCGTCTCAG

表 1B. 抗体 2A 可変領域アミノ酸配列

2A の V<sub>H</sub> 鎖 (配列番号: 2)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSDNAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPIFGKPNYAQKFQGRVTITADESTSTAY  
MDLRSLRSEDTAVYYCARDSDAYYYGSGGMDVWGQGTLVTVSS

2A の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:4)

LPVLTQSSSASASLGSSVKLTCTLSSGHSNYIIAWHQQPGKAPRYLMKVNSDGSHTKGDGIPDRFSGSSSGADRYLTIS  
NLQSEDEASYFCETWDTKIHVFGTGTKVSVL

表 1C. 抗体 D7 可変領域核酸配列

D7 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:5)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTCCTGGAGG  
TATCTTCAACACCAATGCTTTCAGCTGGGTCCGACAGGCCCTGGACAAGGTCTTGAGTGGGTGGGAGGGGTCATCCCTT  
TGTTTTGAACAGCAAGCTACGCACAGAACGTCCAGGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCTAC  
ATGGAGCTTACCAGCCTGAGATCTGCGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAAGTAGTGGTTACCATTTTAGGAGTCA  
CTTTGACTCCTGGGGCCTGGGAACCCTGGTCAACGTCTCCTCA

D7 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:9)

AATTTTATGCTGACTCAGCCCCACTCTGTGTGCGCGTCTCCGGGGAAGACGGTGACCATCTCCTGCACCGGCAGCAGTGG  
CAACATTGCCGCCAACTATGTGCAGTGGTACCAACAACGTCCGGGCAGTGCCCCACTACTGTGATCTATGAGGATGACC  
GAAGACCCTCTGGGGTCCCTGATCGGTTCTCTGGCTCCATCGACAGGTCTCCAACCTCTGCCTCCCTCACCATCTCAGGA  
CTGAAGACTGAGGACGAGGCTGACTACTACTGTGACTTATGATACCAACAATCATGCTGTGTTTCGGAGGAGGCACCCA  
CCTGACCGTCCTC

表 1D. 抗体 H98 可変領域核酸配列

H98 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:7)

CAGGTGCAGCTGGTGCATCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTCCTGGAGG  
TATCTTCAACACCAATGCTTTCAGCTGGGTCCGACAGGCCCTGGACAAGGTCTTGAGTGGGTGGGAGGGGTCATCCCTT  
TGTTTTCGAACAGCAAGCTACGCACAGAACGTCCAGGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCTAC  
ATGGAGCTTACCAGCCTGAGATCTGCGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAAGTAGTGGTTACCATTTTAGGAGTCA  
CTTTGACTCCTGGGGCCTGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

H98 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:11)

TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGAAACACGGGCAGAGGGTCACCATCTCTTGTCTGGAGGCACCTC  
CAACATCGGACGTAATCATGTAACTGGTACCAGCAACTCCCAGGAACGGCCCCAACTCCTCATCTATAGTAATGAAC  
AGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAATCTGGCACCTCCGCCTCCCTGGCCGTGAGTGGGCTCCAG  
TCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGTGCATCATGGGATGACAACCTGAGTGGTTGGGTGTTGGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

表 1E. 抗体 D7 及び H98 可変領域鎖アミノ酸配列

D7 及び H98 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:6)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKAPGGIFNTNAFSWVRQAPGQGLEWVGVIPLFRTASYAQNVQGRVTITADESTNTAY  
MELTSLRSADTAVYYCARSSGYHFRSHFDSWGLGTLTVSS

D7 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:8)

NFMLTQPHSVSASPGKTVTISCTGSSGNIAANYVQWYQQRPGSAPTTVIYEDDRPSGVPDRFSGSIDRSSNSASLTISG  
LKTEDEADYYCQTYDTNNHAVFGGTHLTVL

H98 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:10)

SYELTQPPSASGKHGQRVTISCSGGTSNIGRNHVNWYQQLPGTAPKLLIYSNEQRPSGVPDRFSGSKSGTSASLAVSGLQ  
SEDEADYYCASWDDNLSGWVFGGGTKLTVL

表 1F. 抗体 D8 可変領域核酸配列

D8 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:13)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGCGCTTATGCTTTCACCTGGGTGCGGCAGGCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGCATCACCGGAA  
TGTTTGGCACAGCAAACTACGCACAGAAGTTCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAACACGAGCACAGCCTAC  
ATGGAGTTGAGCTCCCTGACATCTGAAGACACGGCCCTTTATTATTGTGCGAGAGGATTGTATTACTATGAGAGTAGTCT  
TGACTATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAG

D8 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:17)

CAGTCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCCGCGTCCGGGTCTCCTGGACAGTCAGTCACCATCTCCTGCACTGGAACCAGCAG  
TGACGTTGGTGGTTATAACTCTGTCTCCTGGTACCAACAGCACCCAGGCAAAGCCCCAACTCATGATTTATGAGGTCA  
CTAAGCGGCCCTCAGGGTCCCTGATCGCTTCTCTGCCTCCAAGTCTGGCAACACGGCCTCCCTGACCGTCTCTGGGCTC  
CAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTTCTGCTGCTCATATGCAGGCCACAGTGCTTATGTCTTCGGAACCTGGGACCAAGGT  
CACCGTCCTG

表 1G. 抗体 D80 可変領域核酸配列

D80 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:15)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCCTCGGTGAAGGTCTCCTGCAGGGCTTCTGGAGG  
CACCTTCAGCGCTTATGCTTTCACCTGGGTGCGGCAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGCATCACCGGAA  
TGTTTGGCACAGCAAACTACGCACAGAAGTTCCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAACTCACGAGCACAGCCTAC  
ATGGAGTTGAGCTCCCTGACATCTGAAGACACGGCCCTTTATTATTGTGCGAGAGGATTGTATTACTATGAGAGTAGTCT  
TGACTATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAG

D80 の V<sub>K</sub> 鎖(配列番号:19)

GAAATTGTGCTGACTCAGTCTCCAGGCACCCTGTCTTTGTCTCCAGGGGAAAGAGCCACCCTCTCCTGCAGGGCCAGTCA  
GAGTCTTAGCAGCAAGTACTTAGCCTGGTATCAGCAGAAACCTGGCCAGGCTCCCAGGCTCCTCATCTATGGTGCATCCA  
GCAGGGCCACTGGCATCCCAGACAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACCCTCACCATCAGTAGACTGGAG  
CCTGAAGATTTTGCAGTGATTCCTGTGACAGTATGATGGCGTACCTCGGACGTTTCGGCCAAGGGACCACGGTGGAAAT  
CAAA

表 1H. 抗体 D8 及び D80 可変領域鎖アミノ酸配列

D8 及び D80 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:12)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTFSAYFTWVRQAPGQGLEWMGGITGMFGTANYAQKFQGRVTITADELTSTAY  
MELSSLTSEDALYYCARGLYYYESSLDYWGQGLTVTVSS

D8 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:14)

QSVLTQPPSASGSPGQSVTISCTGTSSDVGGYNSVSWYQQHPGKAPKLMIEVTKRPSGVPDRFSASKSGNTASLTVSGL  
QAEDEADYFCCSYAGHSAYVFGTGTKVTVL

D80 の V<sub>K</sub> 鎖(配列番号:16)

EIVLTQSPGTLSPGERATLSCRASQSLSSKYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLE  
PEDFAVYSCQQYDGVPRFTFGQGTVEIK

表 1I. 抗体 F10 可変領域核酸配列

F10 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:21)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCAGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCCTCGGTGAAGGTCTCCTGCACGTCCTCTGAAGT  
CACCTTCAGTAGTTTTGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGCTGGGAGGGATCAGCCCTA  
TGTTTGGAAACACCTAATTACGCGCAGAAGTTCCAAGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACCAGTCCACGAGGACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTGTATTATTGTGCGAGATCTCCTTCTTACATTTGTTCTGGTGG  
AACCTGCGTCTTTGACCATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

F10 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:25)

CAGCCTGGGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCCAAGGGCTTGAGACAGACCGCCACACTCACCTGCACTGGGAACAGCAA  
CAATGTTGGCAACCAAGGAGCAGCTTGGCTGCAGCAGCACCAGGGCCACCCTCCCAAACCTCCTATCCTACAGGAATAATG  
ACCGGCCCTCAGGGATCTCAGAGAGATTCTCTGCATCCAGGTCAGGAAACACAGCCTCCCTGACCATTACTGGACTCCAG  
CCTGAGGACGAGGCTGACTATTACTGCTCAACATGGGACAGCAGCCTCAGTGCTGTGGTATTTCGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

表 1J. 抗体 E90 可変領域核酸配列

E90 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:23)

CAGGTACAGCTGCAGCAGTCAGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGTCTCGGTGAAGGTCTCCTGCACGTCCTCTGAAGT  
CACCTTCAGTAGTTTTGCTATCAGCTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGCTGGGAGGGATCAGCCCTA  
TGTTTTGGAACACCTAATTACGCGCAGAAAGTTCCAAGGCAGAGTCACCATTACCGCGGACCAGTCCACGAGGACAGCCTAC  
ATGGACCTGAGGAGCCTGAGATCTGAGGACACGGCCGTGTATTATTGTGCGAGATCTCCTTCTTACATTTGTTCTGGTGG  
AACCTGCGTCTTTGACCATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCA

E90 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:27)

GACATCCAGATGACCCAGTCTCCATCCTCCCTGTCTGCATCTGTAGGAGACAGAGTCACCATCACTTGCCGGGCAAGTCA  
GAGCATTAGCAGCTATTTAAATTGGTATCAGCAGAAACCAGGGAAAGCCCCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATCCAGTT  
TGCAAAGAGGGGTCCCATCAAGGTTCACTGGCAGTGGATCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATTAGCAGCCTGCAGCCT  
GAAGATTTTGCAGTGTATTACTGTCAGCAGTATGATAGTTTACCGTACACTTTTGGCCAGGGGACCAAGGTAGAGATCAA  
A

表 1K. 抗体 F10 及び E90 可変領域アミノ酸配列

F10 及び E90 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:18)

QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCTSSEVTFSSFAISWVRQAPGQGLEWLGGISPMFGTPNYAQKFQGRVTITADQSTRTAY  
MDLRSLRSEDTAVYYCARSPSYICSGGTCTVFDHWGQGLTVTVSS

F10 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:20)

QPGLTQPPSVSKGLRQTATLTCTGNSNNVGNQGAAWLQQHQGHPPKLLSYRNNDRPSGISERFSASRSGNTASLTITGLQ  
PEDEADYYCSTWDSSLSAVVFVGGGTKLTVL

E90 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:22)

DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRASQSISSYLWYQQKPGKAPKLLIYAASSLQRGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQP  
EDFAVYYCQQYDSSPYTFGQGTKVEIK

表 1L. 抗体 G17 可変領域核酸配列

G17 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:29)

CAGGTGCAGCTGGTGCAATCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAAGGTCTCCTGCAAGACTTCTGGAGT  
CACCTTCAGCAGCTATGCTATCAGTTGGGTGCGACAGGCCCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGAGGGATCATCGGTG  
TCTTTGGTGTACCAAAGTACGCGCAGAACTTCCAGGGCAGAGTCACAATTACCGCGGACAAACCGACGAGTACAGTCTAC  
ATGGAGCTGAACAGCCTGAGAGCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAGAGCCCGGGTACTACGTAGGAAAGAA  
TGTTTTTGATGTCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA

G17 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:31)

TCCTATGAGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTCCAAGGGCTTGAGACAGACCGCCATACTCACCTGCACTGGAGACAGCAA  
CAATGTTGGCCACCAAGGTACAGCTTGGCTGCAACAACACCAGGGCCACCCTCCCAAACCTCCTATCCTACAGGAATGGCA  
ACCGGCCCTCAGGGATCTCAGAGAGATTCTCTGCATCCAGGTGAGGAAATACAGCCTCCCTGACCATTATTGGACTCCAG  
CCTGAGGACGAGGCTGACTACTACTGCTCAGTATGGGACAGCAGCCTCAGTGCCTGGGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGCT  
GACCGTCCTA

表 1M. 抗体 G17 可変領域アミノ酸配列

G17 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:24)

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKTSGVTFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGGIIGVFGVPKYAQNFQGRVTITADKPTSTVY  
MELNSLRAEDTAVYYCAREPGYYVGKNGFDVWGQGTMTVSS

G17 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:26)

SYELTQPPSVSKGLRQTALITCTGDSNNVGHQGTAWLQQHQGHPPKLLSYRNGNRPSGISERFSASRSGNTASLTIIIGLQ  
PEDEADYYCSVWDSLSAWVFGGGTKLTVL

表 1N. 抗体 H40 可変領域核酸配列

H40 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:33)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAGGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAAGGTCTCATGTAAGGCTTCTGGATA  
CACCTTCACCGTTATTATATTACTGGGTGCGACAGGCCCTGGACAAGGACTTGAGTGGATGGGTGGATCAACCCTA  
TGACTGGTGGCACAACCTATGCACAGAAGTTTCAGGTCTGGGTACCATGACCCGGGACACGTCCATCAACACAGCCTAC  
ATGGAGGTGAGCAGGCTGACATCTGACGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGGGGGGCTCCGTATTACGATATTTTGA  
CTGGCAGCCCGAGGCTCTTGATATCTGGGGCTCGGGACCACGGTCACCGTCTCCTCA

H40 の V<sub>L</sub> 鎖(配列番号:35)

CAGCCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCGGTGTGAGTGGCCCCAGGACAGACGGCCAGCATTCCCTGTGGGGGGAACAACAT  
TGGAGGCTACAGTGTACACTGGTACCAACAAAAGCCGGGCCAGGCCCCCTCTTGGTCATTTATGACGATAAAGACCGGC  
CCTCAGGGATCCCTGAGCGATTCTCTGGCGCAACTCTGGGAGCACGGCCACCCTGACAATCAGCAGGGTCGAAGCCGGG  
GATGAGGGCGACTACTACTGTGAGGTGTGGGATAGTGGTAATGATCGTCCGCTGTTTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGT  
CCTA

表 1O. 抗体 H40 可変領域アミノ酸配列

H40 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:28)

QVQLVQSGAEVRKPGASVKVSCKASGYTFTGYIHWVRQAPGQGLEWMGWINPMTGGTNYAQKFQVWVTMTRDTSINTAY  
MEVSRILTSDDTAVYYCARGASVLRVFDWQPEALDIWGLGTTVTVSS

H40V<sub>L</sub> 鎖 (配列番号:30)

QPVLTPPPSVSVAPGQTASIPCGNNIGGYSVHWYQQKPGQAPLLVIYDDKDRPSGIPERFSGANSSTATLTISRVEAG  
DEGDYYCQVWDSGNDRLPFGGGTKLTVL

表 1P. 抗体 A66 可変領域核酸配列

A66 の V<sub>H</sub> 鎖(配列番号:37)

CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGCTCCTCGGTGAAGGTTTCTTGCAAGGCTTCTGGAGG  
CCCCTTCAGCATGACTGCTTTACCTGGCTGCGACAGGCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGTGGGATCAGCCCTA  
TCTTTTCGTACACCGAAGTACGCACAGAAGTTCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGACGAATCCACGAACACAGCCAAC  
ATGGAGCTGACCAGCCTGAAATCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAACCCCTTCTCCTACCAACCGAATAA  
TGATGCTTTTGTCTATCTGGGGCCAAGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA

A66 の V<sub>K</sub> 鎖 (配列番号:39)

GAAATTGTGTTGACGAGTCTCCAGCCACCCTGTCTTTGTCTCCAGGGGAAAGAGCCACCCTCTCCTGCAGGGCCAGTCA  
GAGTGTTAGCAGCTACTTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGCCAGGCTCCCAGGCTCCTCATCTATGATGCATCCAACA  
GGGCCACTGGCATCCAGCCAGGTTCACTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATCAGCAGACTGGAGCCT  
GAAGATTTTGCAGTCTATTTCTGTGACGAGTATGGTAGCTCACCTCAATTCGGCCAAGGGACACGACTGGAGATTAA

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>表 1Q. 抗体 A66 可変領域アミノ酸配列</b>                                                                                             |
| A66 の V <sub>H</sub> 鎖(配列番号:32)                                                                                            |
| QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGPFSTAFWLRQAPGQGLEWMGGISPIFRTPKYAQKFQGRVTITADESTNTAN<br>MELTSLKSEDTAVYYCARTLSSYQPNDAFAIWGQGMVTVSS |
| A66 の V <sub>K</sub> 鎖(配列番号:34)                                                                                            |
| EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISRLEP<br>EDFAVYFCQQYGSSPQFGQGTRLEIK             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>表 1R. 抗体 E88 可変領域核酸配列</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E88 の V <sub>H</sub> 鎖(配列番号:40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAAGTGAAGAAGCCTGGCTCCTCGGTGAAGGTTTCCTGCAAGGCTTCTGGAGG<br>CCCCTTCAGCATGACTGCTTTTACCTGGCTGCGACAGGCCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGTGGGATCAGCCCTA<br>TCTTTCGTACACCGAAGTACGCACAGAAGTTCAGGGCAGAGTCACGATTACCGCGGACGAATCCACGAACACAGCCAAC<br>ATGGAGCTGACCAGCCTGAAATCTGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAACCCTTTCCTCCTACCAACCGAATAA<br>TGATGCTTTTGCTATCTGGGGCCAAGGGACAATGGTCACCGTCTCTTCA |
| E88 の V <sub>L</sub> 鎖(配列番号:42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CTGCCTGTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCACCATCTCTTGTCTGGAAGCAGCTC<br>CAACATCGGAAGTAATACTGTAACTGGTACCAGCAGCTCCCAGGAACGGCCCCAACTCCTCATCTATAGTAATAATC<br>AGCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAGGTCAGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCATCATTGGACTCCGG<br>CCTGAGGATGAAGCTGATTATTACTGTCTGATCGTATGACAGCAGGCTCAGTGCTTCTCTCTTCGGAAGTGGGACCACGGT<br>CACCGTCCTC                                         |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>表 1S. 抗体 E88 可変領域アミノ酸配列</b>                                                                                             |
| E88 の V <sub>H</sub> 鎖(配列番号:36)                                                                                            |
| QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGPFSTAFWLRQAPGQGLEWMGGISPIFRTPKYAQKFQGRVTITADESTNTAN<br>MELTSLKSEDTAVYYCARTLSSYQPNDAFAIWGQGMVTVSS |
| E88 の V <sub>L</sub> 鎖(配列番号:38)                                                                                            |
| LPVLTQPPSASGTPGQRTVITSCGSSSNIGSNTVNWYQQLPGTAPKLLIYSNNQRPSGVPDRFSGSRSGTSASLAIIGLR<br>PEDEADYYCQSYDSRLSASLFGTGTTTVTL         |

## 【 0 0 1 9 】

中和インフルエンザ抗体の重鎖および軽鎖の相補性決定領域のアミノ酸配列を以下の表 2 および図 3 に示す。

表 2

| 抗体        | CDR1                      | CDR2                         | CDR3                         |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| コンセンサス    | SYAFS (配列番号: 43)          | GIIPMFGTPNYAQKFQG (配列番号: 51) | SSGYYYG GGFDV (配列番号: 59)     |
| D7/H98VH  | TNAFS (配列番号: 44)          | GVIPLFRTASYAQNQQG (配列番号: 52) | SSGYHFGGRSHFDS (配列番号: 60)    |
| D8/D80VH  | AYAFT (配列番号: 45)          | GIIGMFGTANYAQKFQG (配列番号: 53) | GLYYYESSLDY (配列番号: 61)       |
| F10/90VH  | SFAIS (配列番号: 46)          | GISPMFGTPNYAQKFQG (配列番号: 54) | SPSYICSGGTCVFDH (配列番号: 62)   |
| G17VH     | SYAIS (配列番号: 47)          | GIIGVFGVPKYAQKFQG (配列番号: 55) | EPGYVVGKNGFDV (配列番号: 63)     |
| H40VH     | GYIIH (配列番号: 48)          | WINPMTGGTNYAQKFQV (配列番号: 56) | GASVLRVFDWQPEALDI (配列番号: 64) |
| A66VH     | MTAFT (配列番号: 49)          | GISPIFRTPKYAQKFQG (配列番号: 57) | TLSSYQPNNDFAI (配列番号: 65)     |
| 2AVH      | DNAIS (配列番号: 50)          | GIIPFGKPNYAQKFQG (配列番号: 58)  | DSDAYYYGSGGMDV (配列番号: 66)    |
|           |                           |                              |                              |
| CONSENSUS | TGSSSNIGNYVA (配列番号: 67)   | SNSDRPS (配列番号: 79)           | QSYDSL SAYV (配列番号: 91)       |
| D7VL      | TGSSSNIANYVQ (配列番号: 68)   | EDDRRPS (配列番号: 80)           | QSYDTNNHAV (配列番号: 92)        |
| DD8VL     | TGTSSDVGGYNSVS (配列番号: 69) | EVTKRPS (配列番号: 81)           | CSYAGHSAYV (配列番号: 93)        |
| F10VL     | TGSSNNVGNQGAA (配列番号: 70)  | RNNDRPS (配列番号: 82)           | STWDSSLSAVV (配列番号: 94)       |
| G17VH     | TGDSNNVGHQGT A (配列番号: 71) | RNGNRPS (配列番号: 83)           | SVWDSSLSAWV (配列番号: 95)       |
| H40VH     | GGNNIGGYSVH (配列番号: 72)    | DDKDRPS (配列番号: 84)           | QVWDSGNDRPL (配列番号: 96)       |
| A66VH     | RASQSVSSYLA (配列番号: 73)    | DASNRAT (配列番号: 85)           | QQYGSSPQV (配列番号: 97)         |
| D80VL     | RASQSLSSKYLA (配列番号: 74)   | GASSRAT (配列番号: 86)           | QQYDGVPR T (配列番号: 98)        |
| E88VL     | TGSSSNIGNYVA (配列番号: 75)   | SNNQRPS (配列番号: 87)           | QSYDSRLSASL (配列番号: 99)       |
| E90VK     | SGSSSNIGSNTVN (配列番号: 76)  | AASSLQR (配列番号: 88)           | QQYDSSPYT (配列番号: 100)        |
| H98VL     | RASQSISSYLN (配列番号: 77)    | SNEQRPS (配列番号: 89)           | ASWDDNLSGWV (配列番号: 101)      |
| 2AVL      | TLSSGHSNYIIA (配列番号: 78)   | VNSDGSHTKGD (配列番号: 90)       | ETWDTKIHV (配列番号: 102)        |

当業者は、異なる結合親和性を有する更なる s c F v やモノクローナル抗体が治療的に有効となりうることを理解するであろう。例えば、およそ 1 p M からおよそ 2 0 0 m M の結合親和性を有する抗体および s c F v もまた治療的に有効となりうる。

#### 【 0 0 2 0 】

抗インフルエンザ抗体による H 5 N 1 の中和。

H - 5 偽型ウイルスは、二価の s c F v と完全長抗体と共にインキュベートし、抗体 - ウイルス混合物を 2 9 3 T 細胞と接触させた。感染力は、標的細胞におけるルシフェラーゼ活性を測定することによって定量化した。D 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0 および H 9 8 抗体は、H 5 に対して強力な中和活性を有する。また、D 8、F 1 0 および A 6 6 抗体は、H 1 N 1 を交差中和し、株 H 1 - S C / 1 9 1 8 を強力に中和し、株 H 1 - P R - 3 4 を中程度に中和した(図 4 A 及び 4 B)。

#### 【 0 0 2 1 】

8、1 0、6 6 のエピトープの特徴づけ。

インフルエンザヘマグルチニン(H A)タンパク質に対する 8、1 0 及び 6 6 の結合の一

次エピトープマッピングにより、これら3つの抗体のエピトープが類似しており、H A 1の位置307に、そして、H A 2の位置52、59、65および93に位置することが示された。このエピトープは、ウイルスによって脱落されないヘマグルチニンタンパク質を含む。ウイルスによって脱落されるノイラミニダーゼタンパク質を結合するほとんどの他の公知の抗インフルエンザ抗体とは異なっている。

#### 【0022】

n A b エピトープの構造的特徴づけ

3.2 解像度のH A (H 5-V N 0 4)と複合体化したs c F v断片の結晶構造を解析することと突然変異誘発による、n A bの一つであるF 1 0のエピトープと結合様式。(図6および表4)。

複合体において、各々のH 5三量体は、1抗体当たりおよそ1500<sup>2</sup>のタンパク質表面を埋没している、対称性-関連部位で、F 1 0の3つの分子を結合する。H 5自体の構造はF 1 0結合によってほとんど変化されない。H Aは単鎖のH A 0として合成され、2つのサブユニット、H A 1およびH A 2にタンパク質分解性切断される。切断により、膜近位ステムに「融合ペプチド」(H A 2の初めのおよそ21残基を含む)が埋没される。F 1 0結合はもっぱらこの領域でのみ起こり(図6)、融合ペプチド、中性pH配座の場所に該ペプチドを固定するH A 1とH A 2のエLEMENT(いずれもこの領域の構造に不可欠なもの)、並びに酸性pHで大きな構造変化を受ける大きなH A 2のらせん状ヘアピンと密接に接触し、このウイルス膜近位のポケットからウイルスの遠位の表面へ該融合ペプチドを押し出す。これがエンドソーム膜との融合を引き起こす。

#### 【0023】

F 1 0の重鎖はH 5結合に主に役割があり、その3つの相補性決定領域(C D R)の先端を利用する。各F 1 0分子は、H A三量体の単一の単量体内のH A 1及びH A 2サブユニットの両方と接触する(図6)。接触領域は、H A 2融合ペプチドの一部によって形成されるポケットと、一端にH A 1のエLEMENTと他端にH A 2のヘリックスα Aの露出面とを含む(図6)。主要な接触点の3組の抗体残基 - C D R H 2のF 5 5及びM 5 4とC D R H 3のY 1 0 2。F 5 5のフェニル環は、融合ペプチドループの突出したループ(H A 2残基D G W 1 9<sub>2</sub> - 2 1<sub>2</sub>(H 3番号付け様式;下つき文字の1および2はH A 1およびH A 2鎖を指す))と、ポケットの背面を形成する2つの隣接ヒスチジン(残基1 8<sub>1</sub>および3 8<sub>1</sub>)およびトリプトファンの芳香族側鎖、W 2 1<sub>2</sub>によって形成される平坦な表面全体に位置する。また、M 5 4の側鎖は、W 2 1<sub>2</sub>およびH 3 8<sub>1</sub>の芳香族環、並びにヘリックスα AのI 4 5<sub>2</sub>の側鎖と接するが、主鎖のカルボニル酸素はH 3 8<sub>1</sub>の側鎖と水素結合する。Y 1 0 2は、その側鎖を、α Aヘリックスの4つの側鎖と、融合ペプチドの主鎖カルボニル(D 1 9 2)に対する水素結合によってつくられる疎水性間隙(c r e v i c e)に嵌入する。C D R H 1ループは、ヘッド領域の基部のH A 1のループとヘリックスα AのC末端と複数回接触する(図6 B及び6 C)。

同時に、エピトープを定めるためにヘリックスα A上で突然変異誘発実験を行った(図6)。抗体と直接接触する3つの残基の突然変異: V 5 2 A / E、N 5 3 AおよびI 5 6 Aは抗体の結合を有意に低減又は取り除いたのに対して、保存的突然変異であるV 5 2 Lは効果がなかった。コントロールとして、抗体と接触しないヘリックスの異なる露出面上の突然変異は抗体結合に対して効果がなかった(図4 D)。ゆえに、α Aヘリックスの突然変異誘発は、F 1 0について結晶学的に定められるエピトープと十分に一致している。さらに、他の2つのn A b(構造的データはない)がほぼ同じ変異-n A b結合性質を示したことから、密接にオーバーラップするエピトープが示唆され、競合的結合と一致していた(図6、図9)。まとめると、我々は、3つすべてのn A bが、ある領域内のH Aの中性pH構造を安定化することによってウイルスを中和し、この領域が膜融合状態を引き起こす構造変化の引き金(ポケットからの融合ペプチドの起こりうる放出)となると結論づけた。

#### 【0024】

抗体

本明細書中で用いる「抗体」なる用語は、免疫グロブリン分子および免疫グロブリン(

I g) 分子の免疫学的に活性な部位、すなわち抗原を特異的に結合する(と免疫応答する)抗原結合部位を含む分子を指す。「特異的に結合する」又は「免疫応答する」とは、抗体が所望の抗原の一又は複数の抗原決定基と反応して、他のポリペプチドとは反応しないことを意味する。抗体には、ポリクローナル、モノクローナル、キメラ、d A b (ドメイン抗体)、単鎖、 $F_{ab}$ 、 $F_{ab'}$ 、及び  $F_{(ab')_2}$  断片、s c F v および  $F_{ab}$  発現ライブラリが含まれるがこれらに限定されない。

単鎖 F v (「s c F v」)ポリペプチド分子は、共有結合した V H : : V L ヘテロ二量体であり、ペプチドコードリンカーによって連結した V H - 及び V L - コード遺伝子を含む遺伝子融合から発現されうる。(Huston et al. (1988) Proc Nat Acad Sci USA 85(16): 5879-5883を参照)。自然に凝集するが化学的に分離される、抗体 V 領域の軽鎖及び重鎖のポリペプチドを s c F v 分子に転換するための化学構造を識別するための多くの方法が記載されている。この s c F v 分子は抗原結合部位の構造と実質的に類似する三次元構造にホールドする。例として米国特許第 5 0 9 1 5 1 3 号 ; 同第 5 1 3 2 4 0 5 号 ; 及び同第 4 9 4 6 7 7 8 号を参照。

#### 【 0 0 2 5 】

大量の標的分子に対して再編成された抗体遺伝子の大きな供与源を提供するために、非常に大きなナイーブヒト s c F v ライブラリがあり、作製されうる。疾患特異的な抗体を単離するために、感染症を有する個体から小さいライブラリが造られうる。(Barbas et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:9339-43 (1992); Zebedee et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:3175-79 (1992)を参照)。

通常、ヒトから得られた抗体分子は、クラス I g G、I g M、I g A、I g E および I g D の何れかに関連しており、分子に存在する重鎖の性質によって互いに異なる。あるクラスは、同様に I g G<sub>1</sub>、I g G<sub>2</sub> 及びその他のようなサブクラスを有する。さらに、ヒトでは、軽鎖は  $\kappa$  鎖又は  $\lambda$  鎖であってよい。

#### 【 0 0 2 6 】

「抗原結合部位」又は「結合部分」なる用語は、抗原結合に参加する免疫グロブリン分子の一部を指す。抗原結合部位は、重鎖(「H」)及び軽鎖(「L」)の N 末端可変(「V」)領域のアミノ酸残基によって形成される。重鎖および軽鎖の V 領域内の 3 つの非常に異なる範囲(stretch)は、「高頻度可変領域」と称され、「フレームワーク領域」又は「F R」として知られる保存された隣接範囲の間に配置する。ゆえに、「F R」なる用語は、免疫グロブリン内の高頻度可変領域間に天然に見られ、その領域に隣接しているアミノ酸配列を指す。抗体分子において、軽鎖の 3 つの高頻度可変領域と重鎖の 3 つの高頻度可変領域は、三次元空間内で互に関連して整理され、抗原結合界面を形成する。抗原結合界面は、結合した抗原の三次元界面に相補的であり、重鎖および軽鎖各々 3 つの高頻度可変領域は「相補性決定領域」又は「C D R」と称される。

本明細書中で用いる「エピトープ」なる用語には、免疫グロブリンに特異的に結合することができる任意のタンパク質決定基、s c F v 又は T 細胞レセプターが含まれる。エピトープ決定基は、アミノ酸や糖側鎖のような分子の化学的に活性な表面グルーピング(grouping)から成り、特定の三次元構造特性並びに特定の電荷特性をもつのが普通である。例えば、抗体は、ポリペプチドの N 末端又は C 末端ペプチドに対して生じうる。

#### 【 0 0 2 7 】

本明細書中で用いる「免疫学的結合」及び「免疫学的結合性質」なる用語は、免疫グロブリン分子と免疫グロブリンが特異的である抗原との間に生じる非共有相互作用の類を指す。免疫学的結合相互作用の強度又は親和性は、相互作用の解離定数( $K_d$ )により表され、小さい  $K_d$  は大きな親和性を表す。選択されたポリペプチドの免疫学的結合性質は当分野で周知の方法を使用して定量化されてよい。ある一つの方法は、抗原結合部位 / 抗原複合体形成と解離の速度を計測することを伴うものであり、このときこの速度は複合体パートナーの濃度、相互作用の親和性、および両方向の速度に等しく影響する幾何級数的パラメータに依存する。ゆえに、「会合速度定数」( $K_{on}$ )及び「解離速度定数」( $K_{off}$ )の両方は、濃度と会合および解離の実際の速度の計算によって決定されうる。(Nature

361:186-87 (1993)を参照)。  $K_{off} / K_{on}$  の比率は、親和性に関連しないすべてのパラメータを解除することが可能であり、解離定数  $K_d$  に等しい。(概して、Davies et al. (1990) Annual Rev Biochem 59:439-473を参照)。平衡結合定数 ( $K_d$ ) が当分野の技術者に公知の放射性リガンド結合アッセイ又は類似のアッセイによって測定するところの、およそ  $1 \mu M$  以下、好ましくは  $100 nM$  以下、より好ましくは  $10 nM$  以下、最も好ましくは  $100 pM$  以下～およそ  $1 pM$  である場合に、本発明の抗体は、インフルエンザエпитープに特異的に結合するという。

本発明のインフルエンザタンパク質(例えばHA又はノイラミニダーゼ)、又はその誘導体、断片、アナログ、ホモログ又はオルソログは、これらのタンパク質成分を免疫特異的に結合する抗体の生成における免疫原として利用されてよい。

#### 【0028】

当業者は、過度な実験を行うことなく、ヒトモノクローナル抗体がインフルエンザウイルスのHAタンパク質への本発明のヒトモノクローナル抗体の結合を妨げるか否かを確認することによって、前者のヒトモノクローナル抗体が後者の本発明のヒトモノクローナル抗体と同じ特異性を有することを決定することができる。本発明のヒトモノクローナル抗体による結合の減少で示されるように、試験するヒトモノクローナル抗体が本発明のヒトモノクローナル抗体と競合する場合、それはおそらく、2つのモノクローナル抗体が同じエпитープに結合するか又は非常に関連するエпитープに結合する。

ヒトモノクローナル抗体が本発明のヒトモノクローナル抗体の特異性を有するか否かを決定するもう一つの方法は、本発明のヒトモノクローナル抗体を通常反応するインフルエンザHAタンパク質とプレインキュベートし、次いで、試験するヒトモノクローナル抗体を添加して、試験するヒトモノクローナル抗体のHAタンパク質を結合する能力が阻害されるか否かを決定することである。試験するヒトモノクローナル抗体が阻害される場合、おそらく、本発明のモノクローナル抗体と同じ、又は機能的に等価なエпитープ特異性を有する。また、インフルエンザウイルスを利用して、試験モノクローナル抗体がインフルエンザウイルスを中和することができるか否かを決定することによって、本発明のヒトモノクローナル抗体のスクリーニングを行うことができる。

#### 【0029】

当分野で公知の様々な手順が、本発明のタンパク質に対する、または、その誘導体、断片、アナログ、ホモログ又はオルソログに対するポリクローナル抗体又はモノクローナル抗体の産生のために用いられてよい。(例として、出典明記によって本明細書中に援用される、Antibodies: A Laboratory Manual, Harlow E, and Lane D, 1988, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NYを参照)。

抗体は周知の技術、例えば、主に免疫血清のIgG分画を供給するプロテインA又はプロテインGを用いた親和性クロマトグラフィによって精製されてよい。その後又はあるいは、調査する免疫グロブリンの標的又はそのエпитープである特異的な抗原をカラムに固定し、免疫アフィニティークロマトグラフィによって免疫特異抗体を精製してよい。免疫グロブリンの精製は、例えばD. Wilkinson (The Scientist, published by The Scientist, Inc., Philadelphia PA, Vol. 14, No. 8 (April 17, 2000), pp. 25-28)によって述べられている。

#### 【0030】

本明細書中で用いられる「モノクローナル抗体」又は「MAb」又は「モノクローナル抗体組成物」は、固有の軽鎖遺伝子産物と固有の重鎖遺伝子産物からなる抗体分子の唯一の分子種を含む抗体分子の集団を指す。特に、モノクローナル抗体の相補性決定領域(CDR)は集団のすべての分子において同一である。MAbは、エпитープに対する固有の結合親和性によって特徴が表される抗原の特定のエпитープと免疫応答することができる抗原結合部位を含む。

モノクローナル抗体は、Kohler and Milstein, Nature, 256:495 (1975)によって記述されるようなハイブリードーマ法を使用して調製されうる。ハイブリードーマ法では一般に、マウス、ハムスター又は他の適切な宿主動物を免疫化剤にて免疫化し、免疫化剤に特

異的に結合する抗体を産生するか又は産生することができるリンパ球を誘発する。あるいは、リンパ球をインビトロで免疫化してもよい。

免疫化剤には一般的に、タンパク質抗原、その断片又はその融合タンパク質が含まれる。一般に、ヒト起源の細胞が望ましい場合、末梢血液リンパ球が使われ、または、非ヒト哺乳類の供与源が望ましい場合、脾細胞又はリンパ節細胞が使われる。次いで、適切な融剤、例えばポリエチレングリコールを用いて、リンパ球を不死化細胞株と融合させ、ハイブリドーマ細胞を形成させる(Goding, *Monoclonal Antibodies: Principles and Practice*, Academic Press, (1986) pp. 59-103)。不死化細胞株は通常、形質転換した哺乳動物細胞、特に齧歯類、ウシ及びヒト起源の骨髓腫細胞である。通常、ラット又はマウスの骨髓腫細胞株が使用される。ハイブリドーマ細胞は、融合していない不死化細胞の増殖又は生存を阻害する一又は複数の物質を好ましくは含む適切な培養培地中で培養されうる。例えば、親の細胞が酵素ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ(HGPRT又はHPR T)を欠いている場合、ハイブリドーマの培養培地は通常、HGPRT欠乏細胞の増殖を妨げる、ヒポキサンチン、アミノプテリンおよびチミジン(「HAT培地」)を含む。

#### 【0031】

好適な不死化細胞株は、効率よく融合し、選択された抗体産生細胞により安定して高いレベルで抗体を発現するものであり、HAT培地などの培地に影響されやすい。より好適な不死化細胞株はマウスの骨髓腫細胞株であり、例えばSalk Institute Cell Distribution Center, San Diego, California and the American Type Culture Collection, Manassas, Virginiaから入手することができる。ヒト骨髓腫およびマウスヒトヘテロメラノーマ細胞株も、ヒトモノクローナル抗体の産生について記述されている。(Kozbor, J. *Immunol.*, 133:3001 (1984); Brodeur et al., *Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications*, Marcel Dekker, Inc., New York, (1987) pp. 51-63)を参照)。

そして、ハイブリドーマ細胞が培養された培養培地が、抗原に対するモノクローナル抗体の存在についてアッセイされてよい。好ましくは、ハイブリドーマ細胞によって産生されるモノクローナル抗体の結合特異性は、免疫沈降法、または、インビトロ結合アッセイ、例としてラジオイムノアッセイ(RIA)又は酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)によって決定される。このような技術およびアッセイは当分野で公知である。モノクローナル抗体の結合親和性は、例えばMunson and Pollard, *Anal. Biochem.*, 107:220 (1980)のスカッチャード分析によって測定されてよい。さらに、モノクローナル抗体の治療的適用法では、標的抗原に対して高い特異性と高い結合親和性を有する抗体を同定することが重要である。

#### 【0032】

所望のハイブリドーマ細胞が同定されたあと、限界希釈手順によってクローンをサブクローニングし、標準的な方法によって増殖させてよい。(Goding, *Monoclonal Antibodies: Principles and Practice*, Academic Press, (1986) pp. 59-103を参照)。このための適切な培養培地には、例えば、ダルベッコの変更イーグル培地およびRPMI 1640培地が含まれる。あるいは、ハイブリドーマ細胞は哺乳動物の腹水のようなインビボで増殖させてよい。

サブクローンによって分泌されるモノクローナル抗体は、従来の免疫グロブリン精製手順、例えばプロテインAセファロース、ヒドロキシルアパタイトクロマトグラフィ、ゲル電気泳動、透析又はアフィニティクロマトグラフィによって、培養培地又は腹水液から単離されるか又は精製されてよい。

#### 【0033】

また、モノクローナル抗体は、組換えDNA法、例えば米国特許第4816567号において記述されるものによって作製されてよい。本発明のモノクローナル抗体をコードするDNAは、従来の手順を用いて(例えば、マウス抗体の重鎖および軽鎖をコードする遺伝子に特異的に結合することができるオリゴヌクレオチドプローブを用いて)、容易に単離され、配列決定されうる。本発明のハイブリドーマ細胞はこのようなDNAの好適な供

与源として役立つ。一旦単離されると、DNAは発現ベクターに入れられ、次いで、宿主細胞、例えばサルのCOS細胞、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞、又は免疫グロブリンタンパク質を産生しない骨髓腫細胞に形質移入し、組換え宿主細胞においてモノクローナル抗体を合成させることができる。また、DNAは、例えば、相同なマウス配列をヒトの重鎖及び軽鎖の定常ドメインのコード配列に置換するか(米国特許第4816567号; Morrison, Nature 368, 812-13 (1994)を参照)又は、免疫グロブリンコード配列のすべて又は非免疫グロブリンポリペプチドのコード配列の一部に共有的に系都合させることによって変更してよい。このような非免疫グロブリンポリペプチドを、本発明の抗体の定常ドメインと置換させるか、または本発明の抗体の一つの抗原結合部位の可変ドメインと置換させて、キメラ二価抗体を作製してよい。

完全なヒト抗体は、CDRを含む軽鎖及び重鎖の配列全体がヒト遺伝子に起因する抗体分子である。このような抗体は、本明細書中では「ヒト抗体」又は「完全ヒト抗体」と称する。ヒトモノクローナル抗体は、トリオーマ技法; ヒトのB細胞ハイブリドーマ技術(Kozbor, et al., 1983 Immunol Today 4: 72を参照); 及び、ヒトモノクローナル抗体を生産するためのEBVハイブリドーマ技術(Cole, et al., 1985: MONOCLONAL ANTIBODIES AND CANCER THERAPY, Alan R. Liss, Inc., pp. 77-96を参照)を用いて調製されうる。ヒトモノクローナル抗体が利用され、ヒトハイブリドーマを用いて(Cote, et al., 1983. Proc Natl Acad Sci USA 80: 2026-2030を参照)又はインビトロのエプスタインバーウイルスによるヒトB細胞形質転換により(Cole, et al., 1985 In: MONOCLONAL ANTIBODIES AND CANCER THERAPY, Alan R. Liss, Inc., pp. 77-96を参照)産生されてよい。

#### 【0034】

さらに、ヒト抗体は、ファージディスプレイライブラリを含む更なる技術を使用して生産されてよい。(Hoogenboom and Winter, J. Mol. Biol., 227:381 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol., 222:581 (1991)を参照)。同様に、ヒト抗体は、ヒト免疫グロブリン遺伝子座をトランスジェニック動物、例えば内在性免疫グロブリン遺伝子が部分的に又は完全に不活性化されているマウスに導入することによって作製されてよい。抗原刺激によりヒト抗体産生が観察され、それは遺伝子再構成、集合(assembly)および抗体レパートリ(repertoire)を含むすべての点においてヒトで観察されるものと非常に似ている。この手法は、例えば、米国特許第5545807号; 同第5545806号; 同第5569825号; 同第5625126号; 同第5633425号; 同第5661016号、及びMarks et al., Bio/Technology 10, 779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368 856-859 (1994); Morrison, Nature 368, 812-13 (1994); Fishwild et al, Nature Biotechnology 14, 845-51 (1996); Neuberger, Nature Biotechnology 14, 826 (1996); 及びLonberg and Huszar, Intern. Rev. Immunol. 13 65-93 (1995)に記載されている。

#### 【0035】

さらに、抗原による刺激に応答して動物の内在性抗体よりもむしろ完全ヒト抗体を生産させるために、変更されているトランスジェニック非ヒト動物を用いてヒト抗体を生産してよい。(PCT刊行国際公開94/02602を参照)。非ヒト宿主の重鎖及び軽鎖の免疫グロブリン鎖をコードする内在性遺伝子の活動能力を無くし、ヒトの重鎖及び軽鎖免疫グロブリンをコードする活性な遺伝子座を宿主ゲノム内に挿入する。例えば必要なヒトDNAセグメントを含む酵母人工染色体を用いて、ヒト遺伝子を組み込む。次いで、完全な変更の構成成分をあまり含まない中間のトランスジェニック動物を交雑することによって、望ましい変更を完全に提供する動物をプロジェクトとして得る。このような非ヒト動物の好ましい実施態様はマウスであり、PCT刊行物国際公開96/33735および国際公開96/34096に開示されるゼノマウス<sup>TM</sup>と呼ばれる。この動物は、完全なヒト免疫グロブリンを分泌するB細胞を生産する。抗体は、所望の免疫原による免疫化後の動物から直接、例えばポリクローナル抗体の調製物として、あるいは、モノクローナル抗体を生産するハイブリドーマのような動物由来の不死化B細胞から得られうる。さらに、ヒト可変領域を有する免疫グロブリンをコードする遺伝子を回収し、発現させて抗体を直接得るか、又は、さらに変更して、例えば単鎖Fv(scFv)分子のような抗体のアナログ

を得てもよい。

【0036】

内在性免疫グロブリン重鎖の発現を欠いているマウスに例証される、非ヒト宿主の作製方法の一例は、米国特許第5939598号に開示される。胚性幹細胞内の少なくとも一の内在性重鎖遺伝子座からJセグメント遺伝子を欠失させて、遺伝子座の再編成を妨げると同時に再編成された免疫グロブリン重鎖遺伝子座の転写の形成を妨げることと(この欠失は選択マーカーをコードする遺伝子を含むターゲティングベクターによって達成される)、その胚性幹細胞から、その体細胞および生殖系細胞に選択マーカーをコードする遺伝子を含むトランスジェニックマウスを生産することを含む方法によって得られる。

ヒト抗体などの所望の抗体を製造する一つの方法は、米国特許第5916771号に開示される。この方法は、培養物中の一方の哺乳動物宿主細胞に重鎖をコードするヌクレオチド配列を含む発現ベクターを導入し、他方の哺乳動物宿主細胞に軽鎖をコードするヌクレオチド配列を含む発現ベクターを導入し、そして、2つの細胞を融合してハイブリッド細胞を形成することを含む。ハイブリッド細胞は重鎖および軽鎖を含む抗体を発現する。

【0037】

この手順の更なる改善法では、免疫原上の臨床的に関連するエピトープの同定方法、及び高い親和性で関連のエピトープに免疫特異的に結合する抗体の選択相関方法は、PCT刊行物国際公開99/53049に開示される。

抗体は、前記の一本鎖抗体をコードするDNAセグメントを含むベクターにより発現されうる。

これらには、ベクター、リボソーム、ネイキッドDNA、アジュバント支援DNA、遺伝子銃、カテーテルなどが含まれる。ベクターには、国際公開93/64701に記載されるような、ターゲティング部分を有する化学的コンジュゲート(例えば細胞表面レセプターに対するリガンド)、および核酸結合部分(例えばポリリジン)、ウイルスベクター(例えばDNA又はRNAウイルスベクター)、PCT/US95/02140(国際公開95/22618)に記述されるような、標的部分(例えば標的細胞に特異的な抗体)および核酸結合部分(例えばプロタミン)を含む融合タンパク質である融合タンパク質、プラスミド、ファージなどが含まれる。このベクターは、染色体制、非染色体性又は合成されたものであってよい。

【0038】

好ましいベクターには、ウイルスベクター、融合タンパク質および化学的コンジュゲートが含まれる。レトロウイルスベクターにはモロニーマウス白血病ウイルスが含まれる。DNAウイルスベクターが好ましい。これらのベクターには、オルソボックス又はアピボックスベクターのようなボックスベクター、単純ヘルペスIウイルス(HSV)ベクターのようなヘルペスウイルスベクター(Geller, A. I. et al., J. Neurochem, 64:487 (1995); Lim, F., et al., in DNA Cloning: Mammalian Systems, D. Glover, Ed. (Oxford Univ. Press, Oxford England) (1995); Geller, A. I. et al., Proc Natl. Acad. Sci.: U.S.A. 90:7603 (1993); Geller, A. I., et al., Proc Natl. Acad. Sci USA 87:1149 (1990)を参照)、アデノウイルスベクター(LeGal LaSalle et al., Science, 259:988 (1993); Davidson, et al., Nat. Genet 3:219 (1993); Yang, et al., J. Virol. 69:2004 (1995)を参照)およびアデノ関連ウイルスベクター(Kaplitt, M. G., et al., Nat. Genet. 8:148 (1994)を参照)が含まれる。

ボックスウイルスベクターは遺伝子を細胞質に導入する。アピボックスウイルスベクターにより核酸の短期発現が生じる。アデノウイルスベクター、アデノ関連ウイルスベクターおよび単純ヘルペスウイルス(HSV)ベクターは、核酸を神経細胞に導入するために適する。アデノウイルスベクターにより、アデノ関連ウイルス(およそ4か月)より短い期間の発現(およそ2か月)が生じ、それはHSVベクターよりも短い期間である。選択される特定のベクターは、治療される標的細胞および状態に依存するであろう。導入は、標準的な技術、例えば感染、形質移入(トランスフェクション)、形質導入(トランスダクション)又は形質転換(トランスフォーム)によるものであってよい。遺伝子導入の様式の例には、例

例えば、ネイキッドDNA、CaPO<sub>4</sub>沈殿、DEAEデキストラン、エレクトロポレーション、プロトプラスト融合、リポフェクション、細胞マイクロインジェクションおよびウイルスベクターが含まれる。

#### 【0039】

ベクターを用いて、基本的に任意の所望の標的細胞をターゲティングすることができる。例えば、定位注射を用いて、ベクター(例えばアデノウイルス、HSV)を所望の場所にあててもよい。さらに、ミニポンプ注入システム、例えばSynchroMed注入システムを用いた脳室内(icv)注入によって粒子が運搬されてよい。また、対流(convection)と称されるバルク流量に基づく方法は、脳の拡張領域への大分子の運搬に有効であり、標的細胞へのベクターの運搬に有用である。(Bobo et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:2076-2080 (1994); Morrison et al., Am. J. Physiol. 266:292-305 (1994)を参照)。用いられうる他の方法には、カテーテル、静脈内、非経口、腹膜内、及び皮下の注射や、投与や他の公知の投与経路が含まれる。

これらのベクターを用いて、さまざまな方法で用いられうる大量の抗体を発現させることができる。例えば、試料中のofanインフルエンザウイルスを検出するためである。また、抗体を用いて、結合させ、インフルエンザウイルス細胞膜融合を破壊しようと試みることができる。

#### 【0040】

本発明の抗原タンパク質に特異的な単鎖抗体の産生のための技術を応用することができる(例えば米国特許第4946778号を参照)。さらに、F<sub>a</sub>b発現ライブラリの構築のための方法を応用して(例えばHuse, et al., 1989 Science 246: 1275-1281を参照)、タンパク質又はその誘導体、断片、アナログないしはホモログに対する所望の特異性を有するモノクローナルF<sub>a</sub>b断片を迅速かつ効率よく同定することができる。タンパク質抗原に対するイディオタイプを含む抗体断片は当分野で公知の技術によって製造され得、限定するものではないが以下のようなものがある。(i) 抗体分子のペプシン消化によって製造されるF<sub>(a b)</sub><sub>2</sub>断片、(ii) F<sub>(a b)</sub><sub>2</sub>断片のジスルフィド架橋を還元することによって製造されるF<sub>a</sub>b断片、(iii) パパインや還元剤により抗体分子が処理されて製造されるF<sub>a</sub>b断片、及び(iv) F<sub>v</sub>断片。

また、ヘテロコンジュゲート抗体も本発明の範囲内である。ヘテロコンジュゲート抗体は2つの共有結合して接合された抗体から成る。このような抗体は、例えば、不必要な細胞に対して免疫系細胞を標的化するため(米国特許第4676980号を参照)、そして、HIV感染の治療のため(国際公開91/00360; 国際公開92/200373; 欧州特許第03089号を参照)に提唱された。抗体が架橋剤を伴うものを含む合成タンパク質化学における公知の方法を使用してインビトロで調製されてよいことは考えられる。例えば、イムノトキシンは、ジスルフィド交換反応を使用して、またはチオエーテル結合を形成することによって構築されうる。この目的のための適切な試薬の例には、イミノチオレートおよびメチル-4-メルカプトブチルイミダートおよび、例えば米国特許第4676980号において開示されるものが含まれる。

#### 【0041】

例えば、インフルエンザを治療する際の抗体の有効性を上げるために、エフェクター機能に関して本発明の抗体を修飾することが望ましい。例えば、システイン残基(一又は複数)はFc領域に導入され、それによって、この領域の鎖間ジスルフィド結合が形成される。したがって、生成されるホモ二量体抗体は内部移行する能力を改善する、および/または、補体媒介性細胞殺傷能および抗体依存性細胞障害作用(ADCC)を増加することができた。(Caron et al., J. Exp Med., 176: 1191-1195 (1992)およびShopes, J. Immunol., 148: 2918-2922 (1992)を参照)。あるいは、二重Fc領域を有し、このことにより補体細胞溶解およびADCC能を亢進した抗体が設計されてよい。(Stevenson et al., Anti Cancer Drug Design, 3: 219-230 (1989)を参照)。

#### 【0042】

また、本発明は、細胞障害性剤、例えば毒素(例えば細菌、真菌、植物又は動物の起源

の酵素活性を有する毒素ないしはその断片)、又は放射性同位体(すなわちラジオコンジュゲート)にコンジュゲートされた抗体を含む免疫コンジュゲートに関する。

使われうる酵素活性を有する毒素およびその断片には、ジフテリアA鎖、ジフテリアトキシンの非結合活性断片、エキソトキシナ鎖(緑膿菌から)、リシナ鎖、アブリンA鎖、モデシナ鎖、 $\alpha$ サルシナ、アブラギリfordiタンパク質、dianthintanタンパク質、ヨウシュヤマゴボウ(*Phytolacca americana*)タンパク質(PAPI、PAPIIおよびPAPSI)、ニガウリ(*Momordica charantia*)インヒビター、curcin、クロチン、sapaonaria officinalisインヒビター、ゲロニン、mitogellin、レストリクトシン、フェノマイシン、エノマイシン、トリコテシンが含まれる。様々な放射性核種がラジオコンジュゲートされた抗体の産生に利用できる。例として、 $^{212}\text{Bi}$ 、 $^{131}\text{I}$ 、 $^{131}\text{In}$ 、 $^{90}\text{Y}$ 、 $^{186}\text{Re}$ などがある。

#### 【0043】

抗体と細胞障害性剤のコンジュゲートは、様々な二官能性タンパク質カップリング剤、例えばN-スクシンイミジル-3-(2-ピリジルジチオール)プロピオナート(SPDP)、イミノチオラン(IT)、イミドエステルの二官能性誘導体(例えばアジブイミド酸ジメチルHCL)、活性なエステル(例えばスベリン酸ジサクシンイミジル)、アルデヒド(例えばグルタルアルデヒド)、ビス-アジド化合物(例えばビス-(p-アジドベンゾイル)-ヘキサレンジアミン)、ビス-ジアゾニウム誘導体(例えばビス-(p-ジアゾニウムベンゾイル)-エチレンジアミン)、ジイソシアナート(例えばトリエン-2,6-ジイソシアナート)、およびビス-活性フッ素化合物(例えば1,5-ジフルオロ-2,4-ジニトロベンゼン)を用いて作製される。例えば、リシンイムノトキシンは、Vitetta et al., Science 238: 1098 (1987)に記載されるように調製されてよい。カルボン-14-標識1-イソチオシアネートベンジル-3-メチルジエチレン トリアミン五酢酸(MX-DTPA)は、抗体への放射性ヌクレオチドのコンジュゲートのための例示的なキレート剤である。(国際公開94/11026を参照)。

当分野の通常の技術者は、多種多様な可能な部分が結果として生じる抗体に、または、本発明の他の分子に連結されてよいことを認識するであろう。(例として"Conjugate Vaccines", Contributions to Microbiology and Immunology, J. M. Cruse and R. E. Lewis, Jr (eds), Carger Press, New York, (1989)を参照、この内容全体は出典明記によって本明細書中に援用される)。

#### 【0044】

カップリングは、抗体および他の部分がそれらそれぞれの活性を保持する限り、2つの分子を結合する任意の化学反応によって達成されうる。この結合には、多くの化学機構、たとえば共有結合、親和性結合、インターカレーション、座標結合および複合体生成が含まれうる。しかしながら、好適な結合は共有結合である。共有結合は、既存の側鎖の直接的な縮合によって又は外的架橋分子の取込みによって達成されうる。多くの二価又は多価の連結剤は、他の分子に対する、本発明の抗体のようなカップリングタンパク質分子において有用である。例えば、代表的なカップリング剤には、有機化合物、例えばチオエステル類、カルボジイミド類、スクシンイミドエステル類、ジイソシアナート類、グルタルアルデヒド、ジアゾベンゼン類およびヘキサメチレンジアミン類が含まれうる。このリストは、当分野で公知のカップリング剤の様々な種類を網羅しているものではなく、むしろ、一般的なカップリング剤の例示である。(Killen and Lindstrom, Jour. Immun. 133:1335-2549 (1984); Jansen et al., Immunological Reviews 62:185-216 (1982); 及びVitetta et al., Science 238:1098 (1987)を参照)。好適なリンカーは文献に記述されている。例として、MBS(M-マレイミドベンゾイル-N-ヒドロキシスクシンイミドエステル)の使用を記述しているRamakrishnan, S. et al., Cancer Res. 44: 201-208 (1984)を参照のこと。また、オリゴペプチドリナーにより抗体にカップリングされるハロゲン化されたアセチルヒドラジド誘導体の使用を記述している、米国特許第5030719号も参照のこと。特に好適なリンカーには以下のものなどがある。(i) EDC(1-エチル-3-(3-ジメチルアミノ-プロピル)カルボジイミド、(ii) SMP T(4-サクシニミジルオキ

シカルボニル -  $\alpha$  - メチル -  $\alpha$  - (2 - プリジル - ジチオ) - トルエン (Pierce Chem. Co., カタログ番号 (2 1 5 5 8 G)、(iii) S P D P (サクシニミジル - 6 [3 - (2 - プリジルジチオ) プロピオンアミド]ヘキサノエート (Pierce Chem. Co., カタログ番号 2 1 6 5 1 G)、(iv) スルホ - L C - S P D P (スルホサクシニミジル - 6 [3 - (2 - プリジルジチオ) - プロピアンアミド]ヘキサノエート (Pierce Chem. Co., カタログ番号 2 1 6 5 - G)、及び(v) E D C にコンジュゲートしたスルホ - N H S (N - ヒドロキシスルホ - サクシニミジル: Pierce Chem. Co., カタログ番号 2 4 5 1 0)。

#### 【0045】

上記のリンカーは異なる特質を有する構成成分を含み、ゆえに、異なる生理化学的な性質を有するコンジュゲートとなる。例えば、アルキルカルボキシレートのスルホ - N H S エステル類は、芳香族のカルボキシレート類のスルホ - N H S エステル類より安定している。N H S - エステル含有リンカーはスルホ - N H S エステル類より可溶性が低い。さらに、リンカー S M P T は、立体障害型ジスルフィド結合を含み、コンジュゲートを形成して安定性を増しうる。ジスルフィド結合はインビトロ切断されるので、ジスルフィド結合は他の結合より一般的に安定性が低く、コンジュゲート利用性が低くなる。特に、スルホ - N H S はカルボジイミドカップリングの安定性を上げる。カルボジイミドカップリング (例えば E D C) は、スルホ - N H S とともに使われる場合に、カルボジイミドカップリング反応単独より加水分解に対して抵抗力があるエステル類を形成する。

また、本明細書において開示される抗体は免疫リボソームとして調製されてもよい。抗体を含むリボソームは当分野で公知の方法によって調整され、例えば Epstein et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 82: 3688 (1985); Hwang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 77: 4030 (1980); 及び米国特許第4485045号及び同第4544545号に記載されている。増加した循環時間を有するリボソームは、米国特許第5013556号において開示される。

特に有用なリボソームは、ホスファチジルコリン、コレステロール及び P E G 誘導体化ホスファチジルエタノールアミン (P E G - P E) を含有する脂質組成物を用いた逆相蒸発法により産生することができる。リボソームは定められた細孔径のフィルターにて押し出され、所望の直径を有するリボソームが得られる。本発明の抗体の F a b' 断片は、ジスルフィド相互交換反応により Martin et al., J. Biol. Chem., 257: 286 288 (1982) に記載されるリボソームにコンジュゲートされてよい。

#### 【0046】

インフルエンザウイルスに対する抗体の使用

所望の特異性を有する抗体を選別する方法には、非限定的に酵素結合免疫吸着アッセイ (E L I S A) 及び当技術分野で公知の他の免疫仲介技術が含まれる。

例えば H A (又はそのフラグメント) 等のインフルエンザウイルス・タンパク質に対する抗体を、インフルエンザウイルス・タンパク質の局在化及び / 又は定量化に関連する、当技術分野で公知の方法において使用することができる (例えば、適切な生理学的試料におけるインフルエンザウイルス・タンパク質のレベルの測定での使用、診断法における使用、蛋白質の画像診断における使用等)。所定の実施形態では、抗体誘導抗原結合性ドメインを含む、インフルエンザウイルス・タンパク質、またはその誘導体、フラグメント、類似体、又はホモログに特異的な抗体が、(以下に「療法」と呼ばれる) 薬理的な活性体として用いられる。

#### 【0047】

本発明のインフルエンザウイルス・タンパク質に特異的な抗体を使用して、例えば免疫アフィニティー、クロマトグラフィー、又は免疫沈降等の標準技術によって、インフルエンザウイルスポリペプチドを単離することができる。インフルエンザウイルス・タンパク質 (又はそのフラグメント) に対する抗体を、例えば、所定の治療計画の効能を判定するための臨床試験方法の一部として診断上使用して、細胞中の蛋白質レベルを監視することができる。検出は、抗体を検出可能な物質に連結させる (すなわち物理的に結合させる) ことによって促進できる。検出可能な物質の例としては、様々な酵素、接合団、蛍光物質

、発光物質、生物発光物質、及び放射性物質が挙げられる。好適な酵素の例としては、西洋ワサビペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ、ベータガラクトシダーゼ、又はアセチルコリンエステラーゼが挙げられ；好適な接合団複合体の例としては、ストレプトアビジン／ビオチン及びアビジン／ビオチンが挙げられ；好適な蛍光物質の例として、ウンベリフェロン、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート、ローダミン、ジクロロトリアジニラミンフルオレセイン、ダンシルクロリド、又はフィコエリトリンが挙げられ；発光物質の例としては、ルミノールが挙げられ；生物発光物質の例として、ルシフェラーゼ、ルシフェリン、及びエクオリン、そして好適な放射性物質の例として<sup>125</sup>I、<sup>131</sup>I、<sup>35</sup>S又は<sup>3</sup>Hが挙げられる。

ポリクローナル、モノクローナル、ヒト化及び、完全ヒト抗体を含む本発明の抗体は治療薬として使用することができる。この種の薬品は通常、被検体のインフルエンザウイルス関連の疾患または病理学（例えば鳥インフルエンザ）を治療するまたは予防するために用いられる。抗体の製剤、好ましくは標的抗原に対する高い特異性及び高い親和性を有する抗体の製剤は被検体に投与され、通常、製剤が標的と結合することにより効果が発揮される。抗体の投与は、細胞へのウイルスの内部移行を無効にする、又は阻害する又は干渉することができる。この場合、抗体が標的と結合して、自然発生的なリガンドの結合部位をマスキングすることにより、ウイルスの細胞膜への融合を妨げて、ウイルスの内部移行を阻害する。

#### 【0048】

本発明の抗体の治療上有効量は一般に、治療の目的を達成するために必要な量に関連している。上述したように、これは特定の場合において標的の機能に干渉する、抗体とその標的抗原との間の結合相互作用であってよい。必要な投与量は、さらに、特定の抗原に対する抗体の結合親和性に依存する、また、投与された抗体が、その抗体が投与される他の被検体の自由体積から減少する率に依存する。本発明の抗体又は抗体フラグメントの治療上有効量の一般的な範囲は、非限定的な実施例として、約0.1～50 mg/kgの体重であってよい。一般的な投与頻度は例えば一日2回から一週間に1回の範囲であってよい。

本発明の、特にインフルエンザウイルス・タンパク質と結合する抗体又はそのフラグメントだけでなく、本明細書に開示されるスクリーニング・アッセイによって特定される他の分子を、医薬組成物の形態で、インフルエンザウイルス関連の疾患の治療のために投与することができる。上記組成物の調製に関連する原理および考察だけでなく、構成要素の選択におけるガイダンスは、例えば、Remington: The Science And Practice Of Pharmacy 19th ed. (Alfonso R. Gennaro, et al., editors) Mack Pub. Co., Easton, Pa., 1995; Drug Absorption Enhancement: Concepts, Possibilities, Limitations, And Trends, Harwood Academic Publishers, Langhorne, Pa., 1994; and Peptide And Protein Drug Delivery (Advances In Parenteral Sciences, Vol. 4), 1991, M. Dekker, New Yorkにおいて提供されている。

抗体フラグメントが使用されるところでは、特に標的タンパク質のドメインと結合する最も小さい抑制フラグメントが好まれる。例えば、抗体の可変領域配列に基づいて、標的タンパク質配列を結合する能力を保持するペプチド分子を構成することができる。上記ペプチド分子は、化学的に合成することができる及び／又は組み換えDNA技術によって生成することができる。(例えば Marasco et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90: 7889-7893 (1993) 参照)。製剤はまた、必要に応じて治療中の特定の適応症の複数の活性化化合物、好ましくは相互に悪影響を及ぼさない相補的な活性を有する活性化化合物を含むこともできる。代わりに又は加えて、組成物は、その機能、例えば細胞毒性薬剤、サイトカイン、化学療法剤または増殖抑制薬剤を強化する薬剤を含むことができる。上記分子は、意図する目的に効果的な量で好適に組み合わせられる。

#### 【0049】

活性成分はまた、例えばそれぞれコロイド薬物送達系（たとえば、リポソーム、アルブミン微小球体、マイクロエマルジョン、ナノ粒子、そして、ナノ・カプセル）又はマクロエ

マルジョン類のヒドロキシ・メチルセルロース又はゼラチン・マイクロカプセル及びポリ（メタアクリル酸メチル）マイクロカプセル等の、例えばコアセルベーション技術によって又は界面重合によって調製されたマイクロカプセルに封入することができる。

生体内投与に使用される製剤は、無菌でなければならない。これは、無菌の濾過膜を介した濾過によって、容易に達成される。

徐放性製剤を調合することができる。徐放性製剤の好適な実施例には、抗体（マトリックスが造形品、例えばフィルムまたはマイクロカプセルの形である）を含んでいる固体の疎水性ポリマーの半透性マトリックスが含まれる。徐放性マトリックスの実施例は、ポリエステル、ヒドロゲル（例えばポリ（2-ヒドロキシエチルメタクリレート）、又はポリ（ビニルアルコール）、ポリ・ラクチド（米国特許第3773919号明細書）、Lグルタミン酸およびγエチルLグルタミン酸塩の共重合体、分解不能なエチレン酢酸ビニル、LUPRON DEPOT<sup>TM</sup>（乳酸グリコール酸共重合体および酢酸ロイプロリドから構成される注射可能なマイクロステリア）等の分解可能な乳酸グリコール酸共重合体、およびポリ-D-（-）3-ヒドロキシ酪酸を含む。エチレン酢酸ビニルおよび乳酸グリコール酸等のポリマーにより100日間以上の分子の放出が可能になるとともに、特定のヒドロゲルがより短い期間にタンパク質を放出する。

#### 【0050】

本発明による抗体は、試料中のインフルエンザウイルス（またはタンパク質またはそのタンパク質フラグメント）の存在を検出するための薬剤として使用することができる。好ましくは、抗体は、検出可能な標識を含む。抗体は、ポリクローナル、より好ましくはモノクローナルであってよい。無傷の抗体、又はそのフラグメント（例えば、F<sub>a</sub>b、s c F<sub>v</sub>又はF<sub>(a b)</sub><sub>2</sub>）を使用することができる。プローブまたは抗体に関する用語「標識」は、直接標識化された別の試薬との反応性によるプローブ又は抗体の間接的な標識化だけでなく、検出可能な物質をプローブまたは抗体に結合する（すなわち、物理的に連結する）ことによるプローブまたは抗体の直接的な標識化を含む。間接的な標識化の実施例には、主要抗体を蛍光標識ストレプトアビジンによって検出できるように、第2の蛍光標識抗体とビオチンを有するDNAプローブの末端標識化を使用した主要抗体の検出が含まれる。用語「生物学的試料」は、被検体内に存在する組織、細胞及び体液だけでなく、被検体から分離される組織、細胞および体液を含む。したがって、用語「生物学的試料」の使用には、血液および血清、血漿またはリンパを含む血液の部分又は構成要素が含まれる。すなわち、本発明の検出方法は、インビボのみでなくインビトロで生物学的試料の被検体mRNA、タンパク質またはゲノムDNAを検出するのに使用することができる。例えば、被検体mRNA検出のインビトロ技術には、ノーザンハイブリダイゼーションと、インサイツハイブリダイゼーションが含まれる。被検体タンパク質検出の生体外技術には、酵素結合免疫吸着アッセイ（ELISA）、ウエスタンブロット、免疫沈降、及び免疫蛍光検査が含まれる。被検体ゲノムDNA検出のインビトロ技術には、サザンハイブリダイゼーションが含まれる。免疫アッセイを実施する手順は、例えばELISA: Theory and Practice: Methods in Molecular Biology”, Vol. 42, J. R. Crowther (Ed.) Human Press, Totowa, NJ, 1995; “Immunoassay”, E. Diamandis and T. Christopoulos, Academic Press, Inc., San Diego, CA, 1996; and “Practice and Theory of Enzyme Immunoassays”, P. Tijssen, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1985に記載されている。さらに、被検体タンパク質検出のインビボ技術には、標識非被検体タンパク質抗体を被検体に導入することが含まれる。例えば、抗体は、被検体内での存在及び位置が標準撮像技術によって検出可能な放射性マーカーによる標識化が可能である。

#### 【0051】

##### 医薬組成物

本発明の抗体又は薬剤（また、本明細書において「活性化合物」とも称される）、及びその誘導体、フラグメント、類似体及び相同体は、投与に好適な医薬組成物に組み込むことができる。上記組成物は通常、抗体又は薬剤、及び薬学的に受容可能な担体を含む。本明細書で使用しているように、用語「薬学的に受容可能な担体」は、薬学的投与に適合す

る、任意の及び全ての溶媒、分散媒、コーティング、抗菌及び抗真菌剤、等浸透及び吸収遅延剤等が含まれる。好適な担体は、参照により本明細書に組み込まれる当技術分野における標準参照テキストである、Remington's Pharmaceutical Sciencesの最新版に記載されている。上記担体又は希釈剤の好適な実施例は、非限定的に、水、食塩水、リンガー溶液、ブドウ糖溶液および5%のヒト血清アルブミンを含む。不揮発性油等のリボソームおよび非水性ビヒクルを使用することもできる。薬学的活性物質に対する上記媒体及び薬剤の使用は当技術分野において公知である。任意の従来の媒体又は薬剤が活性化合物と適合しない場合以外は、上記媒体及び薬剤の組成物における使用が考察される。補助活性化合物を組成物に組み込むことも可能である。

本発明の医薬組成物は、意図された投与ルートに適合するように調合される。投与ルートの実施例には、例えば静脈内、皮内、皮下、経口（例えば吸入）、経皮（すなわち局所の）、経粘膜、直腸投与等の非経口投与が含まれる。非経口、皮内、皮下投与に使用する溶液または懸濁液は以下の構成要素を含むことができる：例えば注射用の水、食塩液、不揮発性油、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール又は他の合成溶媒等の無菌の希釈剤；例えばベンジルアルコール又はメチルパラベン等の抗菌剤；例えばアスコルビン酸または亜硫酸水素ナトリウム等の酸化防止剤；例えばエチレンジアミン四酢酸（EDTA）等のキレート剤；例えば塩化ナトリウム又はブドウ糖等の張度調整用の酢酸塩、クエン酸塩またはリン酸塩及び薬品等のバッファ。pHは例えば、塩酸又は水酸化ナトリウム等の酸または塩基によって調整可能である。非経口製剤は、アンプル、使い捨て注射器又はガラス若しくはプラスチック製の複数回投与瓶に封入することができる。

#### 【0052】

注射可能な用途に好適な医薬組成物には、無菌の注射可能な溶液または分散液の即時調製のための滅菌水溶液（水溶性の）、又は分散液及び無菌粉が含まれる。静脈内投与については、好適な担体は、生理的食塩水、静菌水、Cremophor EL<sup>TM</sup>（BASF, Parsippany, N.J.）、またはリン酸塩緩衝食塩水（PBS）を含む。全ての場合において組成物は無菌であり、容易に注射針を通過できる程度に流動的でなければならない。組成物は、製造及び保管の条件下で安定しているべきであり、例えばバクテリア及び菌類等の微生物の汚染作用に対して保存されなければならない。担体は、例えば、水、エタノール、ポリオール（例えば、グリセロール、プロピレングリコール、液状ポリエチレングリコールなど）及びこれらの好適な混合物を含む溶媒又は分散媒であってよい。例えば、レシチンなどのコーティングの使用により、分散液の場合は必要な粒径を維持することにより、および界面活性剤の使用により、適切な流動性を維持することができる。様々な抗菌剤及び抗真菌剤、例えば、パラベン、クロロブタノール、フェノール、アスコルビン酸、チメロサル等により微生物の作用を防止することができる。多くの場合において、組成物中に等張化剤、例えば、糖、マンニトール、ソルビトールのようなポリアルコール、塩化ナトリウムを含むことが好ましい。注入可能な組成物の持続的な吸収は、組成物中に吸収を遅らせる薬剤、例えばモノコテアリン酸アルミニウムおよびゼラチンを含ませることにより成すことができる。

無菌の注射可能な溶液は、必要に応じて必要量の活性化合物を上記に列挙された成分を組合せた適切な溶媒に組み込むことによって調製することができ、その後フィルタ殺菌が行われる。通常、分散液は活性化合物を基本的な分散媒及び上記に列挙したうちの必要な他の成分を含む無菌ビヒクルへ組み込むことによって調製される。無菌の注射可能な溶液の調整用の無菌粉の場合、調整の方法は真空乾燥及び凍結乾燥であり、この方法により、事前に無菌のフィルタ処理された溶液から、活性成分と任意の所望の添加成分の粉が生成される。

#### 【0053】

経口用組成物は一般に、不活性希釈剤または食用の担体を含む。これらは、ゼラチン・カプセルに格納するまたは錠剤に圧縮することができる。経口治療投与の目的で、活性化合物を賦形剤と合わせて、錠剤、トローチまたはカプセルの形態で用いることができる。経口用組成物はまた、うがい薬として使用するために流体担体を使用して調整することが

でき、この場合流体担体の化合物は経口投与され、口内でかき回されて、嚥出される又は嚥下される。薬学的に混合可能な結合剤、及び／又は補助材料を、組成物の一部として含むことができる。錠剤、ピル、カプセル、トローチなどは、以下の成分のいずれか又は類似の性質の化合物を含むことができる：例えば微晶質性セルロース、トラガカントゴムまたはゼラチン等のバインダ；例えば澱粉またはラクトース等の賦形剤、例えば澱粉またはラクトース、例えばアルギン酸、プリモゲル又はコーンスターチ等の崩壊剤；例えばステアリン酸マグネシウム又はステロート等の潤滑剤；例えばコロイド状二酸化ケイ素等の流動促進剤；例えばスクロース又はサッカリン等の甘味剤；例えばペパーミント、メチルサリチレートまたはオレンジ香味料等の香味剤。

吸入による投与のために、化合物はエアロゾルスプレーの形態で、好適な噴霧剤、例えば二酸化炭素等のガスを含む加圧容器またはディスペンサ、又はネブライザーから送出される。

#### 【0054】

全身投与はまた、経粘膜的又は経皮的手段によるものであってよい。経粘膜的又は経皮的投与には、浸透すべきバリアに対する適切な浸透剤が製剤中に使用される。この種の浸透剤は従来技術において一般に公知であり、例えば、経粘膜的投与には、洗剤、胆汁酸塩及びフシジン酸誘導体が含まれる。経粘膜的投与は、鼻噴霧または坐薬の使用を通して行うことができる。経皮的投与には、活性化合物は、当技術分野で一般に知られているような軟膏、膏薬またはクリームに調合される。

化合物はまた、直腸送達のために、坐薬（例えば、カカオバター及び他のグリセリド等の従来の坐薬基剤によって）又は停留浣腸の形に調製可能である。

一実施形態においては、活性化合物は、インプラント及びマイクロカプセル封入送達システムを含む、放出制御製剤等の体内からの急速な排出から化合物を保護する担体で調製される。例えばエチレン酢酸ビニル、ポリ無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステル及びポリ乳酸等の、生物分解性で生物学的適合性を有するポリマーを用いることができる。この種の製剤の調製方法は、当業者にとって明らかである。材料はまた、Alza Corporation及びNova Pharmaceuticalsから市販されている。（ウイルス抗原にモノクローナル抗体を有する感染した細胞を標的とするリポソームを含む）リポソームの懸濁は、また、薬学的に受容可能な担体としても用いることができる。これらは、例えば、米国特許第4522811号に記載されているように、当業者に公知の方法に従って調製することができる。

#### 【0055】

経口又は非経口的組成物を投薬量単位の形態で製剤することは、投与の容易さ及び投薬量の均一性のために特に有利である。本明細書で使用される投薬量単位は、治療される被検体均一な投薬量として適した物理的に個別の単位を意味し、各単位は必要な薬学的担体に関連する所望の治療効果を生み出すように計算された活性化合物の所定量を含む。本発明の投薬量単位の形態の規格は、活性化合物の独特の特徴及び達成される特定の治療効果、及び個人の治療向けのこの種の活性化合物の当技術分野に特有の限界によって決定され、直接依存している。

医薬品組成物は、投与説明書と共に、容器、パックまたはディスペンサに含むことができる。

#### 【0056】

##### スクリーニング方法

本発明は、モジュレータ、（本明細書においては「スクリーニング分析」とも称される）、すなわち変調するかまたはさもないと細胞膜へのインフルエンザウイルスの融合を調整する又はそうでなければ干渉する候補または試験化合物または薬剤（例えばペプチド、ペプチド模倣薬、小さい分子または他の薬）を識別する方法を提供する。インフルエンザ感染症を治療するのに役立つ化合物を識別する方法も提供されている。本発明はまた、本明細書において記載されているスクリーニング分析を使用して識別される化合物も含む。

例えば、本発明は、インフルエンザウイルス及び細胞膜の間の相互作用を調整するスク

リーニング候補または試験化合物のための分析を提供する。本発明の試験化合物は、当技術分野で公知の組合せライブラリ法の多数の方法のいずれかを用いて得ることができ、組合せライブラリ法には：生物学的ライブラリ；空間的にアドレス可能な平行した固体位相または溶液位相ライブラリ；逆重畳積分が必要である合成ライブラリ法；「一ビーズ一化合物」ライブラリ法；及び親和性クロマトグラフィ選択を使用する合成ライブラリ法が含まれる。生物学的ライブラリ法はペプチド・ライブラリに限られる一方、その他の4つの方法は化合物のペプチド、非ペプチド・オリゴマー又は小さい分子ライブラリに適用可能である。（例えば Lam, 1997. *Anticancer Drug Design* 12: 145参照）。

#### 【0057】

本明細書において使われる「小分子」は、約5 kD未満及び最も好ましくは約4 kD未満の分子量を有する組成物を指す。小さい分子は、例えば、核酸、ペプチド、ポリペプチド、ペプチド模倣薬、炭水化物、脂質または他の有機又は無機分子であってよい。例えば菌類、細菌、藻類抽出物等の化学及び/又は生物学的混合物のライブラリは、当技術分野で公知であり、本発明の任意の分析によってスクリーニングすることができる。

分子ライブラリの合成方法の実施例は、当技術分野において例えば：DeWitt, et al., 1993. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 90: 6909; Erb, et al., 1994. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 91: 11422; Zuckermann, et al., 1994. *J. Med. Chem.* 37: 2678; Cho, et al., 1993. *Science* 261: 1303; Carrell, et al., 1994. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 33: 2059; Carrell, et al., 1994. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 33: 2061; and Gallop, et al., 1994. *J. Med. Chem.* 37: 1233に見受けられる。

化合物のライブラリは溶液内に（例えばHoughten, 1992. *Biotechniques* 13: 412-421参照）、又はビーズ上に（Lam, 1991. *Nature* 354: 82-84参照）、チップ上に（Fodor, 1993. *Nature* 364: 555-556参照）、バクテリア（米国特許第5,223,409号明細書参照）、孢子（米国特許第5,233,409号明細書参照）、プラスミド（Cull, et al., 1992. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 89: 1865-1869参照）、又はファージに（Scott and Smith, 1990. *Science* 249: 386-390; Devlin, 1990. *Science* 249: 404-406; Cwirla, et al., 1990. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 87: 6378-6382; Felici, 1991. *J. Mol. Biol.* 222: 301-310; 及び米国特許第5,233,409号明細書参照）含まれることが可能である。

#### 【0058】

一実施形態において、候補化合物は抗体-抗原複合体に導入されて、候補化合物が抗体-抗原複合体を崩壊させるかどうかを決定し、この複合体の崩壊は候補化合物がインフルエンザウイルスおよび細胞膜の間の相互作用を調整することを表す。例えば、抗体はモノクローナル抗体D7、D8、F10、G17、H40、A66、D80、E88、E90およびH98であってよく、抗原はインフルエンザウイルスのHAタンパク質上に位置することができる。

別の実施形態では、少なくとも一つのHAタンパク質は形成され、このタンパク質は少なくとも一つの中和モノクローナル抗体に曝露される。抗体-抗原複合体の形成が検出され、一又は複数の候補化合物が複合体に導入される。抗体-抗原複合体が一又は複数の候補化合物の導入後に崩壊する場合、候補化合物は、例えば鳥インフルエンザ等のインフルエンザウイルス関連の疾患又は障害を治療するのに有用である。例えば、少なくとも一つのインフルエンザウイルス・タンパク質をインフルエンザウイルス分子として、供給することができる。

#### 【0059】

抗原またはその生物学的に活性な部分に対する試験化合物の結合が、複合体の標識化合物を検出することによって決定できるように、試験化合物を放射性同位体または酵素標識に連結することにより、試験化合物の、抗体-抗原複合体を干渉するかまたは崩壊させる能力を決定することができる。例えば、試験化合物は直接又は間接的に、 $^{125}\text{I}$ 、 $^3\text{S}$ 、 $^{14}\text{C}$ または $^3\text{H}$ で標識化することができ、放射性同位体は電波放射の直接計数によって又はシンチレーション計数によって検出される。あるいは、試験化合物は例えば、セイヨウワサビ・ペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ又は発光酵素で酵素的に標識

化することができ、酵素的標識は、適切な物質の製品への転換の決定によって検出される。

一実施形態において、分析は、抗体-抗原複合体を試験化合物に接触させて、抗原と相互作用する又はさもなければ、既存の抗体-抗原複合体を崩壊させる試験化合物の能力を決定することを含む。本実施形態では、抗原と相互作用する又はさもなければ、既存の抗体-抗原複合体を崩壊させる試験化合物の能力を決定することは、抗原又は抗原の生物学的に活性な部分と優先的に結合する試験化合物の能力を決定することを含む。

#### 【0060】

別の実施形態では、分析は、抗体-抗原複合体を試験化合物に接触させて、抗体-抗原複合体を調整する試験化合物の能力を決定することを含む。抗体-抗原複合体を調整する試験化合物の能力を決定することは、例えば、試験化合物の存在下で、抗体と結合する又は相互作用する抗原の能力を決定することによって達成可能である。

当業者は、本明細書において開示されるスクリーニング方法全てにおいて、抗原は、モノクローナル抗体 D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90 および H 98 等のインフルエンザウイルス中和口外であってよい。さらに、抗原は H A タンパク質又はその一部であってよい。本明細書に記載された全ての分析において、モノクローナル抗体 D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90 および H 98 と H A タンパク質との間の結合に干渉する候補化合物の能力は、候補化合物がインフルエンザウイルス及び細胞膜との融合に干渉するまたは調整することが可能であることを表している。さらに、H A タンパク質の細胞への結合は、細胞へのインフルエンザウイルスの侵入の原因となるため、上記候補化合物は、例えば鳥インフルエンザ等のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害の治療にも役立つ。

#### 【0061】

本願明細書に開示されるスクリーニング方法は、細胞に基づいた分析として又は無細胞分析として実行可能である。本発明の無細胞分析は、H A タンパク質とその一部の可溶性形態または膜結合形態の両方の使用に修正可能である。H A タンパク質の膜結合形態を含む無細胞分析の場合、タンパク質の膜結合形態が溶液中に維持されるように、可溶化剤を用いることが望ましいことであり得る。上記可溶化剤の実施例には、例えば n - オクチルグルコシド、n - ドデシルグルコシド、n - ドデシルマルトシド、オクタノイル - N - メチルグルカミド、デカノイル - N - メチルグルカミド、T r i t o n (登録商標) X - 100、T r i t o n (登録商標) X - 114、T h e s i t (登録商標)、イソトリデシルポリ(エチレン・グリコール・エーテル)<sub>n</sub>、N - ドデシル - N、N - ジメチル - 3 - アンモニオ - 1 - プロパンスルホン酸塩 (CHAPS)、又は 3 - (3 - コラミドプロピル) ジメチルアンモニオ - 2 - ヒドロキシ - 1 - プロパンスルホン酸塩 (CHAPSO) 等の非イオン洗剤が挙げられる。

複数の実施形態において、以下の候補化合物の導入の一方または両方の非複合形態からの複合体の分離を容易にする抗体又は抗原を静止させると同時に、分析の自動化を図ることは、望ましいことであり得る。候補化合物の有無における抗体-抗原複合体の観察は、反応物を含むのに適した全ての容器にもおいて行うことができる。上記容器の実施例には、マイクロタイタープレート、試験管、及びマイクロ遠心分離管が含まれる。一実施形態では、タンパク質の一方または両方がマトリックスに結合することが可能になるドメインを加える融合タンパク質が提供可能である。例えば、GST 抗体融合タンパク質または GST 抗原融合タンパク質はグルタチオンセファロースビーズ (ミズーリ州セントルイスのシグマケミカル社) 又はグルタチオン誘導体化マイクロタイタープレート上へ吸着することができ、その後試験化合物と結合し、この混合物は複合体形成 (例えば、塩および pH の生理的条件で) につながる条件下で培養される。培養後、ビーズ又はマイクロタイタープレートウェルは洗浄されて未結合の構成要素が全て除去され、ビーズの場合はマトリックスが固定化され、複合体が直接又は間接的に決定される。あるいは、複合体はマトリックスから分離可能であり、抗体-抗原複合体形成のレベルは標準の技術を使用して決定することができる。

## 【 0 0 6 2 】

マトリックス上のタンパク質を固定化することの他の技術を、本発明のスクリーニング分析に用いることができる。例えば、抗体又は抗原は、ビオチン及びストレプトアビジンの共役を用いて固定化できる。ビオチン化抗体又は抗原分子は、当技術分野で公知の技術（例えばイリノイ州ロックフォードのピアスケミカル社のビオチン化キット）を使用して、ビオチン - N H S ( N - ヒドロキシ - スクシンイミド ) から調製し、ストレプトアビジンでコーティングされた 9 6 ウェルプレート（ピアスケミカル社）のウェルにおいて固定化することができる。あるいは、対象の抗体または抗原と反応するが、対象の抗体 - 抗原複合体の形成には干渉しない他の抗体を、プレートのウェルに誘導体化させて、抗体コンジュゲートによってウェルに捕獲された抗体又は抗原を開放することができる。上記複合体を検出する方法は、G S T が固定化された複合体について上述したものに加えて、抗体又は抗原と反応する上記の他の抗体を使用する複合体の免疫検出を含む。

本発明は、更なる本発明は処理のために任意の前述したスクリーニング分析およびその使用によって識別される新規の薬剤さらに関連する。

## 【 0 0 6 3 】

## 診断分析

本発明の抗体は、適切な分析、例えば従来の種類の免疫測定法によって検出が可能である。例えば、ある分析は、インフルエンザ・タンパク質（例えば H A 1、H A 2 又はノイラミニダーゼ）又はそのフラグメントが固相に加えられる方法で実行することができる。培養は、試料中の抗体が固相上の固定化されたポリペプチドと結合することができるように、十分な期間維持される。この最初の培養後に、固相が試料から分離される。この固相は洗浄されて、試料中にも存在しえる未結合材料と例えば非特異的タンパク質等の干渉物質が除去される。ポリペプチドと結合した関心対象の抗体を含む固相は次に、第 2 の標識化抗体又はビオチンまたはアビジン等の結合剤と結合した抗体で培養される。この第 2 の抗体は、他の抗インフルエンザ抗体又は他の抗体であってよい。抗体の標識は、当技術分野において公知であり、放射性核種、酵素（例えばマレアート・デヒドロゲナーゼ、西洋ワサビ・ペルオキシダーゼ、ブドウ糖オキシダーゼ、カタラーゼ）、蛍石（フルオレッセイニンイソチオシアネート、ローダミン、フィコシアニン、フルオレカミン (fluorescamine) ）、ビオチンなどを含む。標識化抗体は固体で培養され、固相に結合される標識が測定される。これらの、及び他の免疫分析は、当業者によって容易に実行されることができる。

生体試料中のインフルエンザウイルスの有無を検出する実例となる方法は、インフルエンザウイルスの存在が生体試料において検出されるように、被検体から生体試料を得て、生体試料を本発明による標識化モノクローナル又は s c F v 抗体と接触させることを含む。

## 【 0 0 6 4 】

本明細書で使用している、プローブ又は抗体に関連する用語「標識化」は、検出可能な物質をプローブ又は抗体に結合させる（すなわち物理的に連結させる）ことによってプローブ又は抗体を直接標識化することだけでなく、直接標識化された別の試薬との反応によるプローブ又は抗体の間接的な標識化を含む。間接的な標識化の実施例には、蛍光標識されたストレプトアビジンで検出できるように、蛍光標識された第 2 の抗体及びビオチンによる D N A プローブの末端標識化を使用した主要抗体の検出が含まれる。用語「生体試料」には、被検体内に存在する組織、細胞及び体液と同様に、被検体から分離された組織、細胞および生体液が含まれる。すなわち、本発明の検出方法は、生体外だけでなく生体内における生体試料のインフルエンザウイルスを検出するために用いることができる。例えば、インフルエンザウイルス検出の生体外技術は、酵素結合免疫吸着法（E L I S A ）、ウエスタンブロット、免疫沈降、及び免疫蛍光法を含む。さらに、インフルエンザウイルスを検出する生体内技術は、標識抗インフルエンザウイルス抗体を被検体に導入することを含む。例えば、抗体は、被検体の存在および位置が標準の撮像技術によって検出可能な放射性マーカーで標識することができる。

一実施形態では、生体試料は被検体からのタンパク質分子を含む。ある好適な生体試料は、被検体から従来の手段によって分離された末梢血白血球の試料である。

本発明はまた、生体試料におけるインフルエンザウイルスの存在を検出するためのキットを含む。例えばキットは：生体試料のインフルエンザウイルス（例えば抗インフルエンザ s c F v 又はモノクローナル抗体）を検出することができる標識化合物または薬剤；試料中のインフルエンザウイルスの量を決定するための手段；及び試料中のインフルエンザウイルスの量を標準と比較するための手段を含むことができる。化合物または薬剤は、好適な容器にパッケージ化することができる。キットはさらに、キットを使用して試料中のインフルエンザウイルスを検出する説明書を含むことができる。

【 0 0 6 5 】

#### 受動免疫法

受動免疫法は、ウイルス疾患の予防および治療に対する効果的で安全な戦略であると判明した。（Keller et al., Clin. Microbiol. Rev. 13:602-14 (2000); Casadevall, Nat. Biotechnol. 20:114 (2002); Shibata et al., Nat. Med. 5:204-10 (1999); and Igarashi et al., Nat. Med. 5:211-16 (1999) 参照。各文献は参照することによって本明細書に組み込まれる。）中和ヒトモノクローナル抗体を使用した受動免疫法は、鳥インフルエンザ等のインフルエンザの救急予防及び治療のための緊急治療戦略を提供する一方で、代替的な、そして時間のかかるワクチン及び新薬の開発が進行中である。

サブユニットワクチンは潜在的に、従来の免疫原に勝る重要な利点を提供する。サブユニットワクチンは、従来の死菌又は弱毒化全病原体ワクチンの製造、配布及び配送特有の安全上の問題を回避する。さらにサブユニットワクチンは、承認された防御エピトープのみを含むように合理的に構成することができ、これにより、抑制 T エピトープ（Steward et al., J. Virol. 69:7668 (1995) 参照）、又は効果のない非保護反応（例えば、「デコイ」エピトープ）を生じさせることによって免疫システムを破壊する、免疫優勢 B エピトープを回避する（Garritty et al., J. Immunol. 159:279 (1997) 参照）。

さらに、当業者は、多くの異なるウイルス、チャレンジ・ルートおよび動物モデルに対する生体外の抗体中和作用及び生体内での予防の間に良い創刊関係があることを認識する（Burton, Natl. Rev. Immunol. 2:706-13 (2002); Parren et al., Adv. Immunol. 77:195-262 (2001) 参照）。本明細書において示されるデータは、D 7、D 8、F 10、G 17、H 40、A 66、D 80、E 88、E 90 及び H 98 ヒトモノクローナル交代を更に開発し生体内動物試験において試験して、インフルエンザの救急予防及び治療向けの良く効くウイルス侵入阻害剤としての臨床有用性を決定することができることを示している。

【 0 0 6 6 】

#### ワクチンの抗体 - I g キメラ

第 1 抗体が、免疫システムに対する抗原決定基の効果的な提示のための骨格として使用されて 10 年以上がたつ（Zanetti, Nature 355:476-77 (1992); Zaghoulani et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92:631-35 (1995) 参照）。ペプチドが I g G 分子（例えば本明細書において記載されている 11A 又は 256 I g G1 モノクローナル抗体）の一体部分として含まれるときに、ペプチド・エピトープの抗原性および免疫原性は遊離したペプチドと比較して非常に強化される。この種の強化は、おそらく抗原 - I g G キメラの、それらの自然構造を模倣するより長い半減期、より良い提示、及び拘束配座に起因する。

さらに、抗原 - I g キメラを使用することの更なる利点は、変数又は抗原 - I g キメラの F c 領域を使用して、プロフェッショナル抗原提示細胞（APC）のターゲティングすることができる。今までは、重鎖可変遺伝子（V<sub>H</sub>）の相補性決定領域（CDR）が B 又は T 細胞によって認識される様々な抗原ペプチドに置換される、組み換え I g が生成されてきた。この種の抗原 - I g キメラは、体液及び細胞免疫反応の両方を誘発するために用いられてきた（Bona et al., Immunol. Today 19:126-33 (1998) 参照）。

【 0 0 6 7 】

CDR 3 ループに移植された特定のエピトープを有するキメラは、H I V - 1 g p 1 20 V 3 - ループ又はヒト C D 4 レセプタの第 1 の細胞外ドメイン（D 1）に対する体

液反応を誘導するために用いられてきた (Lanza et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:11683-87 (1993); Zaghoulani et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92:631-35 (1995)

参照)。免疫血清により、H I V - 1 M N (抗 - g p 1 2 0 V 3 C) によって C D 4 S u p T 1 細胞の感染を予防する又はシンシチウム形成 (抗 - C D 4 - D 1) を阻害することが可能であった。C D R 2 及び C D R 3 は同時にペプチド・エピトープと置換することができ、挿入されるペプチドの長さは最大 1 9 アミノ酸長にもなり得る。

あるいは、あるグループは、ペプチド抗原が I g 一定の (C) 領域のループで提示され、キメラの可変領域を B 細胞の表層上の I g D 又は B 細胞、樹枝細胞 (D C) 及び大食細胞を含むプロフェッショナル A P C 上の M H C クラス II 分子をターゲティングするために用いることができる「troybody」戦略を開発した (Lunde et al., Biochem. Soc. Trans. 30:500-6 (2002) 参照)。

抗原 - I g キメラはまた、直接抗原を I g G 分子の F c 部分と融和させることによって生成することもできる。You et al., Cancer Res. 61:3704-11 (2001) は、この方法を使用して、非常に高いレベルの抗体から B 型肝炎ウイルス核抗原までを含む特定の免疫反応の全てのアームを得ることができた。

【 0 0 6 8 】

#### D N A ワクチン接種

D N A ワクチンは安定しており、抗原が自然に処理される機会を提供することができ、比較的長く続く反応を誘発することができる。非常に魅力的な免疫化戦略ではあるが、D N A ワクチンの免疫反応を誘発する効力はしばしば非常に限られている。例えば樹枝細胞 (D C) 等のプロフェッショナル A P C によって注入された D N A の取り込み不足が、上記限界の主な原因であり得る。抗原 - I g キメラ・ワクチンと組み合わせて、D C の表層上の F c レセプタ (F c γ R) の存在を利用する、A P C 抗原提示の促進に基づく有望な新規 D N A ワクチン戦略が報告された (Casares, et al., Viral Immunol. 10:129-36 (1997); Gerloni et al., Nat. Biotech. 15:876-81 (1997); Gerloni et al., DNA Cell Biol. 16:611-25 (1997); You et al., Cancer Res. 61:3704-11 (2001) 参照)。

抗原 (A g) - I g キメラをコード化する D N A ワクチンを生成することは可能である。免疫処置においては、D N A 分子を処理する細胞によって A g - I g 融合タンパク質が発現し、分泌される。分泌された A g - I g 融合タンパク質は、B 細胞反応を誘発すると共に、D C 表層上の F c γ R を有する F c フラグメントの相互作用によって捕獲され、取り込まれることが可能であり、これにより、効率的な抗原提示を増進し、抗原特有の免疫反応を大幅に促進する。機能性抗 M H C II 特異的 s c F v 領域遺伝子を担持している D N A コード化抗原 - I g キメラはまた、同じ原理を適用して、免疫原を A P C の全 3 種類にターゲティングすることもできる。免疫反応は、必要に応じて、生体外で生成される (すなわちプライム及びブースト) 同じタンパク質抗原を使用して、さらに促進することができる。この戦略を使用して、インフルエンザウイルスの感染に対する特定細胞及び体液の免疫反応は、D N A ワクチンの筋肉内 (i . m .) 注射によって達成された (Casares et al., Viral Immunol. 10:129-36 (1997) 参照)。

【 0 0 6 9 】

#### ワクチン組成物

治療又は予防組成物は本明細書において提供されており、これらは一般に、一又は複数のモノクローナル抗体または S c F v の混合物及びこれらの組合せを含む。予防ワクチンは、インフルエンザウイルス感染を予防するために用いることができ、治療ワクチンは、インフルエンザウイルスに感染した人を治療するために用いることができる。予防的な使用には、ワクチンの接種対象者のインフルエンザウイルスに、増加した抗体価を供給することが含まれる。このように、インフルエンザにかかるリスクが高い被検体に、インフルエンザウイルスに対する受動免疫を付与することができる。

これらワクチン組成物は、補助免疫調節剤とともに投与することができる。例えば、非限定的に I L - 2、変性 I L - 2 (C y s 1 2 5 → S e r 1 2 5)、G M - C S F、I L - 1 2、γ - インターフェロン、I P - 1 0、M I P 1 β、及び R A N T E S を含む、サ

イトカイン、リンフォカイン及びケモカインである。

#### 【 0 0 7 0 】

##### 免疫化の方法

本発明のワクチンは、他の抗ウイルス・ワクチンよりも優れた免疫保護及び免疫療法特性を有する。

本発明は被検体の免疫化、例えば免疫反応を誘発する方法を提供する。被検体は、病原体外膜ウイルスの膜融合タンパク質を含む組成物を被検体へ投与することによって、免疫化される。融合タンパク質は、生物学的に適合したマトリックスで覆われている又は埋め込まれている。

融合タンパク質はグリコシル化され、例えば糖鎖を含む。糖鎖は、単糖類、一又は複数の二糖類、一又は複数のオリゴ糖類、一又は複数の多糖類又はそれらの誘導體（例えばスルホ又はホスホ置換された）の形であってよい。炭水化物は、直鎖状である又は分岐している。糖鎖は、ポリペプチドにN結合又はO結合している。N-結合グリコシル化はアスパラギン側鎖のアミド窒素へ、O-結合グリコシル化はセリン及びトレオニン側鎖のヒドロキシ酸素へ結合している。

糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体に対し内在性である。あるいは、糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体に対し外生的である。糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体のポリペプチドに通常発現しない糖鎖である。例えば、炭水化物半分は、植物特異的な炭水化物である。植物特異的な糖鎖は、例えばコア結合 $\alpha$ 1,3フコース又はコア結合1,2キシロースを有するN-結合型グリカンを含む。あるいは、糖鎖は、ワクチン接種を受けている被検体のポリペプチド又は脂質に発現する糖鎖である。例えば、多くの宿主細胞は、ヒト様糖付着子を有するヒトタンパク質を生成するために遺伝子操作が行われてきた。

#### 【 0 0 7 1 】

例えば、融合タンパク質は、三量体赤血球凝集素タンパク質である。任意に、赤血球凝集素タンパク質は、例えば植物細胞等の非哺乳類細胞において生成される。被検体は、ウイルス感染症を発症する又はウイルス感染症に苦しむ危険にさらされている。外膜ウイルスは例えば、エプスタイン・バーウイルス、単純疱疹ウイルス、1及び2型、ヒトサイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、8型、水痘帯状疱疹ウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、インフルエンザウイルス、はしかウイルス、耳下腺炎ウイルス、パラインフルエンザウイルス、呼吸器合胞体ウイルス、狂犬病ウイルス及び風疹ウイルスを含む。本明細書に記載した方法により、ウイルス感染の一又は複数の症状の重症度が軽減又は緩和される。感染症は、標準的な手順を使用する医師によって診断される及び又は監視される。予防接種が必要な被検体は、当技術分野で公知の方法によって識別される。例えば、被検体には、CDCのGeneral Recommendation on Immunization (51 (RR02) pp1-36) に概説されているように予防接種が行われる。癌は例えば物理的な試験、生検、血液検査またはX線によって診断される。被検体は例えば、全ての哺乳類、例えばヒト、霊長類、マウス、ネズミ、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ブタ、魚または鳥である。処置は、感染症の診断の前に行われる。あるいは、処置は診断後に行われる。

処置の効果は、特定の障害または感染症を診断する又は治療する全ての公知の方法に関連して決定される。障害の一又は複数の症状の緩和は、化合物が臨床的利点をもたらすことを示す。

#### 【 0 0 7 2 】

##### ワクチンの可能性のための抗原性タンパク質フラグメント (APF) の評価

体液性免疫を標的とするワクチン候補は、少なくとも3つの基準を満たさなければ成功しない：強い抗体反応（「免疫原性」）を引き起こさなければならない；それが引き起こす抗体の重要なフラグメントは、病原体（「免疫原性適合性」）と交差反応しなければならない；それが引き起こす抗体は、保護するものでなければならない。免疫原性が佐剤又は担体を使用してしばしば促進可能である一方で、免疫原性適合性及び（中和によって明

白なように)保護を誘導する能力は、ワクチン構成要素としてのその抗原の成功を最終的に決定する抗原の固有特性である。

#### 【0073】

##### 免疫原性適合性の評価

「免疫原性適合性」は、病原体と交差反応する抗原によって誘導される抗体の一部として定義される(Matthews et al., J. Immunol. 169:837 (2002)参照)。これは、病原体と交差反応しない抗体を含む抗原によって誘導された全ての抗体の力価によって測定される免疫原性とは別のものである。不十分な免疫原性適合性は、おそらく今までペプチド・ワクチンの期待外れの実績に寄与してきた。抗体に高い親和性で結合し、高い抗体価を引き出すペプチドはしばしば十分な免疫原性適合性に欠くため、見込みのあるワクチン構成要素としては不合格である。したがって、インフルエンザ・ワクチン候補を選ぶ基準の一つとして、免疫原性適合性を含むことは重要である。

低い免疫原性適合性の一般的な理由は、一番短いペプチドの立体配座の柔軟性である。具体的には、可撓性ペプチドは、患者からの抗体と良好に結合することができ、未投与の被検体において実質的な抗体価を導き出すことができる。しかしながら、ペプチドが多数の配座のレパートリを有する場合、それが未投与の被検体に引き起こす抗体の優位により、完全な病原体上の対応するネイティブエピトープと交差反応できない可能性がある。

短いペプチドのように、あるAPFは非常に可撓性である可能性があり、従って、ワクチンの構成要素としてはふさわしくない。最も免疫原的に適切なAPFは、総タンパクの状況とは別に本質的に拘束されている自己折りたたみ型タンパク質サブドメインで構成される傾向にある。免疫原性適合性は主にAPF自体のものであって、反応する免疫システムのものではないため、最終的にはAPFはヒトにおいて作用しなければならないが、動物モデル(例えばマウス)において免疫原性適合性を評価することが可能である。

#### 【0074】

APFによって達成される免疫原性適合性は、Matthews et al., J. Immunol. 169:837 (2002)に記載されたものに類似した手順で、精製されたスパイクまたは膜タンパク質を有する抗APF血清の免疫吸収によって評価される。IgGは、予防接種をされたマウスから採取された血清から精製される。精製され、ビオチン化されたタンパク質(マウスが予防接種された特定のAPFにより必要に応じて)は、マウスのIgGと混合されて、培養される。ストレプトアビジンでコーティングされた十分な量のセファロースビーズが次に添加され、全ての結合IgGとともに、ビオチン化されたタンパク質を全て捕捉する。ストレプトアビジンでコーティングされたビーズは、それぞれ、タンパク質に対する抗体が枯渇されたIgGを残す、マイクロ遠心分離機において13,000rpmの遠心分離によって除去される。偽免疫吸収は、ビオチン化されたBSAが偽吸収剤としてインフルエンザ・タンパク質と置換される以外は、同じように平行して行われる。

APFの免疫原性適合性を測定するために、吸収された抗体および偽吸収された抗体は、免疫APFに対するELISAにおいて並んで滴定される。ファージ提示NPLから選択されるAPFの親和性については、これらELISAの抗原が、精製されたAPF-GST融合タンパク質となる。哺乳類細胞提示NPLからの潜在的にグリコシル化されたAPFについては、これらELISAの抗原が、哺乳類細胞によって分泌され、プロテインAによって精製されたAPF-Fc融合タンパク質となる。偽吸収された抗体と比較して、吸収された抗体の抗APF滴定量の減少率により、APFの免疫原性適合性の量が得られる。

#### 【0075】

##### 治療方法

本発明は、インフルエンザウイルス関連の疾患または障害の(又はこれに感染しやすい)危険にさらされている被検体を治療する、予防的及び治療的な方法の両方を提供する。例えば、この種の疾患または障害は、鳥インフルエンザを含むが、これに限定されるものではない。

#### 【0076】

### 予防方法

一態様では、本発明は、本発明のモノクローナル抗体又はs c F v抗体、あるいは本発明の方法にしたがって識別された薬剤を投与することによって、被検体のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害を予防する方法を提供する。例えば、s c F v及び/又はモノクローナル抗体D 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0及びH 9 8の治療上有効量を投与することができる。任意には、2つ以上の抗インフルエンザ抗体が同時投与される。

インフルエンザウイルス関連の疾患または障害の危険にさらされている被検体は、感染者と接触した患者、又は、何らかの他の方法でインフルエンザウイルスにさらされた患者を含む。予防薬剤の投与は、インフルエンザウイルス関連の疾患または障害に特有の症状の徴候が現れる前に行うことができ、これにより、疾患または障害が予防される、又は、その進行が遅らされる。

適切な薬剤は、本明細書に記載されているスクリーニング分析に基づいて決定することができる。代わりに又は加えて、投与される薬剤は、本発明の方法に従って識別されたインフルエンザウイルスを中和するs c F v又はモノクローナル抗体である。

【0077】

### 治療方法

本発明の別の態様は、患者のインフルエンザウイルス関連の疾患または障害を治療する方法に関連する。一実施形態では、この方法には、疾患または障害を患っている患者に、インフルエンザを中和する薬剤（例えば、本明細書に記載されているスクリーニング分析によって識別される薬剤及び/又は本発明の方法に従って識別されるs c F v抗体又はモノクローナル抗体）又は薬剤の組合せを投与することが含まれる。

【0078】

### 組み合わせ方法

本発明は、例えばH Aタンパク質の同じエピトープと結合するD 7、D 8、F 1 0、G 1 7、H 4 0、A 6 6、D 8 0、E 8 8、E 9 0及びH 9 8等の2つ以上の抗体を投与することによって、患者のインフルエンザ関連の疾患又は障害（例えば鳥インフルエンザ等）を治療することを提供する。

【0079】

本発明は、請求項に記載されている本発明の範囲を制限しない以下の実施例において更に説明される。

【実施例】

【0080】

### 実施例1：一般的な方法

ファージ提示抗体ライブラリの選択のための様々なパニング抗原の発現及び調製

H A 1 H A 1は(A / T h a i l a n d / 2 ( S P - 3 3 ) / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) のN末端フラグメント(a a 1 7 - 3 3 8)である。遺伝子は、コドン最適化し、C末端9アミノ酸タグ(C 9 - タグ: G T E T S Q V A P A)を有する融合タンパク質として発現させた。融合タンパク質H A 1 - C 9は、2 9 3 T細胞において一時的に発現させ、分泌されたタンパク質は親和性クロマトグラフィによって上澄みから精製した。H A 1 - C 9の精製のために、抗C 9抗体1 D 4(国立細胞培養センター)に共有結合的に結合するプロテインAセファロースを使用した。

三量体H A 0 前述したプロトコル<sup>3 3</sup>を適応させることにより、A / V i e t N a m / 1 2 0 3 / 2 0 0 4の赤血球凝集素(H A)遺伝子の細胞外ドメイン(H A 0)を昆虫細胞において融合タンパク質として発現させた。このコンストラクトは三量体化構造を安定させるためのバクテリオファージT 4フィブリチンからのC末端三量体化「フォールドン」シーケンスと、その後にトロンピン・サイト及びH i s 6タグを含む。融合タンパク質のc D N Aは、パキウウイルス移入ベクター、p A c G P 6 7 A(マサチューセッツ州ベッドフォードのB D バイオサイエンス社)にクローニングし、組み換えタンパク質の効率的な分泌を可能とした。9 × 1 0<sup>6</sup>細胞は、ウイルス株によって感染した。感染3日

後に細胞を沈降させ、そして、上澄みは6 mlのNi-NTAビーズ(カリフォルニア州バレンシアのQiagen社)で培養した。ビーズは、10 mMのイミダゾールを有するTBS緩衝液(10 mMのTris・HCl / 80 mMのNaCl、pH 8.0)で洗浄し、250 mMのイミダゾールを有するTBSによって溶出させた。溶出させたHA5タンパク質は、TBS緩衝液で透析処理して、Mono Q HR10 / 10カラム(ニュージャージー州ピスカタウェイのGEヘルスケア社)を使用したイオン交換によって更に精製した。精製したHA5を終夜トロンピンによって消化させた。HA0三量体の完全性及び性質は、ゲル濾過(Superdex 200カラム)及びSDS-PAGEを使用して調べた。

#### 【0081】

ファージ抗体ライブラリの選択及びH5に対する抗体のスクリーニング

57人のワクチン接種を受けていない提供者のB細胞から構成される2つのヒト非免疫性scFvライブラリ(合計 $2.7 \times 10^{10}$ メンバー)を、精製されたHA1又は三量体HA0に対するscFvsの選択のために用いた。各々のライブラリから調製される $5 \times 10^{11}$  pfuのファージ-scFvsを、別々に、10 µgのHA1又はHA0でコーティングされたイムノチューブ(イリノイ州ネーパービルのアムンク社)で培養した。選択手順は前述したのと同じであった。選択手順を2回繰り返した後で、ランダムに選択した単一のファージ-scFvクローンを前述したように、酵素免疫吸着法(ELISA)によってHA1又はHA0への特異結合のためにスクリーニングした。 $> 1.0$ の $A_{450}$ 値を有するHA1又はHA0と結合したクローンは陽性として記録し、その一方で負のクローンの値は $< 0.1$ であった。HA1又はHA0特異結合クローンについては、重鎖(VH)及び軽鎖(VL)の可変領域の遺伝子を配列決定し、それらの対応するアミノ酸配列は、抗体を更に特徴づけするために異なる配列で識別するように整列配置した。

#### 【0082】

可溶性scFv-Fcs及び完全長ヒトIgG1の発現及び精製

ファージ・ライブラリを作製するのと同じ方法を使用して、中和分析のために個々のクローンのファージ-scFvsを生成した。ファージ粒子は、PEG/NaCl沈殿を利用して25倍に濃縮した。前述したように、scFv-Fcs及び完全ヒトIgG1sを生成した。簡単に言うと、選択されたscFvsを、scFvを、ヒトIgG1のCH2及びCH3領域を含むが、CH1を欠くヒンジを含むFc発現ベクターpcDNA3.1-Hingeへサブクローニングすることによって、scFv-Fcsへ変換した。完全ヒトIgG1については、scFvのVH及びVL遺伝子のフラグメントを、ヒトIgG1カップ軽鎖又はラムダ軽鎖発現ベクター、TCAE5又はTCAE6へ別々にサブクローニングした。scFv-Fcs又はIgG1は、一時的な移入によって293T又は293F細胞(インビトロゲン)において発現させ、タンパク質Aセファロース親和性クロマトグラフィによって精製した。

#### 【0083】

表層プラズモン共鳴(SPR)分析

組み替え型HA0(VietNam1203/04)三量体に結合するH5 HA Mabsの動態分析を、Biacore T100(Biacore)上で25で行った。抗ヒトIgG Fc抗体(Biacore)を、アミン結合キット(Biacore)を使用して、アミン結合によってCM4センサチップの個々のフローセル表面に、共有結合的にコーティングを施した。HA Mabsを、Mab-HA0結合が均一の1:1ラングミュア相互作用として行われるように、HBS緩衝液(Biacore)において10 u l / 分の流動率で抗ヒトIgG Fc表面上で捕捉させた。HA0は、HBS緩衝液において30 u l / 分の流動率、及び0.31~20 nMの範囲の濃度で、各フローセルを通して注入した。緩衝注射は、負の制御として機能した。全ての実験には付加的な抗ヒトIgG Fc抗体コントロール表面を含め、緩衝屈折指標の変化を考慮し、またHA0と抗ヒトIgG Fcの間の潜在的な非特異性相互作用を検査した。各々の会合及び解離サイクルが完成したときに、表層は、3 M MgCl<sub>2</sub>溶液によって再構成した。会合速度(

k a)、解離速度定数(k d)及び親和定数(K D)は、B i a c o r e T 1 0 0 評価用ソフトを使用して算出した。各適合度は、実験データ及び算出された適合との一致に基づいており、ここで、C h i <sup>2</sup> 値は1.0未満であった。H A 0 に対するM a b の表面密度は、質量移動を最小限に抑え、親和効果の寄与を完全になくすために最適化された。本明細書で報告される全てのk a、k d、K Dは、3つの実験の手段及び標準誤差を表す。

#### 【0084】

##### ウイルス及び細胞

A / A n n A r b o r / 6 / 1 9 6 0 ( H 2 N 2 ) の低温適応ワクチン株だけでなく、野生型インフルエンザA / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ; H 5 - V N 0 4 ) 型、A / H o n g K o n g / 4 8 3 / 1 9 9 7 ( H 5 N 1 ; H 5 - H K 9 7 ) 型、A / N e t h e r l a n d s / 2 1 9 / 2 0 0 3 ( H 7 N 7 ; H 7 - N L 0 3 )、及びA / O h i o / 4 / 1 9 8 3 ( H 1 N 1 ; H 1 - O H 8 3 ) ウイルスは、W H O 世界インフルエンザサーベイランスネットワークから入手し、アレキサンダー・クリモフ氏(米国アトランタのC D C)によって提供された。H 1 - P R 3 4 及びメイディン・ダービー犬の腎臓(M D C K)細胞は、アメリカ合衆国培養細胞系統保存機関から入手し、10%のウシ胎仔血清を有するダルベッコ変法イーグル培地において増殖させた。ウイルスの感染力は、M D C K細胞のブランク分析で判定した。活野生H 5 N 1 型ウイルスは、米国農務省の選択物質プログラム(<http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm>)によって要求される強化を含む、バイオセーフティレベル3の格納容器内で取り扱った。

#### 【0085】

##### H A - 偽型ウイルスの中和分析

##### プラスミド及びコンストラクト

A / T h a i l a n d / 2 ( S P - 3 3 ) / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) の全長H A 遺伝子、H 5 - S P 3 3、及びA / V i e t n a m 1 2 0 3 / 2 0 0 4 のノイラミダーゼ遺伝子、N 1 をコドン最適化し、p c D N A 3 . 1 ベクトルへクローン化して、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3 及びp c D N A 3 . 1 - N 1 発現プラスミドを別々に生成した。p C A G G S - H 1 ( S C ) プラスミドコード化A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1 9 1 8 ( H 1 N 1 ) 全長H A タンパク質は、P . P a l e s e 博士(米国シナイ山医学部)によって、好意で提供された。p C A G G S - H 1 ( P R ) プラスミドコード化A / P u e r t o R i c o / 8 / 3 4 ( H 1 N 1 ) H A タンパク質は、M . F a r z a n 博士(米国ハーバード・メディカル・スクール)からの寛大な贈り物である。

#### 【0086】

##### H A - 偽型ウイルスの生成

H 5 - S P 3 3、H 1 - S C / 1 9 1 8 又はH 1 - P R / 3 4 によって偽型化されたH 5 N 1 又はH 1 N 1 のsingle-round H I V 発光酵素リポータ・ウイルスを、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、H I V - 1 G a g - P o l をコードするH I V パッケージ化ベクターp C M V Δ R 8 . 2 <sup>5 7</sup>、H I V - 1 L T R 制御下にH I V - 1 ホタル・ルシフェラーゼリポータ遺伝子をコードするトランスファベクターp H I V - L u c、発現プラスミドp c D N A 3 . 1 - N 1 の4つのプラスミドによる2 9 3 T細胞の同時移入により作製した。3 6時間の移入後に、ウイルス上澄みを採取し、4 で保管した。

#### 【0087】

##### 中和分析

細胞を導入する前に、H 1 - S C / 1 9 1 8 又はH 1 - P R / 3 4 F 偽型ウイルスのウイルス上澄みを、1 6 μ g / m L の T P C K 処理トリプシンで2 5 で1時間培養し、次に1 : 1 ( V / V ) の比率のトリプシン中和溶液(TNS、Cambrex)で中和した。試験抗体又は血清は、R Tにおいて3 0分間、十分な量のH 5 - S P 3 3 偽型又はトリプシン処理H 1 偽型ウイルスで培養した。混合物はその後、9 6 ウェルプレートの2 9 3 T細胞に加えて、4 8時間培養を継続した。ウイルス侵入レベルは、マイクロプレート照度計で標的細胞のルシフェラーゼ活性を測定することによって評価した。

#### 【0088】

## 抗体 8、10 及び 66 のエピトープ・マッピング

プラスミド及びコンストラクト p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、p C A G G S - H 1 ( S C ) 及び p C A G G S - H 1 ( P R ) は、上に説明したのと同様である。A / F P V / R o s t o c k / 3 4 ( H 7 N 1 ) の H A タンパク質をコード化する p C A G G S - H 7 ( F P V ) は、X . ヤン博士 ( ベス・イスラエルディーコネス医療センター ) によって、好意的に提供された。p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3 又は p C A G G S - H 7 ( F P V ) の変異体は全て、QuikChange方法 ( ストラタジーン ) によって作製した。抗 H 5 抗体の H A 発現細胞への結合のフローサイトメトリー分析である。H 1、H 5 又は H 7 のプラスミドを発現している様々な完全長野生型 H A 及び H A 変異体を、293T細胞に一時的に移入した。移入の48時間後に、抗 H 5 抗体 ( 10  $\mu$ g / ml ) は4 において、移入された293T細胞と共に1時間培養した。次に細胞を、0 . 5 % の B S A 及び 0 . 1 % の N a N 3 を含む P B S で3回洗浄した。H A 移入細胞に結合する抗 H 5 抗体を検出するために、F I T C 標識ヤギ抗ヒト I g G ( ピアス ) を第2の抗体として使用して、細胞とともに30分間4 で培養した。細胞を上記したように再度洗浄し、CellQuestソフトウェアを有するBecton Dickinson FACScaliber with CellQuest softwareを使用して分析した。

## 【0089】

## マイクロ中和分析

本方法は、前述したように<sup>4 8</sup>行った。簡単に説明すると、ウイルスの T C I D<sub>50</sub> ( 半組織培養感染量 ) を、96 - ウェル組織培養プレートにおいて等しい容量の抗体貯蔵液 ( 1 mg / ml ) の 10<sup>2</sup> 希釈剤と混合し、37 で1時間培養した。指示薬 M D C K 細胞 ( 1 . 5  $\times$  10<sup>4</sup> 細胞 / ウェル ) をプレートに加えて、37 で20時間で培養した。エンドポイントを確立するために、細胞単分子層を次に、アセトンに固定された P B S で洗浄し、ウイルス抗原をインフルエンザ A 型 N P ( A - 3、Accurate ) に対する m A b を有する間接的な E L I S A によって検出した。

## 【0090】

## ブランク減少分析

A / V i e t N a m 1 2 0 3 / 2 0 0 4 ( H 5 N 1 ) 又は A / N e t h e r l a n d / 2 1 9 / 0 3 ( H 7 N 7 ) ウイルス ( 10 , 000 p f u ) を、抗 H 5 s c F v - F c s で、37 で30分間、3つの異なる濃度 100  $\mu$ g / ml、10  $\mu$ g / ml 及び 1  $\mu$ g / ml で培養した。ウイルス - 抗体混合物を、12 - ウェルプレートの M D C K 細胞単分子層に移して37 で1時間培養し、その後細胞を洗浄し寒天で覆った。4日間の培養後に寒天の覆いを廃棄し、斑をクリスタル・バイオレットに染色して視覚化した。

## 【0091】

## 赤血球凝集阻止 ( H I ) 分析

鳥インフルエンザウイルスは、優先的に N - アセチルノイラミン酸  $\alpha$  2 , 3 - ガラクトース (  $\alpha$  2 , 3 G a l ) を含むシアル酸レセプターと結合するが、ヒトウイルスは優先的に N - アセチルノイラミン酸  $\alpha$  2 , 6 - ガラクトース (  $\alpha$  2 , 6 G a l ) 結合を含むシアル酸レセプターと結合する。レセプター特性の分子基礎は、ウイルス H A の複合的な残留物でおそらく測定される。赤血球凝集阻止 ( H I ) 試験は、インフルエンザ赤血球凝集素に対する抗体反応を評価する、単純で広く使われている方法である。スティーブンソン氏は、ウマ赤血球を使用することにより、結合に利用可能な  $\alpha$  2 , 3 G a l 結合の比率を増やすことによって、赤血球凝集分析の感度が改善されたと報告している。加えて、H I 分析の滴定濃度は、マイクロ中和分析の滴定濃度と良好に相関した。偽型ウイルスは、説明したようにウマ赤血球の赤血球凝集を使用して、最初に滴定される。最初のハイスループットスクリーニングは同様に、ウマ赤血球懸濁液を使用し、滴定された H 5 / N 1 ウイルスの H I エンドポイントを阻害するファージ抗体の能力を分析することによって行われる。H 5 N 1 リポータ・ウイルス侵入及び H I を抑制するためのより詳細な第2のスクリーニングは、一時的に移入された293T細胞によって生成したタンパク質 A ビーズによって精製された可溶 s c F v F c タンパク質で用量反応研究を使用して行われる。

## 【 0 0 9 2 】

## ウイルス結合抑制分析

0.5 × 10<sup>6</sup> の 293T 細胞を、抗 H5 mAb、コントロール mAb の存在下、または抗体のない状態で、H5 - TH04 - 偽型 HIV ウイルス (p24 のおよそ 500 ng) とともに、0.5% の BSA 及び 0.02% の NaN<sub>3</sub> を含む PBS 緩衝液において 4℃ で培養した。1 時間培養した後に、細胞を遠心沈殿させた。上澄みを採取して、HIV - 1 p24<sup>C</sup> A 捕捉 ELISA キット (NCI、フレデリック、NIH) を使用し、未結合のウイルスを定量化した。細胞を次に 1 又は 2 回洗浄して、同様の方法を使用して細胞結合ウイルスを定量化するために溶解した。

## 【 0 0 9 3 】

## 細胞融合抑制分析

(6 つのウェルプレートにおいて融合性が最高 90% の) 293T 細胞に、リポフェクタミン 2000 (インビトロゲン) を使用して 4 : 1 の比率 (DNA / ウェル合計 3 µg) で、pcDNA3.1 - H5 - TH04 プラスミド及び pcDNA3.1 - N1 を移入させた。トランスフェクションの 6 時間後に培養基に 1 ml の抗 H5、制御又は模擬 mAbs を追加し、細胞を 36 時間培養した。細胞を位相差顕微鏡でシンシチウム形成について観察した。顕微鏡写真は 10x の倍率で撮影した。

## 【 0 0 9 4 】

## パニングのための様々な HA タンパク質の発現及び調製

HA1 は、H5N1 A / Thailand / 2 (SP-33) / 2004 (H5 - TH04) の HA の N 末端フラグメントであり、残留物は 11 ~ 325 である (H3 ナンバリング)。遺伝子をコドン最適化して、C 末端 9 アミノ酸タグ (C9 - タグ: GTETSQVAPA) を有する融合タンパク質として発現させた。融合タンパク質 HA1 - C9 を一時的に 293T 細胞において発現させ、トランスフェクションから 48 時間後に上澄み中の分泌タンパク質を回収し、抗 C9 抗体 1D4 (国立細胞培養センター) と共有結合的に結合したタンパク質 A セファロースを使用した親和性クロマトグラフィによって上澄みから精製した。H5 - VN04 の HA0 タンパク質を生成する方法は、furin-開裂のための baculovirus 重感染がない以外は、下記に記載する H5 - F10 複合体の結晶化の方法と同様である。

## 【 0 0 9 5 】

## ELISA

0.2 µg の純粋な H5 HA タンパク質を 2 µg / mL 含む PBS にて 96 ウェル Maxisorb ELISA プレート (Nunc, NY) を 4℃ で終夜をかけてコートした。プレートを PBS にて 3 回洗浄し、コートしていないタンパク質を除去した。通常の ELISA のために、1 µg / mL の抗 H5 scFv - Fc の後に HRP - 抗ヒト IgG1 を用いて、H5 HA タンパク質への抗 H5 scFv - Fc の結合を検出した。競合 ELISA のために、50 µL (10<sup>-12</sup> pfu) の抗 H5 ファージ - scFv を、5 µg / mL の抗 H5 scFv - Fc と混合し、H5 - VN04 HA コート ELISA プレートに適用した。HA0 に対する ファージ - scFv の結合についての scFv - Fc の競合は、HRP - 抗 M13 を用いた ファージ - scFv の残りの結合を測定することによって決定した。ペルオキシダーゼテトラメチルベンジジン (TMB) 基質システム (KPL, Gaithersburg MD) の培養の後に 450 nm の光学濃度を測定した。

## 【 0 0 9 6 】

## H5 - F10 複合体の発現、精製および結晶化

単鎖 (VH - リンカー - VL) F10 (scFv) をコードする遺伝子を、N 末端周辺質分泌シグナル pelB および C 末端 6 x His タグを含む pSynI ベクターにクローニングした。F10 scFv は、0.5 mM の IPTG と 15 時間おき、25℃ の 0.1% グルコース (w/v) を含む 2YT 培地中で XL10 細胞において発現させた。タンパク質は、始めに製造業者の指示に従って Hisbind Ni-NTA (Novagen) にて、次いで 50 mM トリス-HCl、0.5 M NaCl、pH 8 の Superdex 200 (Amersham Pharmacia Biotech) にて、450 nm の光学濃度を測定した。

am Biosciences)にて精製した。

既に記載されているプロトコール6を用いて、H5-VN04 HA遺伝子の外部ドメインを融合タンパク質として昆虫細胞において発現させた。このコンストラクトは、三量体構造を安定させるためのバクテリオファージT4フィブリチンのC末端三量体形成「foldon」配列と、その後にトロンピン部位およびHis6タグを含む。融合タンパク質のcDNAを、バキュロウイルス導入ベクターであるpAcGP67A(BD Biosciences, Bedford, MA)にクローニングし、組み換えタンパク質を効率よく分泌させた。十分に切断されたHA(HA1-HA2三量体)を得るために、sf9細胞を、経験的に得られた比率のHA0およびフューリンのバキュロウイルス系統と共に同時感染させた。フューリンcDNAは、Dr. Robert Fuller (University of Michigan)からの贈り物であった。感染の3日後に、細胞を遠心にかけて、上清をNi-NTAビーズ(Qiagen Inc., Valencia, CA)と共にインキュベートした。ビーズは、10mM イミダゾールを有するTBSバッファ(10mM Tris.HCl、80mM NaCl、pH8.0)にて洗浄し、250mM イミダゾールを有するTBSにて溶出した。溶出したH5タンパク質は、TBSバッファに対して透析し、さらにMono Q HR10/10カラム(GE Healthcare, Piscataway, NJ)を用いたイオン交換によって精製した。精製されたH5は終夜をかけてトロンピンによって消化させ、さらにTBSバッファのSuperdex200カラムにて精製した。

H5-F10複合体は、2つの精製した構成成分を混合することによって形成され、TBSバッファのSuperdex200にて単離した。ピークの分画をプールし、およそ11mg/mlに濃縮した。H5三量体の完全性は、ゲルろ過法(Superdex200カラム)およびSDS-PAGEを用いて調べた。結晶は22の懸滴蒸気拡散法にて大きくした。2μLのH5-F10を、等しい体積の12.5%PEG 1K、25%エチレングリコール、100mM トリス、pH8.5と混合した。結晶は液体窒素にて急速冷凍し、データ採取した。

#### 【0097】

H5-F10複合体の共結晶化

H5-F10の共結晶化のために、F10を大腸菌において発現させ、Ni-NTAおよびゲル濾過によって精製した。H5は、H5及びフューリンバキュロウイルス系統の共感染によりsf9細胞において発現させ、Ni-NTA、陰イオン交換およびゲル濾過クロマトグラフィにて精製した。H5-F10複合体は、H5を過剰量のF10と混合することによって得、ゲル濾過にて単離した。結晶は、22の懸滴蒸気拡散法を用いて、2μLの複合体(およそ11mg/ml)を、等しい体積の12.5%PEG 1K、25%エチレングリコール、100mM トリス、pH8.5と混合することによって大きくした。結晶構造は、分子置換(Molecular Replacement)による3.2分解能で測定し、優れた幾何学を有する0.29のR<sub>FREE</sub>に精密化した。

#### 【0098】

データ採取、構造決定および分子構造精密化

X線回折データは、Stanford Synchrotron Radiation Laboratory(SSRL)ビームライン7.1および9.2で採取した。データは、XDS<sup>7</sup>およびHKL2000パッケージにて処理した。

H5-F10複合体の構造は、探索モデルとして、H5(A/Vietnam/1194/04; PDBコード2IBX)の構造とSARS nAb 80R(PDBコード2GHW)のscFv構造を使用したPHASERによる分子置換によって測定した。scFv構造相同モデルをWHATIF9にて構築した。非対称性ユニットは2つのH5三量体および6つのF10分子を含む。

分子置換の溶液は、CootおよびXtalviewによる手動モデル再構築とCNSにおける模擬アニリングを有するプログラムREFMAC5による数ラウンドの分子構造精密化に用いた。最終モデルは、6つのHAコピーについてそれぞれ506/503/503/496/495/496残基、各nAb10について233残基、24のN-アセチル-d-グルコサミンおよび6β-d-マンノース、0の水分子を含む。幾何学的

なパラメータは、P R O C H E C KおよびR a m p a g eにて評価した。

#### 【0099】

H 5 に対する h M a b によるマウスの保護

すべてのマウス実験は、C D C 動物保護と使用委員会にて承認されるプロトコールに従って、U S D A および C D C 公認の生物学的安全性レベル3 (B S L 3) 動物施設において実施した。雌8 ~ 10 週齢のB a l b / C マウス(1 群につき5 匹)をすべての実験に用いた。すべての群について、マウスを2 週間観察し、加重させ、死亡を毎日確認した。

予防的マウス研究。10 m g / k g および2 . 5 m g / k g <sup>5 3</sup> の2 用量の3 つのh M a b (D 8 - I g G 1、F 1 0 - I g G 1 およびA 6 6 - I g G 1) 又はコントロールh M a b 8 0 R - I g G 1 をマウスの腹膜内に投与した(i . p .)。h M a b 投与の2 4 時間後に、すべてのマウス群を、軽い麻酔下で、10 M L D <sub>50</sub> (50 % のマウス致死量) ウイルス用量のA / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1) 又はA / H K / 4 8 3 / 9 7 (H 5 N 1) を鼻腔内投与(i . n .) することにより抗原刺激した。

治療的マウス研究。マウスは、始めにA / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1) 又はA / H K / 4 8 3 / 9 7 (H 5 N 1) の10 M L D <sub>50</sub> にてi . n . 感染させた。次いで、10 m g / k g のH 5 に対する3 つのh M a b またはコントロールh M a b を、A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1) 感染の2 4、4 8 および7 2 時間後にマウスに腹腔内投与した。A / H K / 4 8 3 / 9 7 (H 5 N 1) 感染マウスでは、h M a b をウイルス抗原刺激の2 4 時間後にのみ注入した。

#### 【0100】

抗H 5 ファージ抗体の同定。

H A 1 に対する抗体。精製した組み換えH A 1 を用いて、2 つの非免疫性ヒトs c F v ライブラリから別々に抗体を選択した。H A 1 について2 ラウンドの選別の後、E L I S A によってスクリーニングされた9 6 のうち5 8 のクローンは、H A 1 特異的なポジティブクローンであった。5 8 のH A 1 ポジティブクローンの配列決定分析によって、3 つの固有の抗H A 1 s c F v が同定された(3 8 B および1 C)。同種の選別およびスクリーニング実験を繰り返した。新規なクローンは同定されなかったが、上記と同じ3 つのs c F v が得られた。2 A のアミノ酸配列を表1 B に示す。

H 5 の外部ドメイン(H A 0) に対する抗体。精製した組み換え三量体H A 0 を用いて、H A 1 について使用したのと同じ抗体ライブラリを選択した。H A 0 について2 ラウンドの選別の後、E L I S A により、H A 0 特異的結合について合計3 9 2 のクローンがスクリーニングされた。9 7 のクローンはH A 0 タンパク質を特異的に認識した。配列分析によって1 0 の固有の抗H A 0 s c F v (7、8、1 0、1 7、4 0、6 6、8 0、8 8、9 0 および9 8) が同定された。6 の異なるV H と1 0 の異なるV L 遺伝子が明らかとなった(いくつかのs c F v は同じV H 遺伝子を共有していた)。6 のうち5 の異なるV H は、一つの遺伝子ファミリー、I G H V 1 - 6 9 に属する。V L 遺伝子はV H 遺伝子より非常に多様であり、1 0 のうち3 つのV L はカップ鎖である。(図3)。

#### 【0101】

確実な単回ラウンドレポーターウイルスシステムの確立

H 5 - S P 3 3、H 1 - S C / 1 9 1 8 又はH 1 - P R / 3 4 によって偽型化したH 5 N 1 又はH 1 N 1 の単回ラウンドH I V ルシフェラーゼレポーターウイルスは、p c D N A 3 . 1 - H 5 - S P 3 3、H I V - 1 G a g - P o l をコードするH I V パッケージベクターp C M V R 8 . 2、H I V - 1 L T R のコントロール下にホタルルシフェラーゼレポーター遺伝子をコードしている導入ベクターp H I V - L u c、及び発現プラスミドp c D N A 3 . 1 - N 1 である4 つのプラスミドにより2 9 3 T 細胞を共形質移入することによって作製した。形質移入の3 6 時間後、ウイルス上清を回収し、4 に保存した。H A 0 偽型ウイルスの力価は2 9 3 T 細胞を感染させて、測定した。偽型ウイルスを作製する形質移入においてN 1 発現プラスミドを含めることにより、H 5 偽型ウイルスの力価が劇的に増加しうる。H 5 偽型ウイルスの適切な行動はH 5 N 1 (A / V i e t N a m / 2 0 0 4) に対するフェレット免疫血清を使用して調べた。これらのウイルスは抗血清によっ

て強力に中和されうるが、出血前(pre-bleeding)血清によっては中和されない。ゆえに、中和抗体の効率的なスクリーニングのために、確実な単回ラウンド高効率レポーターウイルスシステムが確立した。

#### 【0102】

実施例2：H5-S P 3 3により偽型化されたウイルスを用いたH5 N 1に対する中和抗体の同定とマイクロ中和アッセイ

偽型化されたウイルスを用いた中和アッセイの結果。

抗H5抗体の二価のs c F v F cを産生し、H A 0 - 偽型ウイルスに対する中和活性について試験した。我々は、2 Aが中程度の中和抗体であり、3 8 Bおよび1 Cが中和抗体でないことを発見した(データは示さない)。以下に示す他のアッセイ(エピトープマッピング)のための有用な抗H A 試薬として2 A抗体を用いた。H A 0三量体を標的として使用して、我々はH A 0に対する10の新規な固有の抗体を同定した。これらのA bは、我々の研究室において最近設けられた新しいハイスループットファージ-s c F vスクリーニング法を用いて、中和活性についてスクリーニングした。簡単にいうと、個々のクローンのファージ-s c F vを、直接中和アッセイに用いて、その後すぐに96ウェルプレートにおいてポジティブクローンについてE L I S Aによってスクリーニングした。この計画では、中和活性は48時間でみられるであろう。こうすることによって、我々は、時間を要する可溶性A bのサブクローニングと発現の工程を回避する。

図に示されるように、ファージ-s c F vによって示された中和A bは、可溶性s c F v F c A bにて確認した場合に強力に中和していることがわかった。ファージ-s c F vによってスクリーニングされた10すべての抗体は強力な中和A bである。また、我々は、10のうちの3つの抗体(D 8、F 1 0およびA 6 6)を完全長ヒトI g G 1に変換したところ、H5-S P 3 3偽型ウイルスにも強力な活性がみられた。また、3つの抗体はH 1 N 1を交差中和した。H 1 - S C / 1 9 1 8の強力に中和された菌株およびH 1 - P R / 3 4の中程度に中和された菌株(図4 A - 4 C参照)。

#### 【0103】

マイクロ中和アッセイの結果。図4 A - 4 C及び9 Bに示されるように、10の抗H5抗体は異なるレベルの中和を表した。F 1 0 - F c、A 6 6 - F c、E 8 8 - F cおよびE 9 0 - F cは最も強力な阻害薬であるようであり、10 u g / m lで10000 p f uウイルスの95%以上、そして1 u g / m lで50%以上を中和する。また、我々は、10 u g / m lまたは1 u g / m lのこれら4つの抗体に100 p f uを用いた場合に完全なブラック減少を観察した(データは示さない)。

10の抗体(s c F v - F c)は、この場合クレイド1ウイルス、A / T h a i l a n d / 2 - S P - 3 3 / 2 0 0 4(H5 N 1)のH5偽 - ウイルス(表面にH5を提示するH I V - 1コアのみを有するウイルス様粒子)(「H5-T H 0 4」)を中和することが明らかとなった。また、10すべての抗体は、ストリンジェントなブラック減少アッセイにおいてH5-V N 0 4(クレイド1)およびA / I n d o n e s i a / 5 / 2 0 0 5(「H5-I N 0 5」、クレイド2.1)ウイルスに対して高いが異なるレベルの中和を示したことから、中和エピトープ(一又は複数)は異なるH5クレイド間で保存されていることが示唆される。しかしながら、いずれのA bもグループ2ウイルス、H P A I H 7 N 7株、A / N e t h e r l a n d s / 2 1 9 / 0 3(H7 N 7)(H7-N L 0 3)を中和しなかった(図4 A)。

10すべてのn A bが三量体H5を結合し、互いに対して交差競合したことから(図9)、これらのn A bはオーバーラップするエピトープを認識することが示される。この発見とV H配列多様性および中和作用強度に基づいて、3つのn A b(D 8、F 1 0およびA 6 6)が選択され、完全長ヒトI g G 1に変換した。3つすべてのn A b I g G 1は、高い親和性(K dおよそ100 ~ 200 p M)および非常に遅い解離速度(k dおよそ10<sup>-4</sup> s<sup>-1</sup>)で、インビトロで組み換えH5(H5-V N 0 4)に結合した(図10)。

#### 【0104】

実施例3：B I A c o r e T - 1 0 0を用いることによるD 8 - I g G 1、F 1 0 - I g

G 1 および A 6 6 - I g G 1 に対する H A 0 (A / V i e t n a m 1 2 0 3 / 0 4 の H A の外部ドメイン)の結合の動態学的特徴づけ

M a b は抗ヒト I g G 1 により C M 4 チップに捕獲させ、様々な濃度(20、10、5、2.5、2.5、1.25、0.625 nM)の三量体 H A 0 をチップ表面に注入した。結合動態は、1:1 ラングミュア結合モデルを使用して評価した。記録された結合曲線(ブランク比較対象を減算したもの)を黒で、算出カーブを赤で示す。すべての  $k_a$ 、 $k_d$ 、 $KD$  は、3 回の実験の平均と標準誤差を表す。我々は、B i a c o r e T 1 0 0 および B i a c o r e T 1 0 0 評価用ソフトウェアを使用して、1:1 ラングミュアモデルにフィッティングさせることによって、3 つの抗 H A M A b の動態学的速度および親和定数を決定した。下記の図に示すように、D 8 および F 1 0 では類似した  $k_a$ 、 $k_d$  および  $KD$  が観察され、A 6 6 はその他 2 つの抗体より相対的に速い解離速度のため、8 および 1 0 より 1.8 倍低い  $KD$  を有していた。M a b と H A 0 との複合体は安定しており、これは非常に遅い解離速度( $8.8 \pm 1.1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \sim 1.8 \pm 0.3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ )と p M レベルで H 5 三量体との高い親和性結合により示された。(図 1 0 A 及び 1 0 B)

#### 【0105】

実施例 4：抗 H 5 抗体の予防的および治療的効果

H 5 N 1 および H 1 N 1 ウイルス感染に対するヒト n A b の予防効果を、B A L B / c マウスモデルにおいて評価した。マウスは、致死性ウイルス抗原刺激の前又は後に異なる用量の n A b にて処置した。

予防効果(図 7、b、g 及び h)。マウスは、10 半致死量( $MLD_{50}$ )の H 5 N 1 又は H 1 N 1 の鼻腔内投与(i.n.)による致死性抗原刺激の 24 時間前に、抗 H 5 n A b 又はコントロール m A b にて処置した。10 mg / kg の 3 つの n A b 何れかの腹腔内(i.p.)投与により、H 5 - V N 0 4 (A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1)、クレイド 1)にて抗原刺激したマウスは完全に予防された。低い抗体用量(2.5 mg / kg)でも高い予防作用であった(図 7 a)。10 mg / kg の 3 つの n A b 何れかにて処置したマウスの 80 ~ 100 %において、H 5 - H K 9 7 (A / H o n g K o n g / 4 8 3 / 9 7 (H 5 N 1)、クレイド 0)ウイルスに対する予防効果が観察された(図 7 b)。3 つ何れかの n A b (10 mg / kg の単回注射)により、H 1 - W S N 3 3 (A / W S N / 1 9 3 3 (H 1 N 1))ウイルスにて抗原刺激したマウスが完全に予防された(図 7 g)。10 mg / kg の単回注射の場合、D 8 および F 1 0 は、H 1 - P R 3 4 (A / P u e r t o R i c o / 8 / 3 4 (H 1 N 1))にて抗原刺激したマウスを完全に予防した。25 mg / kg の抗体を単回注射した場合、A 6 6 はマウスを完全に予防した(図 7 h)。

治療効果(図 7 c - f)。マウスに H 5 - V N 0 4 を接種し、24、48、72 h p i (図 7 c、e および f)の n A b、または、24 h p i に H 5 - H K 9 7 (図 7 d)を注射した。接種後 24 時間(24 h p i)に 15 mg / kg (ヒトにおいて治療上達成可能な用量)の 3 つの n A b の何れかを腹腔内投与することにより、10 倍  $MLD_{50}$  の H 5 - V N 0 4 又は H 5 - H K 9 7 ウイルスにて抗原刺激したマウスの 80 ~ 100 %が予防された(図 7 c - d)。H 5 - V N 0 4 にて 48 又は 72 h p i に同じ用量の n A b にて処置したマウスは、類似又はより高いレベルの予防を示した(図 7 2 e - f)。すべての抗 H 5 n A b 処置群における生存マウスは健康なままであり、2 週間の診察期間にわたって体重損失は僅かであった(データは示さない)。

#### 【0106】

実施例 5：治療的動物実験における抗 H 5 抗体による組織でのウイルス力価の抑制

更に、治療上用いられる n A b の抗ウイルス効果を、局所的な複製の抑制の指標として肺での、又は H 5 N 1 感染の特徴である全身の蔓延を表す脾臓及び脳での、抗原刺激後 4 日目のウイルス力価を測定することによって調べた。n A b は、抗原刺激後 48 時間内に投与された場合、コントロールと比較して、H 5 n A b 処置マウスの肺におけるウイルス複製を有意に抑制した(図 1 2)。特に、D 8 および F 1 0 の 2 つの n A b は 72 h p i に投与された場合抗ウイルス効果を示した。脳への全身性ウイルス蔓延はコントロール動

物において低く、n A b 治療の何らかの効果を不明瞭にするものであった。しかしながら、3つのn A bが72 h p i 以内に投与される場合であってもウイルスの脾臓への蔓延が1000倍以上抑制されることから、n A b 治療の全身蔓延に対する劇的な効果が示された。

#### 【0107】

実施例6：抗体D8、F10およびA66の初期エピトープマッピング

H5-S P 3 3の、様々な完全長野生型H AおよびH A変異発現プラスミドを、293 T細胞に過渡的に形質移入した。形質移入の48時間後に、抗H5抗体(10 u g / m l)を、形質移入した293 T細胞と共に4 で1時間インキュベートした。次いで、細胞を、0.5% B S Aおよび0.1% N a N 3を含むP B Sにて3回洗浄した。H A形質移入細胞に対する抗H5抗体の結合の検出のために、F I T C標識ヤギ抗ヒトI g G (P i e r c e)を二次抗体として用い、細胞と共に4 で30分間インキュベートした。各変異体の発現を示すために、抗体2 Aをコントロール抗体として用いた。以下の表からわかるように、M a b D 8、1 F 0およびA 6 6のエピトープは類似しており、H A 1上の位置307およびH A 2上の52、59、65、93に位置している。これらのアミノ酸の位置は、H5(A / V i e t n a m / 1 2 0 3 / 0 4 (H 5 N 1))の結晶構造において強調して示す。

#### 【0108】

実施例7：クラスターH1ウイルスの結合と中和。

H5N1ウイルスの交差クレイド中和(図4)により、グループ1 H1クラスター内の他のH Aサブタイプとの中和についての試験を行った(図11)。3つすべてのn A bは、完全長H1(A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1 9 1 8 (H 1 N 1)) (「H1-SC1918」)及びA / P u e r t o R i c o / 8 / 3 4 (H 1 N 1)) (「H1-PR34」)、H2(A / J a p a n / 3 0 5 / 5 7 (H 2 N 2)) (「H2-JP57」)、H6(A / c h i c k e n / N e w Y o r k / 1 4 6 7 7 - 1 3 / 1 9 9 8 (H 6 N 2)) (H6-NY98)を発現する細胞には結合したが、グループ2サブタイプ、H7((A / F P V / R o s t o c k / 3 4 (H 7 N 1)) (「H7-FP34」))には結合しなかった(図4)。また、これらは、H1-SC1918 - 及びH1 - P R 3 4 - 偽型ウイルス感染も中和した(図4)。加えて、F10は、P R 3 4 (H 1 N 1)、A / O h i o / 8 3 (H 1 N 1)) (「H1-OH83」)およびA / A n n A r b o r / 6 / 6 0 (H 2 N 2)感染を中和した(図4)。これらの結果から、これらのn A bがH5クレイドの間で高く保存されているだけでなく、H1、H2およびH6サブタイプ及び他のクラスター内の潜在的なサブタイプにも存在するH A上のエピトープを認識することが示唆される。したがって、我々は、ウイルス中和のメカニズムを詳細に調査することに決めた。

#### 【0109】

実施例8：n A bは細胞融合を阻害するがウイルス結合を阻害しない。

抗H A A bが中和を媒介する2つの方法は、その細胞レセプターへのH A結合をブロックすることと、低p Hにより誘導されるH Aの立体構造変化を妨げることによるウイルス-宿主膜融合の阻害である。我々は、3つのn A bは細胞へのウイルス結合に影響せず、また血球凝集反応(赤血球の結合および架橋結合)も阻害しなかったのに対して、血球凝集反応を阻害するマウス抗H5 n A b、17 A 2.1.2およびフェレット抗H5N1血清はバックグラウンドレベルにまで結合を低減した。

次に、我々は、H5-T H 0 4のH5とN1との発現プラスミドが高密度の293 T細胞に同時形質移入されているモデルシステムを用いて、宿主細胞膜の融合を阻害するn A bの能力を試験した。表面に発現されたウイルスタンパク質によって細胞が融合し、融合細胞が形成される。これは、通常の培養条件下で形質移入後36~48時間以内に自発的に起こる。形質移入の6時間後にn A bを添加し、36時間後に観察した場合、3つすべての場合において融合細胞形成の完全な阻害が観察された。n A bがない場合、形質移入の30時間目に酸性培地(p H 5)に短時間(3~4分)さらした細胞はたくさんの融合細胞を形成する。また、n A b(5 u g / m l)は、これらの条件下で融合細胞形成を完全に妨

げた(データは示さない)。まとめると、これらの結果は、3つすべてのnAbは、レセプター結合を妨げることなく膜融合を阻害することを示す。

#### 【0110】

実施例9：nAbエピトープの構造的特徴づけ

次に、我々は、3.2 分解能のHA(H5-VN04)と複合体化したscFv断片の結晶構造の解析と突然変異により、nAbの一つであるF10の結合のエピトープと様式を決定した。(図6および表4)。

複合体では、各H5三量体は、抗体1つにつきタンパク質表面のおよそ1500<sup>2</sup>を覆っている対称性関連部位で、F10の3つの分子を結合する。H5自体の構造はF10結合によってほとんど変わらない。HAは、HA1およびHA2の2つのサブユニットへのタンパク質分解性切断によって活性化される、単鎖、HA0として合成される。切断により、膜近位のステムに「融合ペプチド」(HA2の始めのおよそ21残基を含む)が覆われる。F10結合はもっぱらこの領域で起こり(図6)、融合ペプチド、中性pH立体構造内の場所にペプチドを固定するHA1とHA2の成分(いずれもこの領域の構造に不可欠なもの)、並びに酸性pHで多くの立体構造変化を受けるHA2の大きならせん状ヘアピンと密接に接触し、これによりウイルス膜近位のポケットからウイルスの遠位の表面へ融合ペプチドが押し出される。これはエンドソーム膜との融合の引き金となりうる。

#### 【0111】

F10の重鎖はH5結合において主に働くことから、その3つの相補性決定領域(CDR)の先端を利用する。各々のF10分子は、HA三量体の一つの単量体内でHA1及びHA2サブユニットの両方と接触する(図6)。接触領域はHA2融合ペプチドの一部によって形成されるポケットを含み、一端にHA1の成分を他端にHA2のヘリックスαAの露出面を有する(図6)。3組の抗体残基 - CDR H2のF55とM54、及びCDR H3のY102は主要な接触点を形成する。F55のフェニル環は、融合ペプチドループの突出ループ(HA2残基DGW19<sub>2</sub> - 21<sub>2</sub>(H3番号付けスキーム; 下付き文字1および2はHA1鎖およびHA2鎖を指す))と、2つの隣接ヒスチジン(残基181および381)及びトリプトファン、W21<sub>2</sub>の芳香族側鎖とによって形成される平坦表面全体に位置する。また、M54の側鎖は、W21<sub>2</sub>およびH38<sub>1</sub>の芳香族環、並びにヘリックスAのI45<sub>2</sub>の側鎖と接触するのに対して、その主鎖はH38<sub>1</sub>の側鎖とカルボニル酸素水素結合する。Y102は、その側鎖を、Aヘリックスの4つの側鎖によって造られる疎水性クレバスに嵌入し、更に、融合ペプチドの主鎖カルボニル(D19<sub>2</sub>)に水素結合する。CDR H1ループは、ヘリックスαAのC末端とヘッド領域の基部のHA1のループと複数接触する(図6)。

並行して、エピトープ決定の補助のためにらせんαAについて突然変異誘発実験を行った(図6)。抗体と直接接触する3つの残基の突然変異：V52A/E、N53AおよびI56Aは抗体結合を有意に低減するか又は抗体結合を除くが、保存的突然変異であるV52Lは影響を及ぼさなかった。コントロールとして、抗体と接触しないらせんの異なる露出面上の突然変異は抗体結合に影響を及ぼさなかった。ゆえに、αAヘリックスの突然変異誘発は、F10のために結晶学的に定められるエピトープと、十分に一致している。さらに、その他の2つのnAbはほぼ同じ変異体 - nAb結合プロファイルを示したことから(構造的データは存在しない)、密接に重なり合うエピトープと、競合的結合との一致を示唆する(図6、図9)。まとめると、我々は、膜融合の状態を引き起こす立体構造変化の引き金(多くの場合ポケットからの融合ペプチドの放出)となる領域においてHAの中性pH立体構造を安定させることによって、3つすべてのnAbが、ウイルスを中和したと結論づける。

#### 【0112】

実施例10：広域スペクトル中和の構造的基本

F10エピトープによって定められるHAの領域は、16のHAサブタイプ間で高く保存されている(図6および表5)。融合ペプチドは、中性pH立体構造においても膜融合の過程の間においても明確な構造をとっており、突然変異誘発研究により許容される配列変

化はほとんどないことが示された。また、H A 2 α A の露出したらせん状の表面は、両群全体でほとんど変化していない。その理由はおそらく、その表面が、膜融合状態において長い三量体のコイルドコイルの内側表面を形成するために再編成されるためであろう。ゆえに、2つの異なる環境において2つの非常に異なる構造を取るためのこれらセグメントの必要性はおそらく、配列に対する進化の上での強い制約であり、16のH A サブタイプにわたる保存の明確な理論的根拠となりうる。

グループ1のサブタイプH 1、H 5およびH 9、そしてグループ2のH 3およびH 7について結晶構造を決定し、構造を、系統発生分析によって定まる2つのグループと一致する2つの異なるクラスに分けた。更なる比較により、2つのクラスがF 10 エピトープによって定まる領域内の詳細な三次元レベルで容易に区別されることが示唆される。各々のクラスの特徴であるコア内に覆われた2、3の重要なアミノ酸(例えば17<sub>1</sub>および111<sub>2</sub>)において配列が異なることにより、エピトープ内の様々な側鎖の定位と、らせんα A に関するポケットの配置が一致して異なる。

各グループ/クラス内で、エピトープ領域は高く保存されており、所定のクラスター内の相違が非常に僅かであり、たった2、3しか変化しておらず、一般にクラスター間で保存されている(例えば位置18<sub>1</sub>および38<sub>1</sub>、図6 D)。3つのn A bがH 1クラスターの4つすべてのメンバーを認識するという我々の所見は、エピトープ周辺でのアミノ酸相違(このクラスターではK、Q又はVである残基401など)は結合に重要でないことを示す。

我々が選択した10の抗体は、実質的に配列と長さが異なる異なる5セットのV H C D R 1 - 3を有している。しかしながら、ポケット内に挿入するC D R 2(M 54、F 55)およびC D R 3(Y 102)の3つの重要な残基は保存されている。変化したC D R 内の重要な残基の保存は、ここで試験したものを越えて、n A bのこのグループによるH A サブタイプ/クラスター認識の範囲を拡大するものであってよい。しかしながら、6のうち4つのグループ2サブタイプは位置381でグリコシル化されており、F 10 エピトープ周辺に位置していることは注目すべきことである。モデリング研究は立体的衝突(しかし、C D R H 1ループとのみ)を予測するものであり、それはおそらくH 7 ウイルスの結合/中和の欠如の観察に貢献するであろう。

#### 【0113】

実施例11：抗H 5 n A bはグループ1 H A サブタイプの広範囲に結合する

グループ1ウイルスはインフルエンザAウイルスの合計16のうち10のサブタイプを含み、さらに3つの「クラスター」、H 1 a、H 1 bおよびH 9に分類される。我々は、グループ2サブタイプH 3を除き、トリH 5と最も一般的なヒトインフルエンザサブタイプを含む、クラスターH 1 aおよびH 1 bの7つすべてのH A サブタイプへの結合について我々のn A bを試験した。H 5に加えて、我々は、3つすべてのn A b I g G 1が、1918の「スペインのインフルエンザ」；H 2 N 2のH 2；及びH 6 N 2からのH 6；並びにクラスター1 bサブタイプ：H 1 N 9のH 11；H 1 N 6のH 13；及びH 1 N 3のH 16を含む、H 1 N 1の2つの異なる菌株の完全長H 1を発現する細胞に結合したことを発見した。しかしながら、これらはいずれも、グループ2サブタイプ、H 7 N 1のH 7には結合しなかった(図13)。図13についての詳細を以下に示す。H 1、H 2、H 5、H 6(クラスタH 1 a)およびH 11、H 13およびH 16(クラスタH 1 b)への抗H 5 n A b結合のF A C S分析。293 T細胞は、異なるH A発現プラスミドを過渡的に形質移入した。細胞へのN A b結合はF A C Sによって分析した。H 5-特異的抗体2 Aおよび80 Rはネガティブコントロールである。グループ2 H A、H 7への結合の欠如も示される。ウイルス株についての詳細は以下の通りである。H 1-S C 1918((A / S o u t h C a r o l i n a / 1 / 1918(H 1 N 1)) H 1-PR 34(A / P u e r t o R i c o / 8 / 34(H 1 N 1))、H 2-J P 57(A / J a p a n / 305 / 57(H 2 N 2))、H 5-T H 04(A / T h a i l a n d / 2 - S P - 33 / 2004(H 5 N 1))、H 6-N Y 98(A / C h i c k e n / N e w Y o r k / 14677-13 / 1998(H 6 N 2))、H 7-F P 34(A / F P V / R o s t o c k / 34(H 7 N 1))、H 11

-MP74(A/Duck/memphis/546/74(H11N9))、H13-MD77(A/Gull/MD/704/77(H13N6))、およびH16-DE06(A/Shorebird/DE/172/06(H16N3))。

【0114】

#### 参考文献

1. W.H.O. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs211/en/>. World Health Organization factsheet 211: influenza (2003).
2. Webster, R. G. 1918 Spanish influenza: the secrets remain elusive. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 1164-6 (1999).
3. de Wit, E. & Fouchier, R. A. Emerging influenza. *J Clin Virol* 41, 1-6 (2008).
4. Wright, P., Neumann, G. & Kawaoka, Y. in *Fields Virology* (eds. Knipe, D., Howley, P., Griffin, D., Lamb, R. & Martin, M.) 1692-1740 (Lippincott Williams & Wilkins 2006).
5. Fauci, A. S. Pandemic influenza threat and preparedness. *Emerg Infect Dis* 12, 73-7 (2006).
6. Fouchier, R. A. et al. Characterization of a novel influenza A virus hemagglutinin subtype (H16) obtained from black-headed gulls. *J Virol* 79, 2814-22 (2005).
7. Ha, Y., Stevens, D. J., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. H5 avian and H9 swine influenza virus haemagglutinin structures: possible origin of influenza subtypes. *Embo J* 21, 865-75 (2002).
8. Russell, R. J. et al. H1 and H7 influenza haemagglutinin structures extend a structural classification of haemagglutinin subtypes. *Virology* 325, 287-96 (2004).
9. W.H.O. ([http://www.who.int/csr/disease/avian\\_influenza/guidelines/summaryH520070403.pdf](http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/summaryH520070403.pdf), 2007).
10. W.H.O. Evolution of H5N1 avian influenza viruses in Asia. *Emerg Infect Dis* 11, 1515-21 (2005).
11. Subbarao, K. et al. Characterization of an avian influenza A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal respiratory illness. *Science* 279, 393-6 (1998).
12. de Jong, J. C., Claas, E. C., Osterhaus, A. D., Webster, R. G. & Lim, W. L. A pandemic warning? *Nature* 389, 554 (1997).
13. W.H.O. [http://www.who.int/csr/disease/avian\\_influenza/en/](http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/). (2008).
14. Nicholson, K. G. et al. Safety and antigenicity of non-adjuvanted and MF59-adjuvanted influenza A/Duck/Singapore/97 (H5N3) vaccine: a randomised trial of two potential vaccines against H5N1 influenza. *Lancet* 357, 1937-43 (2001).
15. Stephenson, I. et al. Cross-reactivity to highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses after vaccination with nonadjuvanted and MF59-adjuvanted influenza A/Duck/Singapore/97 (H5N3) vaccine: a potential priming strategy. *J Infect Dis* 191, 1210-5 (2005).
16. Stephenson, I. et al. Boosting immunity to influenza H5N1 with MF59-adjuvanted H5N3 A/Duck/Singapore/97 vaccine in a primed human population. *Vaccine* 21, 1687-93 (2003).
17. Treanor, J. J., Campbell, J. D., Zangwill, K. M., Rowe, T. & Wolff, M. Safety and immunogenicity of an inactivated subvirion influenza A (H5N1) vaccine. *N Engl J Med* 354, 1343-51 (2006).
18. Treanor, J. J. et al. Safety and immunogenicity of a recombinant hemagglutinin vaccine for H5 influenza in humans. *Vaccine* 19, 1732-7 (2001).

19. Bresson, J. L. et al. Safety and immunogenicity of an inactivated split-virion influenza A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vaccine: phase I randomised trial. *Lancet* 367, 1657-64 (2006).
20. Lin, J. et al. Safety and immunogenicity of an inactivated adjuvanted whole-virion influenza A (H5N1) vaccine: a phase I randomised controlled trial. *Lancet* 368, 991-7 (2006).
21. W.H.O. <http://www.who.int/csr/disease/influenza/influenzanetwork/en/index.html>. (2008).
22. Carrat, F. & Flahault, A. Influenza vaccine: the challenge of antigenic drift. *Vaccine* 25, 6852-62 (2007).
23. Cinatl, J., Jr., Michaelis, M. & Doerr, H. W. The threat of avian influenza A (H5N1). Part IV: Development of vaccines. *Med Microbiol Immunol* 196, 213-25 (2007).
24. Subbarao, K. & Luke, C. H5N1 viruses and vaccines. *PLoS Pathog* 3, e40 (2007).
25. Leroux-Roels, I. et al. Broad Clade 2 Cross-Reactive Immunity Induced by an Adjuvanted Clade 1 rH5N1 Pandemic Influenza Vaccine. *PLoS ONE* 3, e1665 (2008).
26. Baras, B. et al. Cross-Protection against Lethal H5N1 Challenge in Ferrets with an Adjuvanted Pandemic Influenza Vaccine. *PLoS ONE* 3, e1401 (2008).
27. Marasco, W. A. & Sui, J. The growth and potential of human antiviral monoclonal antibody therapeutics. *Nat Biotechnol* 25, 1421-34 (2007).
28. Stevens, J. et al. Structure and receptor specificity of the hemagglutinin from an H5N1 influenza virus. *Science* 312, 404-10 (2006).
29. Sui, J. et al. Potent neutralization of severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus by a human mAb to S1 protein that blocks receptor association. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 2536-41 (2004).
30. Huang, C. C. et al. Structural basis of tyrosine sulfation and VH-gene usage in antibodies that recognize the HIV type 1 coreceptor-binding site on gp120. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 2706-11 (2004).
31. Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Receptor binding and membrane fusion in virus entry: the influenza hemagglutinin. *Annu Rev Biochem* 69, 531-69 (2000).
32. Kida, H., Yoden, S., Kuwabara, M. & Yanagawa, R. Interference with a conformational change in the haemagglutinin molecule of influenza virus by antibodies as a possible neutralization mechanism. *Vaccine* 3, 219-22 (1985).
33. Vanlandschoot, P. et al. An antibody which binds to the membrane-proximal end of influenza virus haemagglutinin (H3 subtype) inhibits the low-pH-induced conformational change and cell-cell fusion but does not neutralize virus. *J Gen Virol* 79 ( Pt 7), 1781-91 (1998).
34. Su, Y., Zhu, X., Wang, Y., Mu, M. & Tien, P. Evaluation of Glu11 and Gly8 of the H5N1 influenza hemagglutinin fusion peptide in membrane fusion using pseudotype virus and reverse genetics. *Acta Virol* 153, 247-257 (2008).
35. Yamada, S. et al. Haemagglutinin mutations responsible for the binding of H5N1 influenza A viruses to human-type receptors. *Nature* 444, 378-82 (2006).
36. Stevens, J. et al. Structure of the uncleaved human H1 hemagglutinin from the extinct 1918 influenza virus. *Science* 303, 1866-70 (2004).
37. Daniels, R. S. et al. Fusion mutants of the influenza virus hemagglutinin glycoprotein. *Cell* 40, 431-9 (1985).
38. Thoennes, S. et al. Analysis of residues near the fusion peptide in the influenza hemagglutinin structure for roles in triggering membrane fusion. *Virology* 370, 403-14 (2008).

39. Earp, L. J., Delos, S. E., Park, H. E. & White, J. M. The many mechanisms of viral membrane fusion proteins. *Curr Top Microbiol Immunol* 285, 25-66 (2005).
40. Godley, L. et al. Introduction of intersubunit disulfide bonds in the membrane-distal region of the influenza hemagglutinin abolishes membrane fusion activity. *Cell* 68, 635-45 (1992).
41. Bullough, P. A., Hughson, F. M., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Structure of influenza haemagglutinin at the pH of membrane fusion. *Nature* 371, 37-43 (1994).
42. Ha, Y., Stevens, D. J., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. X-ray structures of H5 avian and H9 swine influenza virus hemagglutinins bound to avian and human receptor analogs. *Proc Natl Acad Sci U S A* 98, 11181-6 (2001).
43. Wilson, I. A., Skehel, J. J. & Wiley, D. C. Structure of the haemagglutinin membrane glycoprotein of influenza virus at 3 Å resolution. *Nature* 289, 366-73 (1981).
44. Kashyap, A. K. et al. Combinatorial antibody libraries from survivors of the Turkish H5N1 avian influenza outbreak reveal virus neutralization strategies. *Proc Natl Acad Sci U S A* Early edition (2008).
45. Huang, I. C. et al. Influenza A virus neuraminidase limits viral superinfection. *J Virol* (2008).
46. Glaser, L. et al. A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity. *J Virol* 79, 11533-6 (2005).
47. Naldini, L., Blomer, U., Gage, F. H., Trono, D. & Verma, I. M. Efficient transfer, integration, and sustained long-term expression of the transgene in adult rat brains injected with a lentiviral vector. *Proc Natl Acad Sci U S A* 93, 11382-8 (1996).
48. Rowe, T. et al. Detection of antibody to avian influenza A (H5N1) virus in human serum by using a combination of serologic assays. *J Clin Microbiol* 37, 937-43 (1999).

【 0 1 1 5 】

表 3 H5-F10 境界面の接触残基

| F10 | FRH1 | CDRH1 |     |     |     | CDRH2      |            |  | CDRH3 |      |                          |            |      |
|-----|------|-------|-----|-----|-----|------------|------------|--|-------|------|--------------------------|------------|------|
|     |      | V27   | T28 | S30 | S31 | M54        | F55        |  | P100  | S101 | Y102                     | I103       | S105 |
| HA1 |      |       |     | Q40 |     | H38        | H38        |  |       |      |                          |            |      |
| HA2 |      |       |     |     | I45 | W21<br>I45 | D19<br>W21 |  | Q42   | Q42  | D19<br>K38<br>Q42<br>I45 | D19<br>K38 | K38  |

< 4. 5 Å の最も近い原子間距離を有することによって定められる接触残基(コンタクト残基)。

色の組合せは結合自由エネルギーに対する個々の残基の関与を示す：

非常に好ましい(赤い(V27、T28、I45、D19、W21))、好ましい(オレンジ(S25、S291、M292、I56、V52、N53、T49、H18、V18、G20、T57、T41))、極僅かな影響(青(S30、S31、Q40、H38))、好ましくない(黒)、非常に好ましくない(黒太字)。

<http://structure.pitt.edu/servers/fastcontact><sup>1</sup> のサーバーを使用したエネルギー計算に基づく。

【 0 1 1 6 】

表 4 データ収集及び精製統計値

| H5-F10                     |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>データ収集</b>               |                                                    |
| 細胞パラメーター                   | a=205.3, b=118.5,<br>c=338.9<br>$\beta=99.6^\circ$ |
| 空間群                        | C2                                                 |
| 分解能( $\text{\AA}$ )*       | 3.2(3.28-3.20)                                     |
| 全反射                        | 509705                                             |
| 固有の反射                      | 112570                                             |
| 完全性(%)*                    | 85.0 (68.4)                                        |
| 平均 $I / \sigma(I)$ *       | 9.5 (2.0)                                          |
| $R_{\text{MERGE}}$ (%)*    | 12.8 (81.0)                                        |
| 重複性*                       | 4.5 (4.5)                                          |
| $\sigma$ カットオフ             | -3                                                 |
| <b>精密化</b>                 |                                                    |
| 分解能                        | 50-3.2(3.28-3.20)                                  |
| $R_{\text{WORK}}$ *        | 0.23 (0.32)                                        |
| $R_{\text{FREE}}$ (5%データ)* | 0.29 (0.38)                                        |
| RMS D 結合距離( $\text{\AA}$ ) | 0.01                                               |
| RMS D 結合角( $^\circ$ )      | 1.31                                               |
| 平均B値                       | 75.7                                               |
| 溶媒原子                       | 0                                                  |
| $\sigma$ カットオフ             | なし                                                 |
| <b>ラマチャンドラプロット</b>         |                                                    |
| 好ましい領域(%)の残基               | 90.0                                               |
| 得られた領域(%)の残基               | 9.5                                                |
| 外れ領域(%)の残基                 | 0.5                                                |

\*括弧内の数字は最大の分解能殻に対応する。

表5 16 HA サブタイプの F10 エピトープの配列比較

| グループ  | クラスターサブタイプ | #完全配列 | #異なる配列 | HA1  |                   |                   |                   | HA2                    |                  |                |    |                 |                     |                 |                    |                       |                     |                  |                     |                 |               |   |
|-------|------------|-------|--------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---|
|       |            |       |        | 17   | 18                | 38                | 40                | 291                    | 18               | 19             | 20 | 21              | 38                  | 41              | 42                 | 45                    | 49                  | 52               | 53                  | 56              | 111           |   |
| グループ1 | H1a        | H2    | 100    | 95   | Y                 | H                 | H                 | QLEVK<br>(18)77        | T                | (19)75         | D  | G               | W                   | K               | T                  | Q                     | (F)V1<br>(89)56     | T                | (19)74<br>(1)94     | N               | I             | H |
|       |            | H5    | 1620   | 1178 | (S)TFY<br>(4)1174 | (V)MHR<br>(2)1176 | (Q)YTH<br>(4)1174 | (L)MTRIS<br>(2)1176    | (19)172          | (5)1173        | G  | (R)W<br>(1)1177 | (Q)R.MK<br>(23)1155 | (S)T<br>(3)1175 | PQ<br>(1)1177      | (M)L.TD<br>(8)1170    | (19)177             | V                | N                   | (F)V<br>(1)1177 | H             |   |
|       |            | H1    | 1211   | 701  | Y                 | H                 | H                 | (S)N<br>(18)65         | (13)546          | D              | G  | W               | (K)R.LQ<br>(60)441  | T               | Q                  | (V)1<br>(2)660        | (S)N.XOT<br>(19)662 | (M)JV<br>(2)660  | N                   | (V)1<br>(1)700  | H             |   |
|       |            | H6    | 278    | 230  | Y                 | H                 | H                 | (1)N<br>(1)229         | (1)1             | D              | G  | (R)W<br>(1)229  | (R)JK<br>(102)128   | T               | Q                  | (V)1<br>(78)152       | (1)1                | (19)74<br>(3)227 | N                   | I               | H             |   |
|       |            | H13   | 16     | 16   | Y                 | L                 | S                 | (V)1<br>(8)16          | I                | N              | G  | W               | K                   | T               | Q                  | I                     | T                   | V                | N                   | I               | H             |   |
|       |            | H16   | 8      | 6    | Y                 | L                 | S                 | (1)7<br>(2)6           | I                | N              | G  | W               | K                   | T               | Q                  | I                     | T                   | V                | N                   | I               | H             |   |
|       | H1b        | H11   | 64     | 64   | Y                 | L                 | S                 | (1)18<br>(1)64         | (1)1             | N              | G  | W               | (R)JK<br>(5)60      | T               | Q                  | (V)1<br>(3)61         | (1)168              | V                | N                   | (L)AV<br>(17)47 | H             |   |
|       |            | H8    | 10     | 10   | Y                 | Q                 | Q                 | M                      | S                | I              | D  | G               | W                   | Q               | T                  | Q                     | I                   | T                | (19)74<br>(1)99     | N               | I             | H |
|       |            | H12   | 19     | 18   | Y                 | Q                 | Q                 | E                      | S                | V              | A  | G               | W                   | R               | T                  | Q                     | I                   | Q                | L                   | N               | I             | H |
|       |            | H9    | 252    | 234  | (H)Y<br>(33)201   | (L)Q<br>(1)233    | (D)H<br>(1)233    | (R)EJK<br>(5)229       | (1)1             | (S)A<br>(1)233 | G  | (G)W<br>(1)233  | (K)GHR<br>(14)220   | T               | Q                  | (V)E.MR.VH<br>(43)191 | (1)1                | V                | (S)LD.N<br>(3)231   | (19)179         | (C)H<br>1233  |   |
| H3    | H4         | 105   | 90     | H    | H                 | H                 | (R)Q<br>(1)99     | (A)JS.RPT<br>(19)92    | I                | D              | G  | (G)W<br>(1)91   | L                   | T               | Q                  | I                     | (1)1                | L                | N                   | I               | (A)T<br>(2)60 |   |
|       | H14        | 2     | 2      | H    | H                 | S                 | K                 | D                      | I                | D              | G  | W               | L                   | T               | Q                  | I                     | N                   | L                | N                   | I               | T             |   |
|       | H3         | 2002  | 1228   | H    | H                 | N                 | (N)T<br>(1)1227   | (N)Y.E.G.D<br>(35)1163 | (N)D<br>(1)1213  | G              | W  | (F)H<br>(1)1227 | T                   | Q               | (V)T.LH<br>(5)1223 | (D)S.TA.N<br>(22)1206 | (M)H<br>(1)1227     | (D)N<br>(1)1227  | (V)T.FH<br>(19)1206 | (A)T<br>(7)1221 |               |   |
|       | H15        | 8     | 5      | H    | H                 | N                 | T                 | P                      | I                | D              | G  | W               | Y                   | T               | Q                  | I                     | T                   | L                | N                   | I               | A             |   |
| H7    | H7         | 334   | 273    | H    | H                 | N                 | T                 | (S)R.PIN<br>(13)142    | (N)D<br>(57)213  | G              | W  | (H)Y<br>(1)272  | T                   | (P)Q<br>(2)271  | (V)1<br>(3)270     | T                     | L                   | N                | I                   | (T)A<br>(35)238 |               |   |
|       | H10        | 31    | 28     | H    | H                 | N                 | T                 | (E)K<br>(1)27          | (N)E.D<br>(2)256 | (A)G<br>(1)27  | W  | Y               | T                   | Q               | I                  | T                     | L                   | N                | (V)1<br>(1)27       | A               |               |   |

\* この表は、2008年4月現在の公共インフルエンザ配列データベース (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/FLU/FLU.html>)において利用できる配列を表す。

淡青色のハイライト：上段の( )、(アミノ酸変異(一又は複数))/その位置でのアミノ酸コンセンサス；下段の( )、(アミノ酸変異の数)/コンセンサスアミノ酸の数。強調されていないアミノ酸は100%保存されているか、または、サブタイプH4、H6、H9、H10、H11の位置で5回以下の変異が観察される。pHトリガーにおいて役割を有するヒスチジンH17(HA1)およびH111(HA2)は緑で強調する。

【0118】  
他の実施態様

本明細書中では特定の実施態様を詳細に開示したが、これは例示のみを目的とするものであって、以下に続く添付の特許請求の範囲を限定するものではない。特に、特許請求の範囲によって定められる本発明の精神及び権利範囲を逸脱することなく、本発明に様々な置き換え、変更および修飾がなされうることが発明者が意図するものである。他の態様、

便宜及び修飾は以下の特許請求の範囲内であるとみなされる。示される特許請求の範囲は、本明細書において開示される本発明の代表である。他の特許請求の範囲に記載していない発明もまた包含される。出願人は、後の特許請求の範囲の発明を取得する権利を保有する。

【手続補正 3】


【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図


【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 1 A】



【図 1 B】







【図 4 C】

| ウイルス           | ヒト<br>mAb<br>F10 | マウス<br>mAb<br>21G8.6 | CTRL.<br>80R |
|----------------|------------------|----------------------|--------------|
| H5-TH04 (H5N1) | 40               | 40                   | <            |
| H5-HK97 (H5N1) | 160              | 40                   | <            |
| H1-OH83 (H1N1) | 40               | <                    | <            |
| H1-PR34 (H1N1) | 320              | <                    | <            |
| H2-AA60 (H2N2) | 20               | <                    | <            |


【図 5】




【図 6 A - B】




【図 6 C - D】




【 図 7 A - C 】




【 図 7 G - H 】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】



【図 1 2】



【図 1 3】



## フロントページの続き

| (51) Int.Cl.          |                  | F I                   |              | テーマコード ( 参考 ) |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>A 6 1 K 45/00</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 K 45/00</b>  |              |               |
| <b>A 6 1 K 31/13</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 K 31/13</b>  |              |               |
| <b>A 6 1 K 31/351</b> | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 K 31/351</b> |              |               |
| <b>A 6 1 K 31/215</b> | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 K 31/215</b> |              |               |
| <b>A 6 1 P 43/00</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 P 43/00</b>  | <b>1 2 1</b> |               |
| <b>G 0 1 N 33/53</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>A 6 1 P 43/00</b>  | <b>1 1 1</b> |               |
| <b>G 0 1 N 33/569</b> | <b>(2006.01)</b> | <b>G 0 1 N 33/53</b>  |              | <b>N</b>      |
| <b>C 4 0 B 30/04</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>G 0 1 N 33/569</b> |              | <b>L</b>      |
| <b>C 1 2 P 21/08</b>  | <b>(2006.01)</b> | <b>C 4 0 B 30/04</b>  |              |               |
|                       |                  | <b>C 1 2 P 21/08</b>  |              |               |

(72)発明者 マラスコ, ウェイン, エー.

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 4 8 1, ウェルズリー, ライス ストリート 4 3

(72)発明者 スイ, ジャンボワ

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 1 2 0, ボストン, トレモント ストリート 1 5  
7 5, 2 1 2 号

(72)発明者 リディントン, ロバート, シー.

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 0 3 7, ラ ホーヤ, ノース トリー パインズ ロ  
ード 1 0 9 0 1

【外国語明細書】  
2015180619000001.pdf

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 针对流感病毒的抗体及其使用方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2015180619A</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公开(公告)日 | 2015-10-15 |
| 申请号            | JP2015048216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 申请日     | 2015-03-11 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 达那-法伯癌症研究所<br>伯纳姆医学研究所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | Dana Farber癌症研究所有限公司<br>伯纳姆医学研究所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| [标]发明人         | マラスコウェインエー<br>スイジャンホワ<br>リディントンロバートシー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 发明人            | マラスコ, ウェイン, エー.<br>スイ, ジャンホワ<br>リディントン, ロバート, シー.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| IPC分类号         | C07K16/10 C07K1/22 C12N15/09 A61P31/16 A61K39/395 A61K45/00 A61K31/13 A61K31/351 A61K31/215 A61P43/00 G01N33/53 G01N33/569 C40B30/04 C12P21/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| CPC分类号         | C07K16/1018 A61K2039/505 A61P31/16 C07K14/005 C07K2317/21 C07K2317/52 C07K2317/565 C07K2317/622 C07K2317/76 C07K2317/92 C07K2319/00 C07K2319/40 C12N2760/16122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| FI分类号          | C07K16/10.ZNA C07K1/22 C12N15/00.A A61P31/16 A61K39/395.S A61K45/00 A61K31/13 A61K31/351 A61K31/215 A61P43/00.121 A61P43/00.111 G01N33/53.N G01N33/569.L C40B30/04 C12P21/08 C12N15/13 C12N15/44 C12N15/70.Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| F-TERM分类号      | 4B024/AA01 4B024/AA11 4B024/AA14 4B024/BA51 4B024/CA02 4B024/DA02 4B024/DA06 4B024/EA03 4B024/EA04 4B024/FA10 4B024/GA01 4B024/GA11 4B064/AG27 4B064/CA10 4B064/CA19 4B064/CC15 4B064/CC24 4B064/CE12 4B064/DA01 4B064/DA13 4C084/AA19 4C084/DA39 4C084/MA13 4C084/MA16 4C084/MA31 4C084/MA35 4C084/MA37 4C084/MA52 4C084/MA55 4C084/MA56 4C084/MA57 4C084/MA59 4C084/MA60 4C084/MA63 4C084/MA66 4C084/NA05 4C084/NA14 4C084/ZB331 4C084/ZB332 4C084/ZC201 4C084/ZC202 4C084/ZC751 4C084/ZC752 4C085/AA14 4C085/AA19 4C085/BB31 4C085/BB44 4C085/CC02 4C085/CC23 4C085/DD62 4C085/EE01 4C085/EE03 4C085/GG01 4C085/GG02 4C085/GG04 4C085/GG05 4C085/GG08 4C085/GG10 4C086/AA01 4C086/AA02 4C086/BA07 4C086/MA02 4C086/MA04 4C086/MA07 4C086/MA10 4C086/NA05 4C086/NA14 4C086/ZB33 4C086/ZC20 4C086/ZC75 4C206/AA01 4C206/AA02 4C206/FA01 4C206/FA29 4C206/GA02 4C206/GA30 4C206/KA01 4C206/KA09 4C206/MA02 4C206/MA04 4C206/MA11 4C206/MA13 4C206/NA05 4C206/NA14 4C206/ZB33 4C206/ZC20 4C206/ZC75 4H045/AA11 4H045/AA20 4H045/AA30 4H045/DA76 4H045/EA20 4H045/EA50 4H045/FA74 4H045/GA26 |         |            |
| 优先权            | 61/005725 2007-12-06 US<br>61/091599 2008-08-25 US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |

#### 摘要(译)

本发明提供了中和流感病毒的人scFv抗体和单克隆抗体。还提供了治疗和/或预防流感相关疾病或病症如禽流感的方法。本发明还提供了针对流感疫苗接种患者的方法。还提供了诊断流感相关疾病或病症的方法和检测样品中流感病毒存在的方法。

|              |                              |          |                      |
|--------------|------------------------------|----------|----------------------|
| (21) 出願番号    | 特願2015-48216 (P2015-48216)   | (71) 出願人 | 399052796            |
| (22) 出願日     | 平成27年3月11日 (2015. 3. 11)     |          | ダイナ ファーバー キャンサー インス  |
| (62) 分割の表示   | 特願2010-537143 (P2010-537143) |          | ティチュート, インコーポレイテッド   |
|              | の分割                          |          | アメリカ合衆国 マサチューセッツ 02  |
| 原出願日         | 平成20年12月8日 (2008. 12. 8)     |          | 215, ボストン, ブルックライン ア |
| (31) 優先権主張番号 | 61/005, 725                  |          | ベニュー 450             |
| (32) 優先日     | 平成19年12月6日 (2007. 12. 6)     | (71) 出願人 | 508236848            |
| (33) 優先権主張国  | 米国 (US)                      |          | バーナム インスティテュート フォー   |
| (31) 優先権主張番号 | 61/091, 599                  |          | メディカル リサーチ           |
| (32) 優先日     | 平成20年8月25日 (2008. 8. 25)     |          | アメリカ合衆国 カリフォルニア 920  |
| (33) 優先権主張国  | 米国 (US)                      |          | 37, ラ ホーヤ, ノース トリー   |
|              |                              |          | バインズ ロード 10901       |
|              |                              | (74) 代理人 | 110002077            |
|              |                              |          | 園田・小林特許業務法人          |
|              |                              |          | 最終頁に続く               |