

(19) 日本国特許庁 (JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02019/004168

発行日 令和2年4月23日 (2020.4.23)

(43) 国際公開日 平成31年1月3日 (2019.1.3)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 33/53 (2006.01)	GO 1 N 33/53 D	4 H 0 4 5
GO 1 N 33/544 (2006.01)	GO 1 N 33/544 Z	
CO 7 K 14/46 (2006.01)	CO 7 K 14/46 Z N A	
CO 7 K 16/18 (2006.01)	CO 7 K 16/18	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 22 頁)


出願番号	特願2019-526913 (P2019-526913)	(71) 出願人	000120456
(21) 国際出願番号	PCT/JP2018/024114		栄研化学株式会社
(22) 国際出願日	平成30年6月26日 (2018.6.26)		東京都台東区台東4丁目19番9号
(31) 優先権主張番号	特願2017-124578 (P2017-124578)	(74) 代理人	110002572
(32) 優先日	平成29年6月26日 (2017.6.26)		特許業務法人平木国際特許事務所
(33) 優先権主張国・地域又は機関	日本国 (JP)	(72) 発明者	旭 由香里
			栃木県下都賀郡野木町野木143 栄研化学株式会社 野木事業所内
		(72) 発明者	和田 厚文
			栃木県下都賀郡野木町野木143 栄研化学株式会社 野木事業所内
		Fターム (参考)	4H045 AA10 AA11 AA30 BA10 CA40 DA86 EA50 FA74

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 各種動物の血清アミロイドAの測定方法及びその測定試薬

(57) 【要約】

本発明は、様々な動物種由来の血清アミロイドAを測定可能な試薬を提供することを目的とし、具体的には、動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含む、複数の動物種の血清アミロイドA測定試薬に関する。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含む複数の動物種の血清アミロイドA測定試薬を使用して、血清アミロイドAを測定する工程を含む、血清アミロイドAの免疫学的測定方法。

【請求項 2】

動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメントが、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとして血清アミロイドAに結合する、請求項 1 記載の方法。

10

【請求項 3】

前記エピトープが、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から80～90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、請求項 2 記載の方法。

【請求項 4】

複数の動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、請求項 1～3 のいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 5】

免疫学的測定方法がラテックス免疫凝集法である、請求項 1～4 のいずれか 1 項記載の方法。

20

【請求項 6】

動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含む、複数の動物種の血清アミロイドA測定試薬。

【請求項 7】

動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメントが、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとして血清アミロイドAに結合する、請求項 6 記載の測定試薬。

30

【請求項 8】

前記エピトープが、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から80～90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、請求項 7 記載の測定試薬。

【請求項 9】

複数の動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、請求項 6～8 のいずれか 1 項記載の測定試薬。

【請求項 10】

配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとして血清アミロイドAに結合する、動物種交差性抗血清アミロイドAモノクローナル抗体又はそのフラグメント。

40

【請求項 11】

前記エピトープが、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒト血清アミロイドA1タンパク質におけるN末端から80～90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型血清アミロイドAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、請求項 10 記載の抗体又はそのフラグメント。

【請求項 12】

50

動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、請求項 10 又は 11 記載の抗体又はそのフラグメント。

【請求項 13】

請求項 10 ~ 12 のいずれか 1 項記載の抗体又はそのフラグメントを含む動物血清アミロイドA測定用試薬。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、各種動物の血清アミロイドA(以下、「SAA」と称する)の測定方法及びその測定試薬に関する。

【背景技術】

【0002】

SAAは、アミロイドーシスにおいて組織に沈着するアミロイドタンパク質Aの前駆体タンパク質であり、分子量約12000の血清タンパク質である(非特許文献1)。このSAAの血清値はアミロイドーシス以外の炎症性疾患で上昇することが明らかにされており、鋭敏な炎症マーカーとして評価されている(非特許文献2)。

【0003】

また、SAAは、ヒト以外の動物種においても重要な炎症マーカーであることが知られている(非特許文献3~7)。

【0004】

例えば、特許文献1は、泌乳哺乳類(ウシ等)の乳房から得られた乳汁のサンプルにおけるSAAタンパク質の量が、乳房組織の炎症応答(乳腺炎)レベルと明確に相互関係にあることを開示する。特許文献2は、異常な症状又は行動を示す哺乳動物(ウマ等)の血液サンプルにおけるSAA濃度に基づいて、感染症と非感染性病因とを区別できることを開示する。

【0005】

ところで、例えば特許文献3は、ヒトSAAと特異的に結合するモノクローナル抗体を記載し、また、特許文献4は、ウマSAAと特異的に結合するモノクローナル抗体を記載する。しかしながら、従来において、モノクローナル抗体を使用したヒトを含む様々な動物種由来のSAAを測定できる試薬は知られていなかった。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特表2003-507725号公報

【特許文献2】国際公開第2014/118764号

【特許文献3】特開平9-67398号公報

【特許文献4】特開2008-239511号公報

【非特許文献】

【0007】

【非特許文献1】Husby G.及びNatvig J.B., J. Clin. Invest., 1974年, Vol. 53, pp. 1054-1061

【非特許文献2】山田俊幸ら, 臨床検査, 1988年, 32:2, pp. 167-172

【非特許文献3】Nunokawa Y.ら, J. Vet. Med. Sci., 1993年, 55(6), pp. 1011-1016

【非特許文献4】Kajikawa T.ら, J. Vet. Med. Sci., 1996年, 58(11), pp. 1141-1143

【非特許文献5】Tamamoto T.ら, J. Vet. Med. Sci., 2008年, 70(11), pp. 1247-1252

【非特許文献6】Petersen H.H.ら, Vet. Res., 2004年, 35(2), pp. 163-187

【非特許文献7】玉本隆司, 北獣会誌, 2014年, 58, pp. 539-543

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

10

20

30

40

50

上述の実情に鑑み、本発明は、様々な動物種由来のSAAを測定可能な試薬を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究を行った結果、抗ヒトSAAモノクローナル抗体の中に様々な動物種由来のSAAを認識する動物種交差性モノクローナル抗体を見出し、本発明を完成するに至った。

【0010】

すなわち、本発明は、以下を包含する。

(1) 動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含む複数の動物種のSAA測定試薬を使用して、SAAを測定する工程を含む、SAAの免疫学的測定方法。

10

(2) 動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメントが、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合する、(1)記載の方法。

(3) 前記エピトープが、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から80~90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、(2)記載の方法。

(4) 複数の動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、(1)~(3)のいずれか1記載の方法。

20

(5) 免疫学的測定方法がラテックス免疫凝集法である、(1)~(4)のいずれか1記載の方法。

(6) 動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含む、複数の動物種のSAA測定試薬。

(7) 動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメントが、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合する、(6)記載の測定試薬。

(8) 前記エピトープが、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から80~90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、(7)記載の測定試薬。

30

(9) 複数の動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、(6)~(8)のいずれか1記載の測定試薬。

(10) 配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合する、動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメント。

(11) 前記エピトープが、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から80~90番目のアミノ酸残基又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基である、(10)記載の抗体又はそのフラグメント。

40

(12) 動物種がヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミから成る群より選択される複数の動物種である、(10)又は(11)記載の抗体又はそのフラグメント。

(13) (10)~(12)のいずれか1記載の抗体又はそのフラグメントを含む動物SAA測定用試薬。

【0011】

本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2017-124578号の開示内容を包含する。

50

【発明の効果】

【0012】

本発明に係るSAA測定試薬によれば、様々な動物種において炎症マーカーであるSAAを容易に検出又は測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】粒径130nmのポリスチレンラテックスに抗ヒトSAAポリクローナル抗体を固定化したラテックス試薬で、ウシ検体を測定した結果を示す図である。

【図2】ウシ検体による抗ヒトSAAモノクローナル抗体のスクリーニング結果を示す図である。

【図3】粒径130nmのポリスチレンラテックスに、ウシSAAとの反応が確認されたモノクローナル抗体(Clone15)を固定化したラテックス試薬で、ヒトSAA濃度既知血清検体の希釈系列を測定した結果を示す図である。

【図4】配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合する動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体(Clone15)を、粒径220nmと粒径80nmの2種類のポリスチレンラテックスに固定化し、これらを2:1に混和したラテックス試薬(SAA-M)で、ヒトSAA濃度既知血清検体の希釈系列を測定した結果(検量線)を示す図である。

【図5】動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体(Clone15)を、粒径220nmと粒径80nmの2種類のラテックスに固定化し、これらを2:1に混和したラテックス試薬(SAA-M)で、ウシ、イヌ、ネコ血清検体を測定した結果を示す図である。

【図6】動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体(Clone15)を粒径215nmのポリスチレンラテックスに固定化したラテックス試薬で、各種動物(ウシ、ウマ、サル、ロバ、ヒツジ、ブタ、カピバラ、ネズミ及びウサギ)の血清におけるSAAを測定した結果を示す。

【図7】各種動物(ヒト、ネコ、イヌ、ウマ、ウシ、サル、カピバラ、ネズミ)の血清検体による抗ヒトSAAモノクローナル抗体(Clone15、18及び21)の反応性を確認した結果を示す。

【図8】抗ヒトSAAモノクローナル抗体(Clone15、18及び21)のエピトープマッピングのためのアレイマップを示す。

【図9】抗ヒトSAAモノクローナル抗体(Clone15、18及び21)の成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドに対する反応性を確認した結果を示す。

【図10】抗ヒトSAAモノクローナル抗体(Clone15、18及び21)の成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドに対する反応性を確認した結果を示す。(A): エピトープマッピングのためのアレイにおける蛍光イメージを示す。(B): エピトープマッピングのためのアレイマップを示す。(C): 成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドのアミノ酸配列比較を示す。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る複数の(すなわち、2以上の)動物種のSAA測定試薬(以下、「本発明に係るSAA測定試薬」と称する)は、動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメントを含むものである。ここで、本発明において使用する動物種交差性抗SAAモノクローナル抗体又はそのフラグメント(以下、「本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメント」と称する)は、様々な動物種に由来するSAAを認識して当該タンパク質に結合することができるモノクローナル抗体又はそのフラグメントである。本発明に係るSAA測定方法及びそのSAA測定試薬によれば、様々な動物種において炎症マーカーであるSAAを免疫学的に測定することができる。

【0015】

本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントが認識することができるSAAと

しては、例えばヒト、ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ、ロバ及びネズミ等の動物種由来のSAAが挙げられる。

【0016】

また、本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントは、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近(例えば、N末端から76~94番目のアミノ酸残基、特にN末端から80~90番目のアミノ酸残基)又は他の成熟型SAAタンパク質におけるその対応するアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するものが好ましい。当該エピトープに結合する本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントは、複数の動物種のSAAに対して高い結合性を示す。本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントがエピトープとして結合する配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近に対応する他の成熟型SAAタンパク質(例えば、ヒト以外の動物種由来の成熟型SAAタンパク質)におけるアミノ酸残基は、例えば従来公知の方法により成熟型ヒトSAA1タンパク質のアミノ酸配列と他の成熟型SAAタンパク質のアミノ酸配列とのアライメントによる比較により決定することができる。

10

【0017】

本発明に係るモノクローナル抗体は、いずれの免疫グロブリン(Ig)クラス(IgA、IgG、IgE、IgD、IgM、IgY等)及びサブクラス(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2等)のものであってもよい。また、免疫グロブリンの軽鎖は、 κ 鎖又は λ 鎖のいずれであってもよい。

【0018】

また、本発明に係るモノクローナル抗体フラグメントは、例えば、Fab、Fab'、F(ab')₂、Fv、Fd、Fab_{ab}等を含む。このようなフラグメントの作製方法は当技術分野で公知であり、例えばパパイン、ペプシン等のプロテアーゼによる抗体分子の消化、又は公知の遺伝子工学的手法により得ることができる。

20

【0019】

本発明に係るモノクローナル抗体は、抗原(ヒトSAA)を免疫した非ヒト哺乳動物から得た抗体産生細胞(例えば脾臓細胞、リンパ系細胞等)とミエローマ細胞から融合法によってハイブリドーマを作製し、得られたハイブリドーマをヒポキサンチン、アミノプテリン及びチミジンを含む選択培地(「HAT培地」)を用いて増殖し、免疫に用いた抗原(ヒトSAA)又はそれらの断片ペプチド抗原(例えば、配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近を含むペプチド抗原)に対して特異的親和性を示すモノクローナル抗体を産生する細胞をクローニングして、抗ヒトSAAモノクローナル抗体産生細胞株を得、この抗ヒトモノクローナル抗体産生細胞をマウスの腹腔内で増殖させて得られた腹水より抗体を精製することにより得ることができる。非ヒト哺乳動物の例は、マウス、ラット等のげっ歯類である。また、ミエローマ細胞としては、免疫感作した動物と同じ動物由来の細胞が好ましく使用され、例えばマウスミエローマ細胞、ラットミエローマ細胞等が挙げられる。抗体産生細胞とミエローマ細胞の融合は、ポリエチレングリコール(PEG)を使用するか、或いは電気的融合法を用いて行うことができる。

30

【0020】

作製されたモノクローナル抗体は、当技術分野において公知の方法、例えばプロテインA又はプロテインGカラムによるクロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、硫酸塩析法、ゲル濾過、アフィニティクロマトグラフィー等を適宜組み合わせることにより精製することができる。

40

【0021】

また、本発明は、本発明に係るSAA測定試薬を使用して、SAAを測定する工程を含む、SAAの免疫学的測定方法に関する。具体的には、様々な動物種由来の生物学的サンプル中のSAAと本発明に係るSAA測定試薬における本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントとを接触させ、抗原抗体反応を生じさせ、形成した免疫複合体に基づいて当該サンプル中のSAAを検出又は測定する。

50

【 0 0 2 2 】

ここで、生物学的サンプルとしては、SAAを含有するか又は含有する可能性がある生物学的サンプルであればよく、例えば全血、血清、血漿、尿、穿刺液、汗、唾液、リンパ液、髄液等が挙げられる。

【 0 0 2 3 】

また、免疫学的測定法としては、例えば、寒天平板内で本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントと生物学的サンプル中のSAAの結合による免疫複合体による沈降線の発現を確認する一元放射状免疫拡散法、酵素や放射性元素で標識した本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを用いる酵素免疫測定法(EIA)や放射免疫測定法、その他、本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化した不溶性担体を用いる方法等が挙げられる。不溶性担体としては、例えば、ポリエチレンやポリスチレン等のラテックス粒子、アルミナ粒子、シリカ粒子、金コロイド、磁性粒子等の粒子が挙げられる。これらの不溶性担体の中ではラテックス粒子、特にポリスチレンラテックス粒子が好適に用いられる。

10

【 0 0 2 4 】

また、不溶性担体粒子の粒子径としては、50～500nmが好ましく、75～350nmがさらに好ましい。

【 0 0 2 5 】

さらに、不溶性担体に固定化する方法としては、公知の技術である、抗体またはそのフラグメントと不溶性担体を混合して、不溶性担体の表面への抗体またはそのフラグメントの物理吸着を行うことにより不溶性担体への抗体またはそのフラグメントの固定化が可能である。

20

【 0 0 2 6 】

また、表面にアミノ基やカルボキシル基を導入した不溶性担体を用いる場合には、グルタルアルデヒドやカルボジイミド試薬を用いた化学結合によって、不溶性担体の表面への抗体またはそのフラグメントの固定化が可能である。

【 0 0 2 7 】

不溶性担体を用いる方法としては、例えば、ラテックスに本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化したラテックス粒子を用いるラテックス免疫凝集法、金コロイドに本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化した金コロイド粒子を用いる金コロイド凝集比色法、ニトロセルロース膜等のメンブレンにおいて、金属コロイド等で標識した本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメント及び当該本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントとSAAとの免疫複合体を捕捉する捕捉抗体を用いるイムノクロマト法等が挙げられる。具体的に、ラテックス免疫凝集法では、ラテックスに本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化したラテックス粒子と生物学的サンプル中のSAAとを反応させ、免疫複合体の形成によりラテックス粒子が凝集し、当該ラテックスの凝集による濁度の変化に基づいて、SAAを測定する。また、イムノクロマト法では、ニトロセルロース膜等のメンブレンにおいて、生物学的サンプルを供給し、当該生物学的サンプル中のSAAは金属コロイド等で標識した本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを保持する標識試薬保持部で本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントと反応して免疫複合体を形成し、さらに免疫複合体が毛細管現象によってメンブレン中を移動し、メンブレンの所定の位置に固定された捕捉抗体により当該免疫複合体が捕捉され、当該捕捉による呈色に基づいてSAAを検出する。

30

40

【 0 0 2 8 】

このように、本発明に係るSAA測定試薬は、SAAの免疫学的測定方法に使用するものであり、例えば、免疫学的測定法が不溶性担体を用いる方法である場合には、本発明に係るSAA測定試薬は、本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化した不溶性担体、例えばラテックスを含むラテックス溶液を含むことができる。免疫学的測定法がイムノクロマト法である場合には、本発明に係るSAA測定試薬は、本発明に係るモノク

50

ーナル抗体又はそのフラグメントを固定化した不溶性担体、例えば金コロイド、および本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを固定化したニトロセルロース膜等のメンブレンを含むイムノクロマトグラフデバイス(例えば、試料供給部と、金属コロイド等で標識した本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメントを保持する標識試薬保持部と、所定の位置に固定された捕捉抗体を含む検出部とを有する、支持体に担持されたニトロセルロース膜等のメンブレン)に使用することができる。

【0029】

また、本発明に係るSAA測定試薬は、本発明に係るモノクローナル抗体又はそのフラグメント以外に、免疫反応に必要なpHを与える緩衝剤、免疫反応を促進する反応増強剤、非特異的反応を抑制する反応安定剤やブロッカー、試薬の保存性を高めるアジ化ナトリウム等の防腐剤等を含むことができる。

10

【0030】

緩衝剤としては、例えば次のようなものが挙げられる。

GOOD緩衝剤：

2-モルホリノエタンスルホン酸(2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid；「MES」と省略される)；

ピペラジン-ビス(2-エタンスルホン酸)(Piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid)；「PIPES」と省略される)；

(2-アセトアミド)-2-アミノエタンスルホン酸(N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid；「ACES」と省略される)；

20

ビス(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸(N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid；「BES」と省略される)；

ビス(2-ヒドロキシエチル)イミノトリス(ヒドロキシメチル)メタン(Bis(2-hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane；「Bis-Tris」と省略される)；

3-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸(3-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid；「DIPSO」と省略される)；

2-ヒドロキシエチルピペラジン-3-プロパンスルホン酸(N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-3-propanesulfonic acid；「EPPS」と省略される)；

ヒドロキシエチルピペラジン-2-エタンスルホン酸(N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid；「HEPES」と省略される)；

30

2-ヒドロキシエチルピペラジン-2-ヒドロキシプロパン-3-スルホン酸(N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-hydroxypropane-3-sulfonic acid；「HEPPSO」と省略される)；

3-(モルホリノ)プロパンスルホン酸(3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid；「MOPS」と省略される)；

3-(モルホリノ)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸(3-(N-Morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid；「MOPSO」と省略される)；

ピペラジン-ビス(2-ヒドロキシプロパンスルホン酸)(Piperazine-N,N'-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)；「POPSO」と省略される)；

トリス(ヒドロキシメチル)メチル-3-アミノプロパンスルホン酸(N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid；「TAPS」と省略される)；

40

トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-ヒドロキシ-3-アミノプロパンスルホン酸(N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-hydroxy-3-aminopropanesulfonic acid；「TAPSO」と省略される)；

トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノメタンスルホン酸(N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid；「TES」と省略される)。

その他の緩衝剤：

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol)(トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン(Tris(hydroxymethyl)aminomethane)とも呼ばれる)；

リン酸緩衝液；

50

アンモニウム緩衝液。

【0031】

これらの緩衝剤の中でも、HEPESやPIPES等のGOOD緩衝剤は、免疫反応に有利なpHを与えるのみならず、タンパク質への影響が小さいので特に好ましい緩衝剤として挙げられる。免疫反応に必要なpHとしては、pH5～11であればよく、好ましくはpH6～9である。

【0032】

また、反応増強剤としては、ポリエチレングリコールやデキストラン硫酸等が知られている。更に反応安定剤やブロッカーとして、BSA(ウシ血清アルブミン)、動物血清、IgG、IgG断片(FabやFc)、アルブミン、乳タンパク質、アミノ酸、ポリアミノ酸、コリン、ショ糖等の多糖類、ゼラチン、ゼラチン分解物、カゼイン、グリセリン等の多価アルコール等

10

【0033】

これらの各種成分を含む本発明に係るSAA測定試薬は、溶液状態で、又は乾燥状態で供給することができる。溶液状態で流通させるには、タンパク質の安定性を高めることを目的として、更に各種界面活性剤、糖、不活性タンパク質等を加えても良い。これらの安定化剤は、試薬を乾燥するときにも安定剤として、又は賦形剤として有効である。

【実施例】

【0034】

以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明の技術的範囲はこれら実施例に限定されるものではない。

20

【0035】

以下の比較例及び実施例において使用する各モノクローナル抗体の成熟型ヒトSAA1タンパク質(配列番号1に示すアミノ酸配列)に対するエピトープは、以下の通りである：

Clone17：N末端から30番目のアミノ酸残基付近；

Clone14：N末端から15番目のアミノ酸残基付近；

Clone15,18：N末端から90番目のアミノ酸残基付近；

Clone21,25：不明。ただし、ウシSAAとの反応からClone21はClone15等と同様であると推察される。

【0036】

〔比較例1〕抗ヒトSAAポリクローナル抗体を固定化したラテックス試薬によるウシ検体の測定

30

1．目的

抗ヒトSAAポリクローナル抗体をポリスチレンラテックスに固定化したラテックス試薬で、ウシSAAが測定できるかを確認した。

(1) 抗ヒトSAAポリクローナル抗体のポリスチレンラテックス粒子への固定化

抗ヒトSAAポリクローナル抗体を粒径130nmのポリスチレンラテックスに固定化した。

上記ポリスチレンラテックス粒子への固定化は、公知の方法により行った。すなわち、抗ヒトSAAポリクローナル抗体とポリスチレンラテックスとを混合して、ポリスチレンラテックスの表面に抗ヒトSAAポリクローナル抗体を物理的に吸着することにより固定化を行った。

40

【0037】

2．材料・方法

手術前及び手術後に経時的に採血したウシ血漿検体を、上記ラテックス試薬を用いて、日立7170S形自動分析装置(株式会社日立ハイテクノロジーズ社製)にて測定した。測定方法は、血漿検体2.0μLに第1試薬(50mM HEPES緩衝液pH7.4)100μLを混和し37℃で5分間インキュベーションした後、この混合液に第2試薬(10mM HEPES緩衝液 pH7.4を含む、ポリクローナル抗体固定化ラテックス溶液)100μLを混合し37℃で反応させ、第2試薬混合後約5分間の波長800/570nm(副波長/主波長)の二波長での吸光度変化を測定した。

血漿検体中のSAA濃度は、SAA濃度既知の試料を測定して得られた検量線から算出した。

【0038】

50

3. 結果

手術前及び手術後に経時的に採血したウシ血漿検体のSAA値は、0.62～1.72mg/Lとポリクローナル抗体で作製したSAA試薬の測定範囲(5～500mg/L)以下であった(図1)。

【0039】

4. 結論

抗ヒトSAAポリクローナル抗体で作製したSAA試薬はウシSAAとの反応性が低く、ウシSAAの測定はできなかった。実施例1に示すようにポリクローナル抗体を用いたEIAではウシSAAが測定できたが、ラテックス凝集法では測定はできなかった。

【0040】

〔実施例1〕ウシ検体によるモノクローナル抗体のスクリーニング

10

1. 目的

ウシSAAと反応するモノクローナル抗体のスクリーニングを行った。

【0041】

2. 材料・方法

手術前後のウシ血漿検体をマイクロプレートに固相化(抗原の固相化)し、抗ヒトSAAポリクローナル抗体及び抗ヒトSAAモノクローナル抗体(特許文献3の表1に示すClone14、15、17、18、21、25)を反応させた後、POD標識抗ウサギIgG抗体又はPOD標識抗ラットIgG抗体を反応させるEIA法にて反応性を確認した。

【0042】

3. 結果

20

術後2日目のウシ血漿検体との反応性において、Clone18、Clone21、Clone15、ポリクローナル抗体の順で高く、他のCloneにおいては術前後での反応性に違いが認められなかった(図2)。

【0043】

4. 結論

抗ヒトSAAポリクローナル抗体は、反応が弱いもののウシ血漿と反応するが、モノクローナル抗体(Clone17、Clone25)は急性期のウシ血漿検体とは反応しないことが認められた。スクリーニングに用いたモノクローナル抗体のうち、急性期のウシ血漿検体と反応するモノクローナル抗体3クローン(Clone18、Clone21、Clone15)が確認された。

【0044】

30

〔実施例2〕動物SAA測定用試薬(「SAA-M」)の作製検討と検体測定

1. 目的

動物SAA測定用のラテックス試薬の検討を行った。

【0045】

2. 材料・方法

抗ヒトSAAモノクローナル抗体(Clone15)及びポリスチレンラテックス(粒径130nm又は粒径220nmと粒径80nm)を用いてラテックス試薬を作製し、SAA濃度が既知である血清検体の希釈系列、及びウシ、イヌ、ネコ血清検体を測定した。比較例として、市販のLZテスト(栄研'SAA(栄研化学株式会社製)での測定も行った。

【0046】

40

上記ポリスチレンラテックス粒子への固定化は、公知の方法により行った。すなわち、抗ヒトSAAモノクローナル抗体とポリスチレンラテックスとを混合して、ポリスチレンラテックスの表面に抗ヒトSAAモノクローナル抗体を物理的に吸着することにより固定化を行った。

【0047】

上記、SAA濃度が既知である血清検体(ヒトSAA)の希釈系列及びウシ、イヌ、ネコ血清検体の測定は、日立7170S形自動分析装置(株式会社日立ハイテクノロジーズ社製)にて測定した。測定方法は、血清検体2.0μLに第1試薬(50mM HEPES緩衝液pH7.4)100μLを混和し37℃で5分間インキュベーションした後、この混合液に第2試薬(10mM HEPES緩衝液 pH7.4を含む、モノクローナル抗体固定化ラテックス溶液)100μLを混合し37℃で反応させ、第2試

50

薬混合後約5分間の波長800/570nm(副波長/主波長)の二波長での吸光度変化を測定した。

【0048】

ウシ、イヌ、ネコ血清検体中のSAA濃度は、SAA濃度既知の試料を測定して得られた検量線から算出した。

【0049】

3. 結果

3-1. モノクローナル抗体による試薬化

粒径130nmのポリスチレンラテックスにモノクローナル抗体(Clone15)を固定化したSAA試薬にて、SAA濃度が既知である血清検体(ヒトSAA)の希釈系列を測定した結果を図3に示す。Clone15を固定化したSAA試薬では、希釈系列による吸光度変化量(Δ Abs)の変動が認められ、検量線を作成することができた。

10

【0050】

Clone15のモノクローナル抗体を粒径220nmと粒径80nmの2種類のラテックスに固定化して、これらを2:1に混和したラテックス試薬(SAA-M)を作製し、SAA濃度が既知である血清検体の希釈系列を測定した結果(検量線)を図4に示す。

【0051】

3-2. 動物検体の測定

ウシ、イヌ、ネコ血清検体を測定した結果を図5に示す。また、Clone15のモノクローナル抗体を粒径220nmと粒径80nmの2種類のラテックスに固定化して作製したラテックス試薬(SAA-M)では、ウシ、イヌ、ネコのSAAを測定できた。これに対し、LZテスト‘栄研’SAA(LZ-SAA)でのウシ及びイヌ血清はいずれの血清検体においてもLZテスト‘栄研’SAAの測定範囲以下であり、LZテスト‘栄研’SAAではウシ及びイヌSAAは測定できなかった。またイヌ検体では市販のイヌ用CRP測定試薬を用いた値よりも変動が大きく、ネコ検体においてもLZテスト‘栄研’SAAで測定した結果に比べて大きな変動を示した。

20

【0052】

4. 結論

配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するモノクローナル抗体(Clone15)を用いることで、ウシ、イヌ、ネコと反応するSAAラテックス試薬を作製することが可能である。

30

【0053】

〔実施例3〕各種動物の検体におけるSAAの測定

1. 目的

配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するモノクローナル抗体(Clone15)で各種動物のSAAが測定できるかを確認した。

【0054】

2. 材料・方法

各種動物の検体中のSAAを、Clone15のモノクローナル抗体を担持したラテックス試薬(動物SAA試薬)を用いて測定した。

40

【0055】

また、比較例として、実施例2に記載のLZテスト‘栄研’SAA(LZ-SAA)を用いて、同様に測定を行った。LZテスト‘栄研’SAA(LZ-SAA)での反応が認められない動物種(ウサギ)については、参考としてSAAと同様に炎症性疾患で上昇するCRPの測定を行った。

【0056】

上記動物SAA試薬は、粒径215nmのポリスチレンラテックスを使用した以外は実施例2と同様に調製した。

【0057】

各種動物の検体中のSAA測定は、日立7170S形自動分析装置(株式会社日立ハイテクノロジーズ社製)にて測定した。測定方法は、各種検体3.0 μ Lに第1試薬(50mM HEPES緩衝液 pH

50

7.4)100 μ Lを混和し37℃で5分間インキュベーションした後、この混合液に第2試薬(10mM HEPES緩衝液pH7.4を含む、モノクローナル抗体固定化ラテックス溶液)100 μ Lを混合し37℃で反応させ、第2試薬混合後約5分間の波長600nmでの吸光度変化を測定した。

【0058】

各種動物の検体中のSAA濃度は、SAA濃度既知の試料を測定して得られた検量線から算出した。

【0059】

3. 結果

測定結果を図6に示す。

比較例(LZテスト「栄研」SAA)では測定できない(測定感度以下)のに対し、動物SAA試薬(配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するClone15のモノクローナル抗体：「本発明に係るSAA測定試薬」に相当)を使用することで、各種動物(ウシ、ウマ、サル、ロバ、ヒツジ、ブタ、ネズミ、ウサギ)の検体におけるSAAを測定することができた。

【0060】

4. 結論

動物SAA試薬(Clone15のモノクローナル抗体)を使用することで、各種動物の検体におけるSAAを測定することが可能である。

【0061】

〔実施例4〕各種クローンから得られた抗体を使用したSAA試薬の評価

1. 目的

配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するClone18及びClone21から得られたモノクローナル抗体が、Clone15のモノクローナル抗体と同様に、各種動物の検体におけるSAAを測定できるかを確認した。

【0062】

2. 材料・方法

各種動物血清(ヒト、ネコ、イヌ、ウマ、ウシ、サル、カピバラ、ネズミ)をマイクロプレートに固相化(抗原の固相化)し、Clone15、Clone18及びClone21から得られた抗SAAモノクローナル抗体を反応させた後、POD標識抗ラットIgG抗体を反応させるEIA法にて反応性を確認した。

【0063】

3. 結果

測定結果を、図7に示す。図7の表における「○」、「×」は、反応の有無(有：○、無：×)を示す。また、図7の表における「盲検補正值」については、バラつきも加味し、盲検補正值が0.020以上である場合に反応(+)と判断する。

【0064】

「本発明に係る配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するClone18のモノクローナル抗体」及び「本発明に係る配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するClone21のモノクローナル抗体」は、「本発明に係る配列番号1に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質におけるN末端から90番目のアミノ酸残基付近をエピトープとしてSAAに結合するClone15のモノクローナル抗体」と同様に各種動物の検体におけるSAAを測定できた。さらに、図7のグラフに示すように、Clone18のClone15に対する相関係数は0.982であり、Clone21のClone15に対する相関係数は0.975であった。

【0065】

4. 結論

Clone18のモノクローナル抗体とClone21のモノクローナル抗体は、Clone15のモノクローナル抗体と同等の性能を示していると示唆された。

【 0 0 6 6 】

〔実施例 5〕 各種クローンから得られた抗体のエピトープマッピング

1. 目的

Clone15、Clone18及びClone21から得られたモノクローナル抗体が、配列番号 1 に示すアミノ酸配列から成る成熟型ヒトSAA1タンパク質に、いずれのアミノ酸配列をエピトープとして結合するのかを確認した。

【 0 0 6 7 】

2. 材料・方法

表 1 及び図 8 に示すように、成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドをスライドガラスに固相化(抗原の固相化)することでアレイを作製した。

10

【 0 0 6 8 】

次いで、Clone15、Clone18及びClone21から得られた抗SAAモノクローナル抗体をアレイ上の各ペプチドと反応させた後、ビオチン標識ヤギ抗ラットIgG抗体を反応させた。その後、蛍光標識ストレプトアビジンをアレイと反応させ、各ペプチドに対する抗SAAモノクローナル抗体の反応性を確認した。

【 0 0 6 9 】

【表 1】

No.	Sequence	SEQ ID NO:1 における位置	SEQ ID NO:
Peptide #1	HGAEDSLADQAANEWGRSGKDPNHF	71~95	2
Peptide #2	HGAEDSLADQAANEW	71~85	3
Peptide #3	GAEDSLADQAANEWG	72~86	4
Peptide #4	AEDSLADQAANEWGR	73~87	5
Peptide #5	EDSLADQAANEWGRS	74~88	6
Peptide #6	DSLADQAANEWGRSG	75~89	7
Peptide #7	SLADQAANEWGRSGK	76~90	8
Peptide #8	LADQAANEWGRSGKD	77~91	9
Peptide #9	ADQAANEWGRSGKDP	78~92	10
Peptide #10	DQAANEWGRSGKDPN	79~93	11
Peptide #11	QAANEWGRSGKDPNH	80~94	12
Peptide #12	AANEWGRSGKDPNHF	81~95	13

20

30

Positive Controls

Biotin-BSA

Rat IgG (Raybiotech)

Negative Controls

0.1% BSA-PBS

40

【 0 0 7 0 】

なお、表 1 及び図 8 における陽性対照は、以下の通りである：

Biotin-BSA：成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドに代えて、ビオチン標識BSAをスライドガラスに固相化したもの；

Rat IgG(Raybiotech)：成熟型ヒトSAA1タンパク質由来の各ペプチドに代えて、ビオチン標識ヤギ抗ラットIgG抗体をスライドガラスに固相化したもの。

【 0 0 7 1 】

3. 結果

結果を図 9 及び 10 に示す。

50

図 9 及び 10 に示すように、Clone15、Clone18及びClone21から得られた抗SAAモノクローナル抗体は、ペプチド#7～#11に対して良好な結合性を示した。

【 0 0 7 2 】

4 . 結 論

Clone15、Clone18及びClone21から得られた抗SAAモノクローナル抗体は、ペプチド#7～#11に対して良好な結合性を示したことから、ペプチド#7～#11に共通するアミノ酸配列(QAANEWGRSGK：配列番号 1 4)をエピトープとして成熟型ヒトSAA1タンパク質に結合することが示唆された(図 1 0 C)。当該エピトープは、配列番号 1 に示すアミノ酸配列におけるN末端から80～90番目のアミノ酸配列に相当する。

【 0 0 7 3 】


本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。

10


【 図 1 】

ウシ	経過	検体	SAA測定値 (mg/L)
1	術前	血漿	0.76
	手術	血漿	0.62
	術0h	血漿	0.63
	術3h	血漿	0.62
	術6h	血漿	0.94
	術9h	血漿	1.32
	術1日	血漿	1.62
	術2日	血漿	1.72
	術3日	血漿	1.67
	術4日	血漿	1.57
	術5日	血漿	1.66
	術6日	血漿	1.69
	術7日	血漿	1.60
	術14日	血漿	1.06
	術21日	血漿	1.09


【 図 2 】



【図 3】



【図 4】



【図 5】

動物種	検体No.	参考(CRP)		SAA測定値	
		イヌ用CRP mg/dL	ヒト用CRP mg/dL	LZ-SAA mg/L	SAA-M mg/L
ウシ	1			0.9	23.2
	2		0.00	2.3	172.9
イヌ	1	0.00	3.97	0.9	191.8
	2	0.10	0.00	0.3	1.0
	3	0.00	0.01	0.4	0.7
	4	0.20	0.00	0.4	0.4
	5	0.15	0.00	0.3	0.6
	6	OR	3.59	1.0	101.5
	7	9.40	4.02	1.1	299.6
	8	5.50	3.85	1.1	166.8
	9	9.40	3.98	1.1	5.9
	10	3.65	1.82	0.6	19.5
	11	8.00	4.11	1.3	132.4
	12	5.00	3.80	1.1	98.2
	13	4.80	3.54	0.6	41.5
	14	12.00	3.94	1.5	185.4
	15	7.80	4.12	0.7	778.2
	16	12.00	3.76	1.1	47.1
ネコ	17		0.00	1.1	55.6
	18		3.87	0.9	584.7
	19		4.19	1.0	142.6
	20		3.67	1.5	236.1
	1		0.00	0.5	4.8
	2		0.00	0.6	3.1
	3		0.00	0.5	2.8
	4		0.01	0.7	5.3
	5		0.00	1.0	21.7
	6		0.01	70.3	255.4
	7		0.00	76.1	473.4
	8		0.00	75.3	441.2
	9		0.00	7.1	315.7
	10		0.00	12.6	447.3
	11		0.00	13.4	314.5
	12		0.00	10.2	304.8
	13		0.00	57.3	668.2
	14		0.00	91.4	710.3
	15		0.00	105.9	367.2

空欄は測定を行っていないことを示す。

【図 6】



動物種	検体No.	動物SAA 試薬 (mg/L)	比較例* (LZ-SAA) (mg/L)	参考例 (CRP) (mg/L)	動物種	検体No.	動物SAA 試薬 (mg/L)	比較例* (LZ-SAA) (mg/L)	参考例 (CRP) (mg/L)
ウシ	1	42.9	2.1		サル	1	0.8	0.0	
	2	138.6	0.8			2	1.5	0.2	
	3	11.9	1.2			3	7.6	0.8	
	4	49.7	1.1			4	22.1	1.2	
	5	92.7	1.2			5	15.0	0.8	
	6	46.0	1.3			6	20.3	8.6	
	7	40.8	0.0			7	1180.5	0.1	
	8	174.1	0.0			8	198.5	1.6	
	9	61.6	0.0			9	1.4	0.0	
	10	12.6	0.0			10	0.6	0.0	
	11	28.2	0.0			11	0.9	0.0	
	12	40.7	0.0			12	30.0	13.4	
	13	111.9	0.0			13	3.0	0.0	
	14	138.8	0.0		ロバ		6.5	0.0	
	15	28.9	0.7				0.1	0.7	
ウマ	16	6.5	0.4		ヒツジ		2.6	0.0	
	1	3.5	3.0				0.1	0.7	
	2	23.3	7.5		カビバラ	1	0.6	0.0	
	3	3.1	1.8			2	0.9	0.0	
	4	0.0	2.0		ネズミ	1	0.6	0.0	
	5	15.1	11.5			4	2.4	1.0	
	6	4.8	0.8			3	1.3	0.0	
	7	2.1	1.5			2	0.9	0.0	
	8	1.8	0.0			5	0.5	0.0	
	9	4257.4	3624.9			6	1.0	0.0	
	10	223.2	293.6		ウサギ	1	1.7		0.3
	11	56.3	85.2			2	25.5		56.7
	12	2055.0	1804.8			3	18.1		97.6
	13	352.9	394.5			4	613.7		53.5
	14	67.0	78.7			5	28.3		57.0
	15	60.8	72.0			6	0.0		7.1
	16	45.7	44.2			7	7.9		14.6
	17	109.3	153.4			8	52.5		10.1
	18	199.5	251.0			9	62.2		77.2
	19	75.3	72.5			10	19.0		71.6
	20	3791.1	5492.7			11	349.5		213.4
						12	10.0		8.3

*比較例(LZテスト) 栄研(SAA)

空欄は測定を行っていないことを示す。

【図 7】

		動物SAA 試薬	LZ-SAA 試薬	Clone 15		Clone 18		Clone 21	
				測定結果 (Abs.)	盲検 補正值	測定結果 (Abs.)	盲検 補正值	測定結果 (Abs.)	盲検 補正值
				盲検 (n3平均)				0.008	-
ヒト	A	○	○	1.097	1.097	1.477	1.477	1.587	1.587
	B	○	○	1.158	1.158	1.592	1.592	1.557	1.557
ネコ	A	○	○	0.400	0.400	0.566	0.566	0.649	0.649
	B	○	○	1.024	1.024	1.280	1.280	1.321	1.321
イヌ	A	○	×	0.506	0.506	0.795	0.795	0.915	0.915
	B	○	×	0.834	0.834	1.243	1.243	1.297	1.297
ウマ	A	○	○	0.786	0.786	1.168	1.168	1.220	1.220
	B	○	○	0.271	0.271	0.422	0.422	0.448	0.448
ウシ	A	○	×	1.753	1.753	2.011	2.011	2.092	2.092
	B	○	×	0.318	0.318	0.791	0.791	0.843	0.843
サル	A	○	○	0.606	0.606	0.970	0.970	1.025	1.025
	B	○	○	0.323	0.323	0.496	0.496	0.512	0.512
	C	○	×	0.918	0.918	1.325	1.325	1.462	1.462
	D	○	×	0.348	0.348	0.548	0.548	0.616	0.616
	E	○	×	0.690	0.690	0.978	0.978	1.021	1.021
	F	○	×	0.671	0.671	0.975	0.975	1.065	1.065
	G	○	×	0.079	0.079	0.121	0.121	0.120	0.120
カピバラ	A	○	×	1.892	1.892	2.204	2.204	2.168	2.168
	B	○	×	0.073	0.073	0.365	0.365	0.380	0.380




【図 8】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biotin-BSA	Biotin-BSA	Biotin-BSA	#5	#5	#5	Rat IgG (Raybio)	Rat IgG (Raybio)	Rat IgG (Raybio)
2	Biotin-BSA	Biotin-BSA	Biotin-BSA	#6	#6	#6			
3	#1	#1	#1	#7	#7	#7	#11	#11	#11
4	#2	#2	#2	#8	#8	#8	#12	#12	#12
5	#3	#3	#3	#9	#9	#9	0.1% BSA-PBS	0.1% BSA-PBS	0.1% BSA-PBS
6	#4	#4	#4	#10	#10	#10	Biotin-BSA	Biotin-BSA	Biotin-BSA

【図 9】

Signal to Noise	Target Name	15 50μg/mL	15 50μg/mL	18 50μg/mL	18 50μg/mL	21 50μg/mL	21 50μg/mL
		Without Background	Without Background	Without Background	Without Background	Without Background	Without Background
	POS	136809.21	136809.21	136809.21	136809.21	136809.21	136809.21
	#1	671.82	1422.39	915.90	1330.47	810.13	1255.83
	#2	5.57	7.65	7.39	7.42	7.85	8.82
	#3	0.18	0.18	0.42	0.49	0.30	0.33
	#4	0.02	0.50	0.77	1.92	0.16	0.37
	#5	2.00	4.78	6.24	12.02	1.49	4.92
	#6	2.15	4.30	8.17	15.03	1.54	2.43
	#7	757.19	1155.89	425.54	928.40	323.44	935.53
	#8	822.75	1548.83	738.62	1143.15	673.33	1380.64
	#9	325.52	394.50	306.34	550.46	371.41	630.65
	#10	374.18	599.71	374.32	509.00	470.01	805.49
	#11	40.74	54.10	104.97	148.58	65.94	99.02
	#12	0.32	2.21	0.58	2.29	0.24	0.28

【図 10】



【配列表】

2019004168000001.app

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2018/024114									
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl. G01N33/53(2006.01)i, C07K16/18(2006.01)i, G01N33/543(2006.01)i, G01N33/577(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC											
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. G01N33/53, C07K16/18, G01N33/543, G01N33/577 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2018 Registered utility model specifications of Japan 1996-2018 Published registered utility model applications of Japan 1994-2018 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS/WPIDS (STN)											
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CHRISTENSEN, M. et al., "Evaluation of an automated assay based on monoclonal anti-human serum amyloid A (SAA) antibodies for measurement of canine, feline, and equine SAA", The Veterinary Journal, December 2012, vol. 194, no. 3, pp. 332-337</td> <td>1, 4-6, 9</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>KJELGAARD-HANSEN, M. et al., "Determination of feline serum amyloid A (SAA) by means of a commercially available human SAA turbidimetric immunoassay", 5th International Colloquium on Animal Acute Phase Proteins, March 2005, p. 51</td> <td>1, 4-6, 9</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	CHRISTENSEN, M. et al., "Evaluation of an automated assay based on monoclonal anti-human serum amyloid A (SAA) antibodies for measurement of canine, feline, and equine SAA", The Veterinary Journal, December 2012, vol. 194, no. 3, pp. 332-337	1, 4-6, 9	X	KJELGAARD-HANSEN, M. et al., "Determination of feline serum amyloid A (SAA) by means of a commercially available human SAA turbidimetric immunoassay", 5th International Colloquium on Animal Acute Phase Proteins, March 2005, p. 51	1, 4-6, 9
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.									
X	CHRISTENSEN, M. et al., "Evaluation of an automated assay based on monoclonal anti-human serum amyloid A (SAA) antibodies for measurement of canine, feline, and equine SAA", The Veterinary Journal, December 2012, vol. 194, no. 3, pp. 332-337	1, 4-6, 9									
X	KJELGAARD-HANSEN, M. et al., "Determination of feline serum amyloid A (SAA) by means of a commercially available human SAA turbidimetric immunoassay", 5th International Colloquium on Animal Acute Phase Proteins, March 2005, p. 51	1, 4-6, 9									
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.											
<table border="0"> <tr> <td> * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed </td> <td> "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family </td> </tr> </table>			* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family							
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family										
Date of the actual completion of the international search 13 September 2018 (13.09.2018)		Date of mailing of the international search report 25 September 2018 (25.09.2018)									
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.									

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/024114

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	SEFERIAN, K. et al., "Monoclonal antibodies specific to serum amyloid A from different species", Journal of Veterinary Internal Medicine, 2015 ACVIM Forum Research Abstract Program, 27 May 2015, vol. 29, no. 4, p. 1223, OT10	1, 4, 6, 9 5
X Y	US 2012/0322163 A1 (GENTIAN AS) 20 December 2012, paragraphs [0011]-[0013] & WO 2011/058087 A1	1, 4, 6, 9 5
X Y	SASAKI, K. et al., "Characterization of Monoclonal Antibodies Specific for Feline Serum Amyloid (SAA) Protein", HYBRIDOMA, 2001, vol. 20, no. 2, pp. 103-108	1, 4, 6, 9 5
Y	JP 08-043389 A (EIKEN CHEMICAL CO., LTD.) 16 February 1996, paragraphs [0010], [0020] (Family: none)	5
A	OHNO, K. et al., "Expression of Recombinant Feline Serum Amyloid A (SAA) Protein", The Journal of Veterinary Medical Science, August 1999, vol. 61, no. 8, pp. 915-920	1-13

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 8 / 0 2 4 1 1 4										
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/53(2006.01)i, C07K16/18(2006.01)i, G01N33/543(2006.01)i, G01N33/577(2006.01)i												
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/53, C07K16/18, G01N33/543, G01N33/577												
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2018年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2018年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2018年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2018年	日本国実用新案登録公報	1996-2018年	日本国登録実用新案公報	1994-2018年	
日本国実用新案公報	1922-1996年											
日本国公開実用新案公報	1971-2018年											
日本国実用新案登録公報	1996-2018年											
日本国登録実用新案公報	1994-2018年											
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) Cplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS/WPIDS (STN)												
C. 関連すると認められる文献												
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号										
X	CHRISTENSEN, M. et al., Evaluation of an automated assay based on monoclonal anti-human serum amyloid A (SAA) antibodies for measurement of canine, feline, and equine SAA, The Veterinary Journal, 2012.12, Vol. 194, No. 3, pp. 332-337	1, 4-6, 9										
X	KJELGAARD-HANSEN, M. et al., Determination of feline serum amyloid A (SAA) by means of a commercially available human SAA turbidimetric immunoassay, 5th International Colloquium on Animal Acute Phase Proteins, 2005.03, p. 51	1, 4-6, 9										
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。												
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 </td> <td> の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>				* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献							
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献											
国際調査を完了した日 13.09.2018		国際調査報告の発送日 25.09.2018										
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		<table border="1"> <tr> <td>特許庁審査官 (権限のある職員)</td> <td>2 J</td> <td>6 2 0 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">磯田 真美</td> </tr> <tr> <td>電話番号 03-3581-1101</td> <td colspan="2">内線 3252</td> </tr> </table>		特許庁審査官 (権限のある職員)	2 J	6 2 0 2	磯田 真美			電話番号 03-3581-1101	内線 3252	
特許庁審査官 (権限のある職員)	2 J	6 2 0 2										
磯田 真美												
電話番号 03-3581-1101	内線 3252											

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 8 / 0 2 4 1 1 4
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	SEFERIAN, K. et al., Monoclonal antibodies specific to serum amyloid A from different species, Journal of Veterinary Internal Medicine, 2015 ACVIM Forum Research Abstract Program, 2015.05.27, Vol. 29, No. 4, p. 1223, OT10	1, 4, 6, 9 5
X Y	US 2012/0322163 A1 (GENTIAN AS) 2012.12.20, [0011]-[0013] & WO 2011/058087 A1	1, 4, 6, 9 5
X Y	SASAKI, K. et al., Characterization of Monoclonal Antibodies Specific for Feline Serum Amyloid (SAA) Protein, HYBRIDOMA, 2001, Vol. 20, No. 2, pp. 103-108	1, 4, 6, 9 5
Y	JP 08-043389 A (栄研化学株式会社) 1996.02.16, [0010], [0020] (ファミリーなし)	5
A	OHNO, K. et al., Expression of Recombinant Feline Serum Amyloid A (SAA) Protein, The Journal of Veterinary Medical Science, 1999.08, Vol. 61, No. 8, pp. 915-920	1-13

フロントページの続き

(81)指定国・地域 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	在各种动物中测定血清淀粉样蛋白a的方法及其测定试剂		
公开(公告)号	JPWO2019004168A1	公开(公告)日	2020-04-23
申请号	JP2019526913	申请日	2018-06-26
[标]申请(专利权)人(译)	荣研化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	荣研化学株式会社		
[标]发明人	和田厚文		
发明人	旭 由香里 和田 厚文		
IPC分类号	G01N33/53 G01N33/544 C07K14/46 C07K16/18		
CPC分类号	C07K16/18 G01N33/53 G01N33/543 G01N33/577		
FI分类号	G01N33/53.D G01N33/544.Z C07K14/46.ZNA C07K16/18		
F-TERM分类号	4H045/AA10 4H045/AA11 4H045/AA30 4H045/BA10 4H045/CA40 4H045/DA86 4H045/EA50 4H045/FA74		
优先权	2017124578 2017-06-26 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种试剂，该试剂能够测量源自各种动物物种的血清淀粉样蛋白A。具体地，本发明涉及一种用于测定从多种动物获得的血清淀粉样蛋白A的试剂，所述试剂包括动物物种交叉反应的抗血清淀粉样蛋白A单克隆抗体或其片段。

