

(19)日本国特許庁（J P）

(12) 公表特許公報 (A) (11)特許出願公表番号

特表2003－521499

(P2003－521499A)

(43)公表日 平成15年7月15日(2003.7.15)

(51)Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
C 0 7 K 7/06	ZNA	C 0 7 K 7/06	2 G 0 4 5
A 6 1 K 45/00		A 6 1 K 45/00	4 C 0 8 4
A 6 1 P 25/28		A 6 1 P 25/28	4 H 0 4 5
43/00	111	43/00	111
C 0 7 K 14/00		C 0 7 K 14/00	

審査請求 未請求 予備審査請求（全 80数） 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001－555812(P2001－555812)

(86)(22)出願日 平成13年1月18日(2001.1.18)

(85)翻訳文提出日 平成14年7月23日(2002.7.23)

(86)国際出願番号 PCT/EP01/00560

(87)国際公開番号 W001/055725

(87)国際公開日 平成13年8月2日(2001.8.2)

(31)優先権主張番号 00870008.0

(32)優先日 平成12年1月24日(2000.1.24)

(33)優先権主張国 欧州特許庁(EP)

(31)優先権主張番号 60/178,391

(32)優先日 平成12年1月27日(2000.1.27)

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 インノジェネティクス・エヌ・ブイ
INNOGENETICS N.V.
ベルギー国、ビー－9052 ゲント、ボックス 4、インダストリーパーク・ツウィナード 7

(72)発明者 ファンメヘーレン，エーゲーン
ベルギー国、バー－9810 ナザレトーエケ、テン・エーデストラート 101

(72)発明者 ファンデルスティケーレ，ヒューゴ
ベルギー国、バー－9000 ヘント、タインウェイク 43


(74)代理人 弁理士 津国 肇 （外1名）

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 タウオパチーの診断

(57)【要約】

本発明は、個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率の検出に基づいて、該個体におけるタウオパチーを診断する方法、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーを鑑別診断する方法を提供する。本発明は、さらに、本発明の方法における標準化のためのホスホペプチドを提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 個体におけるタウオパチーを診断する方法であって、

- ・該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；
- ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程であって、対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程とを含む方法。

【請求項2】 個体における非タウオパチーと対比してのタウオパチーを鑑別診断する方法であって、

- ・該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を測定する工程と；
- ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、非タウオパチーに罹患している個体で得られたホスホタウ（181）／総タウの比率とか、または対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程、非タウオパチーに罹患している個体、または対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程とを含む方法。

【請求項3】 タウオパチーの診断用、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断用の診断キットの製造のための、神経学的マーカーとしてのタウおよびホスホタウ（181）の使用。

【請求項4】 該非タウオパチーが、非タウオパチー神経変性である、請求項2又は3に記載の方法。

【請求項5】 該非タウオパチーが、血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中、および／または白血病の患者における神経毒性である、請求項2～4のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】 タウオパチーが、アルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆である、請求項1～5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】 下記の工程：

- ・該個体から脳脊髄液サンプルを得る工程と；
 - ・該脳脊髄液サンプル中のホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；
 - ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、非タウオパチーに罹患している個体からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウの比率とか、または対照個体からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程であって、非タウオパチーに罹患している個体からのCSF中のか、または対照個体からのCSF中の該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標となる工程と
- を含む請求項1～6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】 請求項1～6のいずれか一項に記載の方法において神経学的マーカーとして用いるためのタウおよびホスホタウ（181）。

【請求項9】 モノクローナル抗体HT7およびモノクローナル抗体AT270との免疫学的複合体を容易に形成するホスホペプチドであって、少なくとも、

- ・HT7の最小エピトープ：PPGQK（配列番号1）；および
 - ・AT270の最小エピトープ：PPAPKT（p）P（配列番号2）
- を含む、ホスホペプチド。

【請求項10】 該ホスホペプチドが、下記の配列：

PRGAAPPGQKGQANATRIPAKTPPAPKT(p)PPSSGE（配列番号：3）

または依然としてHT7およびAT270モノクローナル抗体に結合する条件での変異配列を含む、請求項9記載のホスホペプチド。

【請求項11】 ホスホタウ（181）のレベルを測定する方法における請求項9又は10に記載のホスホペプチドの使用。

【請求項12】 請求項1～7のいずれか一項に記載のタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断の方法における請求項9又は10に記載のホスホペプチドの使用。

【請求項13】 ホスホタウ（181）のレベルを測定するための診断キットの製造のための請求項9又は10に記載のホスホペプチドの使用。

【請求項14】 請求項1～7のいずれか一項に記載のタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための診断キットの製造のための請求項9又は10に記載のホスホペプチドの使用。

【請求項15】 個体におけるタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための診断キットであって、少なくとも：

- ・ホスホタウ（181）を特異的に認識する抗体と；
- ・タウを認識する抗体と

を含む診断キット。

【請求項16】 個体におけるタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のために、ホスホタウ（181）のレベルを測定するための診断キットであって、少なくとも請求項9又は10に記載のペプチドを含む診断キット。

【請求項17】 少なくとも：

- ・ホスホタウ（181）を特異的に認識する抗体と；
- ・タウを認識する抗体と；
- ・請求項9又は10に記載のペプチドと

を含む請求項15又は16に記載の診断キット。

【請求項18】 タウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための請求項15～17のいずれか一項に記載の診断キットの使用。

【請求項19】 アルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆の診断のため、および／または血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中および／または白血病の患者における神経毒性と対比してのアルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆の鑑別診断に用いるための請求項15～17のいずれか一項に記載の診断キッ

トの使用。

【請求項20】 薬物の試験もしくはスクリーニングのための、診断追跡のための、および／または一定の処置の有効性の決定のための請求項1～19のいずれか一項に記載のホスホペプチド、方法および／または診断キットの使用。

【発明の詳細な説明】

【0001】

(発明の分野)

本発明は、タウオパチーの診断に関する。本発明は、タウオパチーの検出および／または鑑別診断のための新奇な方法を提供する。本発明は、本発明の方法における標準化に用いることができるホスホペプチドも提供する。

【0002】

(発明の背景)

痴呆のいくつかの形態、いわゆるタウオパチー [Goedert et al., 1998] は、同じ病態生理学的機序、すなわち構造タンパク質であるタウの関与と関連付けられている。微小管関連タンパク質であるタウは、たとえば、アルツハイマー病に関連する、対合らせんフィラメント (PHP) および神経原繊維タングル (neurofibrillar tangles) (NFT) の主要なタンパク質成分である [Brion et al., 1985; Delacourte & Defossez, 1986; Grundke-Iqbal et al., 1986; Kosik et al., 1986; Wood et al., 1986; Kondo et al., 1988]。タウタンパク質は、異なるイソ型で存在し、うち4～6種類は、成人の脳に見出されるが、胎児脳には、一つのイソ型のみが検出されるにすぎない。イソ型の多様性は、選択的mRNAスプライシングによって、ヒト第17染色体上のただ一つの遺伝子から生成される [Himmler, 1989; Goedert et al., 1989; Andreadis et al., 1992]。タウタンパク質の、分子クローニングから推論された限りで最も目を引く特徴は、分子のカルボキシル末端部に生じる、31または32アミノ酸のストレッチであって、3または4回反復されることができる。追加的な多様性は、タウ分子のNH₂末端部での29または58アミノ酸長の挿入によって生成される [Goedert et al., 1989]。in vivoで、タウは、タウの反復領域(255～381)内のその微小管結合ドメインが関与する相互作用によって、ニューロンの軸索区画での微小管集成および安定性を促進する [Lewis et al., 1988]。正常な状況下では、成人の脳は、タウ1モルあたり2～3モルのリン酸塩を含有する [Selden & Pollard, 1983; Ksiezak-Reding et al., 1992]。ラットおよびヒトで研究された限りで、正常タウの異なる部位のリン酸化は、発生状態に左右される [Lee

et al., 1991; Bramblett et al., 1993; Goedert et al., 1993]。リン酸化の結果として生じる60、64および68kDaのタウ変異体が、脳の神経原繊維タンゲルを示す部域で検出されている [Delacourte et al., 1990; Goedert et al., 1992; Flament et al., 1990; Greenberg & Davies, 1990]。これらの脳は、タウ1モルあたり6～8モルのリン酸塩を含有する [Ksiezak-Reding et al., 1992]。PHPから単離されたタウ (PHP-タウ) では、リン酸化は、いくつかの位置で発生する [Iqbal et al., 1989; Lee et al., 1991; Hasegawa et al., 1992; Hanger et al., 1998; Buee et al., 1999]。

【0003】

アルツハイマー病 (AD) は、タウの病理学に関連する、最も一般的な形式の一次性変性痴呆であって、42～75%の罹患率を有する [Brun, 1993; Gustafson, 1993; Ebly et al., 1994]。前頭側頭痴呆 (FTD) は、病理学的には、ピック病、第17染色体連関パーキンソン病による前頭側頭痴呆、散発性FTD、および運動ニューロン病が存在する、臨床的状态である。Mannら [2000] による小規模な研究によれば、FTDの37症例中16は、タウ免疫組織化学に基づいて、タウオパチーとして分類することができた。繊維状タウという病理学、すなわち神経原繊維タンゲルは、一貫してADに見出されるが [Tomlinson & Corsellis, 1984]、FTDにも見出されることがある [Spillantini & Goedert, 1998]。病的なタウタンパク質は、ADおよびFTDにともに見出されるが [Vermersche et al., 1995; Delacourte et al., 1996]、脳組織についての研究は、タウの病理学は、ADとFTDとは異なり、おそらくリン酸化の程度に関連することを示唆した [Delacourte et al., 1996]。タウの病理に関連するその他の形態の痴呆は、進行性核上麻痺 (PSP)、皮質基底変性 (CBD) および亜急性硬化性汎脳炎を包含する。これらのタウオパチーの病理学における過剰リン酸化の役割は、現在は、十分に理解されていない。加えて、プロリン領域に集中した特異的ホスホ部位の、リン酸化の程度の正確な決定は、様々な困難に遭遇している。これらの困難のため、これらのタウオパチーを特異的に検出するための正確な方法は、依然として欠如している。

【0004】

個体におけるタウオパチーの診断方法を提供することは、本発明の一つの目的である。

【0005】

個体におけるアルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆の診断方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0006】

非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断の方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0007】

非タウオパチー神経変性と対比してのタウオパチーの鑑別診断の方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0008】

血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中、および／または白血病の患者における神経毒性と対比してのタウオパチーの鑑別診断の方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0009】

血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中、および／または白血病の患者における神経毒性と対比しての、アルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆の鑑別診断の方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0010】

上記のと通りのインビトロ (in vitro) の方法を提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0011】

標準化に用いるためのホスホペプチドを提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0012】

ホスホタウ (181) を検出する方法における標準化に用いるためのホスホペ

プチドを提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0013】

上記のとおりの方法における標準化に用いるためのホスホペプチドを提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0014】

上記のとおりの方法に用いるための診断キットを提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0015】

タウオパチーに対する、薬物の試験もしくはスクリーニング、診断用追跡、および／または一定の処置の有効性の決定のための、ペプチド、方法、および／または診断キットを提供することは、本発明のもう一つの目的である。

【0016】

【表1】

表1：ホスホーThr181に対するAT270の特異性を決定するのに
用いられるリン酸化ペプチドの配列

名称	配列	配列番号
153	KGADGKTKLAT(p)PRGAAPPQK	8
175	QANATRIAPKT(p)PPAPKTPSS	9
181	RIPAKTPPAPKT(p)PPSSGEPPKS	10
198	PPKSGDRSGYS(p)SGSPGTPGSR	11
199	PKSGDRSGYSS(p)GSPGTPGSR	12
202	SGDRSGYSSGS(p)PGTPGSRRT	13
205	RSGYSSGSPGT(p)PGSRRTPSL	14
208	YSSGSPGTPGS(p)RSRTPSLPTP	15
210	SGSPGTPGSR(p)RTPSLPTPTR	16
212	SPGTPGSRRT(p)PSLPTPTREP	17
214	GTPGSRRTPS(p)LPTPTREP	18
217	GSRRTPSLPT(p)PTREP	19
231	REP	20
235	KKVAVVRTPKS(p)PSSAKSRLQ	21
262	VKSKIGS(p)TENLK	22
396	TDHGAIEIVYKS(p)PVVSDTSPRH	23
400	AEIVYKSPVVS(p)DTSPRHLSNV	24
403	IVYKSPVVS(p)DTSPRHLSNVSS	25
404	YKSPVVS(p)DTSPRHLSNVSS	26
409	VVSDTSPRHLS(p)NVSSSTGSIDM	27
412	DTSPRHLSNV(p)STGSIDMVDS	28
422	SSTGSIDMVDS(p)PQLATLADEV	29

(p): アミノ酸がリン酸化されている。

【0017】

【表2】

表2：例2に記載された研究に關与する患者の臨床的特徴

診断	N	性別 (M:F)	年齢	痴呆の持続期間 (y)	痴呆の程度 ^a	アルブミン比 ^b
FTD	18	5:13	65.5±8.4	4.1±3.2	17.7±6.4	9.7±2.9
蓋然 AD	41	13:28	73.8±5.9	3.2±1.8	17.6±5.2	5.4±1.8
可能 AD	19	11:8	78.9±5.7	3.0±2.3	21.9±3.7	7.9±2.9
SAE	17	12:5	75.8±4.4	2.6±2.2	22.1±7.2	11.9±7.2
PD	15	11:4	69.9±7.5	-	-	6.8±2.4
対照	17	4:13	71.8±4.2	-	-	5.3±1.8

^aMMSEの評点; ^bアルブミン比 = [CSF-アルブミン(mg/L)/血清アルブミン(g/L)].

【0018】

値は、すべて、平均±SDとして表されている。下記の略記を用いた；FTD：前頭側頭痴呆、AD：アルツハイマー病、SAE：皮質下動脈硬化性脳症、PD：パーキンソン病、Prob：蓋然性のある、Poss：可能性のある、N：個体数、M：男性、F：女性、y：年齢、CSF：脳脊髄液。

【0019】

【表3】

表3：痴呆疾患、パーキンソン病、および正常な加齢における総タウ、
ホスホタウ（181）およびホスホタウ（181）／総タウ比のCSFレベル

診断	脳脊髄液レベル (pM)		
	総タウ	ホスホタウ (181)	ホスホタウ (181)/ 総タウ
FTD	9.74 ± 2.88	8.59 ± 3.88***	0.88 ± 0.34***
蓋然AD	20.01 ± 7.58***	23.12 ± 10.10**	1.16 ± 0.24***
可能AD	16.34 ± 4.30***	18.01 ± 5.86	1.10 ± 0.20***
SAE	3.70 ± 2.29***	6.39 ± 5.59***	1.96 ± 1.08
PD	7.45 ± 1.59	14.07 ± 3.11	1.92 ± 0.42
対照	8.33 ± 2.83	15.92 ± 5.72	1.95 ± 0.60

【0020】

値は、すべて、平均±SDとして表されている。略記：FTD：前頭側頭痴呆、AD：アルツハイマー病、PD：パーキンソン病、SAE：皮質下動脈硬化性脳症。

*** 値は、対照についての値と比較して有意に異なる（ $p < 0.001$ ）。

** 値は、対照についての値と比較して有意に異なる（ $p < 0.01$ ）。

* 値は、対照についての値と比較して有意に異なる（ $p < 0.05$ ）。

【0021】

（発明の詳細な説明）

本発明は、個体におけるタウオパチーを診断する方法であって、

【0022】

・該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；

【0023】

・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程であって、対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程とを

含む方法に関する。

【0024】

本発明は、個体における非タウオパチーと対比してのタウオパチーを鑑別診断する方法であって、

【0025】

・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、非タウオパチーに罹患している個体で得られたホスホタウ（181）／総タウの比率とか、または対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程、非タウオパチーに罹患している個体、または対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程とを含む方法にも関する。

【0026】

本発明は、ADに罹患している患者からのCSF、およびある種の形態のFTDに罹患している患者からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウの比率は、対照個体からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウ比と比較して有意に変化するとの知見に基づく。本発明は、さらに、ADに罹患している患者からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウの比率は、卒中に罹患している患者からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウ比と比較して有意に変化するとの知見にも基づく。タウオパチーの患者におけるホスホタウ（181）／総タウ比が変化することの表示は、個体におけるタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーに罹患している個体と対比しての、タウオパチーに罹患している個体の鑑別診断のための診断試験の開発に向けての基盤を形成する。

【0027】

「タウオパチー」は、タウの病理学に関連するあらゆる形態の痴呆である。

【0028】

アルツハイマー病、およびある種の形態の前頭側頭痴呆（ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆）は、最も一般的な形態のタウオパチーである。したがって、本発明は、タウオパチー

が、アルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および第17染色体連鎖関パーキンソン病による前頭側頭痴呆である、上記のいかなる方法にも関する。その他のタウオパチーは、進行性核上麻痺（PSP）、皮質基底変性（CBD）および垂急性硬化性汎脳炎を包含するが、これらに限定されない。

【0029】

特定の実施態様では、本発明は、個体におけるアルツハイマー病を診断する方法であって、

【0030】

- ・該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；

【0031】

・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較して、対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標となることによって、該個体がアルツハイマー病に罹患していることを推論する工程とを含む方法に関する。

【0032】

「非タウオパチー」は、脳のタウオパチーに関連しないいかなる状態でもある。本発明の実施態様では、該非タウオパチーは、非タウオパチー神経変性である。非タウオパチー神経変性は、神経学的疾患のタウオパチーに関連しないいかなる形態でもある。非タウオパチー神経変性は、血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中、および／または白血病の患者における神経毒性を包含するが、これらに限定されない。

【0033】

したがって、特定の実施態様では、本発明は、卒中と対比してのアルツハイマー病を個体において鑑別診断する方法であって、

【0034】

- ・該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；

【0035】

- ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、卒中に罹患

している個体で得られたホスホタウ（181）／総タウの比率と比較することによって、該個体が卒中ではなくアルツハイマー病に罹患していることを推論する工程であって、卒中に罹患している個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程、を含む方法に関する。

【0036】

ホスホタウ（181）は、第181位のトレオニンでリン酸塩を有する、すべてのタウ分子を包含する。アミノ酸配列に関する番号付けは、タウの最長のイソ型であるhTau40を参考にする〔Goedert et al., 1989〕。

【0037】

総タウとは、タウのすべての形態を意味し、いかなるリン酸化状態のタウも包含する。

【0038】

したがって、本発明は、タウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための、神経学的マーカーとして用いるためのタウおよびホスホタウ（181）に関する。

【0039】

個体におけるホスホタウ（181）および総タウのレベルに基づけば、該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定することができる。

【0040】

ホスホタウ（181）／総タウの比率は、in vivoはもとより、in vitroでも検出することができる。個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率をin vitroで検出する方法は、

【0041】

- ・該個体からサンプルを得る工程と；

【0042】

- ・該サンプル中のホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；

【0043】

- ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、非タウオパ

チーに罹患している個体からのサンプル中のホスホタウ（181）／総タウの比率とか、または対照個体からのサンプル中のホスホタウ（181）／総タウ比と比較することによって、該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程であって非タウオパチーに罹患している個体、または対照個体における該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標である工程を含む。

【0044】

用語「サンプル」は、生物学的材料のいかなる入手源、たとえば、ホスホタウ（181）タンパク質を含む体液、脳抽出物、末梢血その他いかなるサンプルも意味する。本発明の一実施態様では、ホスホタウ（181）／総タウの比率は、患者の体液サンプル中のホスホタウ（181）／総タウの比率の分析によって、*in vitro*で決定する。用語「体液」は、人体内に存在する、ホスホタウ（181）タンパク質を含む血液、リンパ、尿および脳脊髄液（CSF）を包含するが、これらに限定されないすべての体液を意味する。本発明のもう一つの実施態様では、ホスホタウ（181）／総タウの比率は、患者から採取した脳脊髄液（CSF）サンプル中で決定する。したがって、本発明は、

【0045】

- ・該個体から脳脊髄液サンプルを得る工程と；

【0046】

- ・該脳脊髄液サンプル中のホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と；

【0047】

- ・得られた該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を、非タウオパチーに罹患している個体からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウの比率とか、または対照個体からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウ比と比較することによって該個体がタウオパチーに罹患していることを推論する工程であって、非タウオパチーに罹患している個体からのCSF中のか、または対照個体からのCSF中の該比率と比較したホスホタウ（181）／総タウの比率の変化が指標となることによって、

を含む上記の方法に関する。

【0048】

総タウは、抗体の使用を包含するが、これらに限定されない、公知のいかなる方法によってか、または別途、機能アッセー [Bramblett et al., 1992] によっても定量することができる。総タウを特異的に認識する、いかなるモノクローナルまたはポリクローナル抗体も、総タウの定量に用いてよい。正常および異常にリン酸化されたタウを認識する抗体は、A1z50 [Ghanbari et al., 1990]、HT7 [Mercken et al., 1992]、およびAT120 [Vandermeeren et al., 1993] を包含する。しかし、総タウを認識する、当技術に公知のその他の抗体も、用いることができる。総タウの定量のための、非常に迅速で、利用者が扱いやすい方法は、INNOTEST hTau-Ag (Innogenetics, Gent、ベルギー国) である。

【0049】

ホスホタウ (181) は、抗体の使用を包含するが、これらに限定されない、公知のいかなる方法によっても定量することができる。好適実施態様では、ホスホタウ (181) は、少なくとも下記の工程：

【0050】

- ・患者からサンプルを得る工程と；

【0051】

- ・該サンプルを、抗原－抗体複合体を生成するのに適する条件下で、ホスホタウ (181) を特異的に認識するモノクローナル抗体と接触させる工程と；

【0052】

- ・該サンプルとの該抗体の免疫学的結合を検出する工程と
- を含む免疫アッセーによって定量する。

【0053】

はるかに好適な実施態様では、ホスホタウ (181) は、下記の工程：

【0054】

- ・患者からサンプルを得る工程と；

【0055】

- ・該サンプルを、抗原－抗体複合体を生成するのに適する条件下で、ホスホタウ

(181) を特異的に認識するモノクローナル抗体（一次抗体すなわち捕捉抗体）と接触させる工程と；

【0056】

・該抗原－抗体複合体を、抗原－抗体複合体を生成するのに適する条件下で、ホスホタウ（181）を特異的に認識するモノクローナル抗体（二次抗体すなわち検出抗体）と接触させる工程と；

【0057】

・該抗原－抗体複合体を、該二次抗体による特異的タグ付け、またはそれとのカップリングのいずれかのための、当業者には公知である可能ないかなるマーカールとも接触させる工程と；

【0058】

・標準化の目的で、おそらくは、該抗体を、両抗体と反応する精製されたホスホタウタンパク質またはホスホペプチドと接触させる工程とを含む、サンドウィッチELISAによって定量することができる。

【0059】

好都合には、二次抗体自体が、マーカールとの直接または間接カップリングのためのマーカールもしくは基を有する。

【0060】

本発明に用いられる限りで、表現「認識する」、「反応する」、「免疫学的結合」または「抗原－抗体複合体を生成する」は、抗原と抗体との結合が、該抗体および抗原の免疫学的特性に留意するすべての条件下で生じることと解されるものとする。

【0061】

本発明に用いられる限りで、表現「特異的に認識する」は、該抗体が、ホスホタウ（181）とは免疫学的複合体を形成できるが、トレオニン181でのリン酸化を欠くタウ分子とは形成できないことと解されるものとする。

【0062】

ホスホタウ（181）を特異的に認識する、いかなるモノクローナル抗体も、ホスホタウ（181）の定量のための該方法に用いることができる。ホスホタウ

(181)の定量に用いるのに好適なモノクローナル抗体は、AT270 (W095/17429のもとに刊行された国際特許願)である。しかし、ホスホタウ(181)を特異的に認識する、当技術に公知のその他の抗体も用いることができる。

【0063】

標準化の目的で、トレオニン181でリン酸化されたタウタンパク質またはペプチドを用いることができる。これは、脳からの抽出、またはin vitroでの正常タウのリン酸化のような、いかなる方法によっても得ることができる。プロリン領域に集中された特異的ホスホ部位のリン酸化の程度を正確に決定することは困難であるため、本発明の実施態様では、合成ホスホペプチドを標準化のために用いる。該合成ホスホペプチドは、免疫アッセーに用いられた抗体と免疫学的複合体を形成することができなければならない。

【0064】

したがって、本発明は、モノクローナル抗体によって認識される少なくとも二つのエピトープを含み、サンドウィッチELISAにおいて、該モノクローナル抗体との免疫学的複合体を容易に形成する、ホスホペプチドにも関する。以前の研究は、ペプチドは、一定のモノクローナル抗体に対するエピトープを含むが、該モノクローナル抗体は、必ずしも該ペプチドを認識しないことを示していた〔DeLeys et al., 1996〕。本発明者らは、該エピトープを認識するモノクローナル抗体との免疫学的複合体を実際に形成できるような、二つのエピトープを有するホスホペプチドを画定することができた。加えて、本発明者らは、該ホスホペプチドが、サンドウィッチELISAにおいて、それらを認識するモノクローナル抗体との免疫学的複合体を形成できるような、二つのエピトープをともに画定することができた。

【0065】

用語「ペプチド」は、アミノ酸(aa)の重合体を意味し、特定の長さの生成物を意味しない。本発明の一実施態様では、該ホスホペプチドの長さは、15～100アミノ酸である。本発明の好適実施態様では、該ホスホペプチドは、20～50アミノ酸を含む。本発明のもう一つの好適実施態様では、該ホスホペプチドは、30～40アミノ酸を含む。

【0066】

本発明のペプチドは、Houbenweyl (1974)、およびAtherton & Shepard (1989) が記載したとおりの、古典的化学合成のような、当技術に公知のいかなる方法によっても、実施例の項に記載されたような、商業的に入手できるいかなる方法によっても、またはSambrookら (1989) が記載したような組換えDNA手法によっても生成することができる。

【0067】

ホスホペプチドは、少なくとも一つのアミノ酸にリン酸塩を有するペプチドである。本発明のホスホペプチドの使用は、本発明者らが、特定のホスホイソ型とのホスホペプチドの関係を決定し、特定のホスホ部位のリン酸化の程度を査定するのを可能にした（例1、1.5を参照されたい）。本発明のホスホペプチドの使用は、タウの特定の分子形態を標準化された方法で定量するのを可能にすることになる。

【0068】

リン酸化されたペプチドは、公知のいかなる方法によって製造することもできる。それらは、たとえば、ジ-tert-ブチルジイソプロピルジイソプロピルホスホアミダイトとの反応、および保護されていないセリンおよびトレオニン残基のtert-ブチルヒドロペルオキシドによる酸化によって、集成後に製造することができる。また、ペプチド合成の際に、リン酸化されたアミノ酸を組み込むことによって製造することもできる。最近では、集成後リン酸化なしにホスホペプチドを直接合成するための、新たなリン酸化セリン誘導体（N- α -Fmoc-O-ベンジルーL-ホスホセリン）が商業的に入手できる（Calbiochem-Novabiochem AG, San Diego, CA 92121）。

【0069】

好適実施態様では、本発明は、モノクローナル抗体HT7およびモノクローナル抗体AT270との免疫学的複合体を容易に形成するホスホペプチドであって、少なくとも、

【0070】

・HT7の最小エピトープ：PPGQK（配列番号1）；および

【0071】

・AT270の最小エピトープ：PPAPKT (p) P (配列番号2)
を含むホスホペプチドに関する。

【0072】

はるかに好適な実施態様では、本発明は、下記の配列：

【0073】

PRGAAPPQGKGQANATRIPAKTPPAPKT(p)PPSSGE (配列番号: 3)

【0074】

〔式中、「(p)」は、トレオニンがリン酸化されていることを意味する〕、
または依然としてHT7およびAT270モノクローナル抗体に結合する条件で
の変異配列を含む、上記のと通りのホスホペプチドに関する。用語「変異配列」
は、配列番号: 3で表されるペプチドの、一つまたはそれ以上のアミノ酸の置換
もしくは欠失による、HT7およびAT270モノクローナル抗体を依然として認
識する、いかなる変種もしくはフラグメントも意味する。この用語は、糖鎖形成
、アセチル化、リン酸化、脂肪酸などによる修飾のような、ペプチドの翻訳後修
飾を具体的に意味せず、かつ除外もしない。この定義に包含されるのは、たとえ
ば、アミノ酸の1種類またはそれ以上の類似体（非天然アミノ酸を包含する）を
含むペプチド、置換された連関を有するペプチド、突然変異させたその改作、シ
ステイン残基の間にジスルフィド結合を有するペプチド、ビオチニル化されたペ
プチドはもとより、当技術に公知のその他の修飾である。

【0075】

本発明は、さらに、該ホスホペプチドを、ホスホタウ(181)のレベルを測
定する方法に用いる用途に関する。

【0076】

本発明は、さらに、非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断の方
法に、該ホスホペプチドを用いる用途に関する。

【0077】

本発明は、さらに、アルツハイマー病を診断する方法に、該ホスホペプチドを
用いる用途に関する。

【0078】

本発明は、さらに、卒中と対比してのアルツハイマー病の鑑別診断の方法に、該ホスホペプチドを用いる用途に関する。

【0079】

個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率をin vitroで検出する方法は、該個体のタウオパチーに対する、薬物の試験もしくはスクリーニングに、治療上の追跡に、および／または一定の治療の効果を評価するのに用いることもできる。

【0080】

個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率の初期in vivo検出の方法は、該個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率を決定する工程と、それを、健康な対照個体におけるホスホタウ（181）／総タウの比率と比較する工程とを含む。一実施態様では、ホスホタウ（181）および総タウは、in vivo造影によって定量することができる。ホスホタウ（181）および総タウは、Arbitら（1995）、Tamadaら（1995）、Wakabayashiら（1995）、Huangら（1996）、Sandrockら（1996）、Marianiら（1997）が記載した脳造影法を包含するが、これらに限定されない、非侵襲的方法によって、in situで定量することができる。これらのin vivo造影法は、それぞれ特異的に、ホスホタウ（181）を認識するか、または総タウを認識する、標識化された抗体を用いることによって、ホスホタウ（181）および総タウの定位および定量を許し得る。

【0081】

ホスホタウ（181）および総タウは、該個体のタウオパチーに対する、薬物の試験もしくはスクリーニングに、治療上の追跡に、および／または一定の治療の効果を評価するためのin vivo造影用マーカーとして用いることもできる。

【0082】

本発明は、さらに、ホスホタウ（181）を特異的に認識する少なくとも1種類の抗体を含む、個体におけるタウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための診断キットに関する。

【0083】

もう一つの実施態様では、本発明は、上記のと通りの診断キットであって、少なくとも：

【0084】

- ・ホスホタウ（181）を特異的に認識する抗体と；

【0085】

- ・タウを認識する抗体と
- を含む診断キットに関する。

【0086】

もう一つの実施態様では、本発明は、本発明による少なくとも1種類のホスホペプチドを含む、上記のと通りの診断キットに関する。

【0087】

もう一つの実施態様では、本発明は、上記のと通りの診断キットであって、少なくとも：

【0088】

- ・ホスホタウ（181）を特異的に認識する抗体と；

【0089】

- ・本発明によるホスホペプチドと
- を含む診断キットに関する。

【0090】

もう一つの実施態様では、本発明は、上記のと通りの診断キットであって、少なくとも：

【0091】

- ・ホスホタウ（181）を特異的に認識する抗体と；

【0092】

- ・タウを認識する抗体と；

【0093】

- ・本発明によるホスホペプチドと
- を含む診断キットに関する。

【0094】

個体におけるタウオパチーを診断するのに好適なキットは、免疫アッセイに基づき、

【0095】

・ホスホタウ（181）のエピトープとの免疫学的複合体を形成する、モノクローナル抗体（一次抗体）と；

【0096】

・ホスホタウ（181）を特異的に認識するモノクローナル抗体（二次抗体）と；

【0097】

・該二次抗体による特異的タグ付け、またはそれとのカップリングのいずれかのためのマーカーと；

【0098】

・一次抗体と試験サンプル、二次抗体と試験サンプル、および／または結合した二次抗体とマーカーとの免疫学的反応を実施するのに適する緩衝液と；

【0099】

・本発明によるホスホペプチドとを含む。

【0100】

本発明は、タウオパチーの診断、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断のための請求項15～17のいずれか一項に記載の診断キットの使用に関する。

【0101】

本発明は、さらに、アルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および／または第17染色体関連パーキンソン病による前頭側頭痴呆の診断に用いるための上記の診断キットの使用に関する。

【0102】

本発明は、さらに、血管性痴呆、クロイツフェルトーヤコブ病、卒中、および／または白血病の患者における神経毒性と対比してのアルツハイマー病、ピック病、散発性前頭側頭痴呆、および／または第17染色体関連パーキンソン病によ

る前頭側頭痴呆の鑑別診断に用いるための上記の診断キットの使用に関する。

【0103】

本発明は、タウオパチーの診断用、および／または非タウオパチーと対比してのタウオパチーの鑑別診断用の診断キットの製造のための、神経学的マーカーとして用いるための総タウおよびホスホタウ（181）の使用にも関する。

【0104】

本発明は、タウオパチーに対する、薬物の試験もしくはスクリーニング、治療上の追跡、および／または一定の治療の有効性の決定に用いるための本発明のホスホペプチド、方法および／または診断キットの使用にも関する。

【0105】

本明細書、および付記されたクレームの全体を通じて、文脈から別途要求されない限り、単語「含む」、ならびに「含み」および「含んで」のような変化形は、記述された完全体もしくは工程、または記述された完全体もしくは工程の群の包含を意味するが、その他のいかなる完全体もしくは工程、または完全体もしくは工程の群の除外も意味しないと解されることになる。

【0106】

本明細書におけるいかなる先行技術の参照も、該先行技術が、オーストラリア国における常識的な一般的知識の一部を形成することの承認、またはそのいかなる形態の示唆でもなく、かつそれとしても解してはならない。

【0107】

ここで、本発明を、特に好都合な実施態様を説明する下記の実施例を参照して、例示する。しかし、これらの実施例は、例示的であり、いかなる方法でも本発明を限定するとして解することはできない。

【0108】

【実施例】

例1：標準化に用いるためのホスホペプチドの設計

1. 1：タウおよびタウ由来ペプチドの合成

2種類のPCRプライマー〔出発メチオニンコドンー

CATGGCTGAGCCCCGCCAGGAGTTCGAAGTGATGG（－1～34）（配列番号：4）

を含むプライマー、および停止コドン：

CCTGATCACAAACCTGCTTGGCCAGGGAGGC (配列番号: 5)

の周囲の逆プライマー] を用いて、ヒトのタウからの最小形態を P_L に基づく発現系 (Innogenetics, Gent、ベルギー国) 内に増幅した。PCR産物の配列は、配列決定によって確認した。変化は、コドン中の第三塩基対でのみ観察されたにすぎない：Pro182でCAAに代えてCAG、Ala227でGCAに代えてGCG、およびAsn251でAATに代えてAAC。アミノ酸配列に関するすべての番号付けは、最長のタウイソ型：hTau40を参照する [Goedert et al., 1989]。SacII部位 (アミノ酸第154～155位) およびPstI部位 (第242～243位) に充填することによるフレームシフト突然変異種の構成に基づいて、欠失突然変異種を作成した。

【0109】

自動化ペプチド合成は、Millipore 9050という合成装置で、通常は、N末端でビオチニル化されたペプチドとして、実施した。サンドウィッチELISAのためのペプチドAc-PRGAAPPQGKGQANATRIPAKTPPAPKT(p)PPSSGE-NH₂ (第154～187位) (配列番号: 3) の大規模合成は、自社で、Neosystems (Strasbourg、フランス国) によって合成した。品質管理は、RP-HPLC (逆相高圧液体クロマトグラフィー) (純度>99%)、質量分析計による分析 (平均MW=3,454.8)、およびアミノ酸分析 (正味ペプチド含量=84.3%) を含む。

【0110】

エピトープマッピングのために、誘導体化されたピン (Multiple Peptide Systems, San Diego, CA92121) または紙上で、手動でペプチドを合成した。紙上で合成されたペプチドについては、ジメチルアミノピリジンの存在下で、Fmoc-β-アラニンの対称無水物 (9-フルオレニルメトキシカルボニル-β-アラニン) を用いて、紙を誘導体化した。Fmoc基を除去した後、第二のβ-アラニン残基を、TBTU [=2-(1H-ベンゾトリアゾール-1-イル)-1,1',3,3'-テトラメチルウロニウムテトラフルオロボラート] による活性化後に加えた。次いで、ペプチドを、スポットとして手動で合成した。

【0111】

リン酸化されたペプチドは、ジ-tert-ブチルジイソプロピルジイソプロピルホスホロアミダイトとの集成後反応、および保護されていないセリンおよびトレオニン残基のtert-ブチルヒドロペルオキシドによる酸化によって製造した。最近では、集成後リン酸化なしにホスホペプチドを直接合成するための、新たなリン酸化セリン誘導体（N- α -Fmoc-O-ベンジル-L-ホスホセリン）が商業的に入手できる（Calbiochem-Novabiochem AG, San Diego, CA 92121）。固体の支持体から剥離した後に、逆相高性能液体クロマトグラフィー（RP-HPLC）によって、ペプチドおよびホスホペプチドを精製した。ペプチドの品質は、質量分析によって確認した。

【0112】

1. 2：免疫アッセイ

抗体の単離および特徴付けの詳細は、AT120 [Vandermeeren, et al., 1993b]、HT7 [Mercken et al., 1992]、BT2 [Vandermeeren, et al., 1993a] およびAT270 [Goedert et al., 1994] について記載されている。ペプチド-抗体相互作用を捕捉アッセイによって定量するために、ストレプトアビジン（Roche Diagnostics, Brussels、ベルギー国）を、50mM炭酸緩衝液、pH9.5中で5 μ g/mlで終夜被覆した。ブロックした後、ビオチニル化ペプチドを加え、タウ抗体によって検出した。セイヨウワサビペルオキシダーゼとカップリングさせた第二の抗体を用いて、免疫反応を定量した。

【0113】

INNOTESTホスホタウ（181P）の研究版を、下記のとおり設計した：HT7被覆免疫プレートを、サンプルまたは標準75 μ lとともに、同時にビオチニル化AT270とともに4 $^{\circ}$ Cで終夜温置した。洗浄後、セイヨウワサビペルオキシダーゼで標識化したストレプトアビジン（RDI, Flanders, NJ、米国）を30分間加えた。反応は、0.9NのH₂SO₄50 μ lの添加によって停止した。

【0114】

総タウは、INNOTEST hTau-Agを用いて測定し、標準として用いた組換えタウについての41,065の計算分子量を用いて、pg/mlをpMに変換した。

【0115】

1. 3: タウ抗体のマッピング

組換えタウを認識するタウ抗体を、完全なタウ分子上でマッピングするために、PstIおよびSacII部位に基づいて、欠失突然変異体を構築した。試験した抗体、すなわちHT7、AT120、BT2およびタウ1は、すべて、プロリンに富む領域に位置する(hTau40上で第154~242位、データは示さず)。エピトープをさらに明確にするために、小さい重複ペプチドを合成した。第一工程では、8個のアミノ酸が重複する、9アミノ酸長の48のペプチドを、ピン上に合成した。配列は、155~208位にわたった。AT120、HT7、BT2およびタウ1を試験した。5種類の抗体中4種類をマッピングすることができ、HT7の最小エピトープは、PPGQK(第159~163位)(配列番号:1)であったが、BT2およびタウ1の反応性は、識別不能であった:DRSGYS(第193~198位)(配列番号:6)(図1a)。AT120は、これらのペプチド上でマッピングできなかったため、第206~232位からの配列を網羅する、新たな1セットのペプチドを紙上に合成した。12アミノ酸長の、11アミノ酸と重複する合計16のペプチドが、この領域を網羅するのに必要とされた。AT120の最小エピトープは、配列PPTREPK(第218~224位)(配列番号:7)(図1b)によって規定される。

【0116】

1. 4: AT270の特異性

ホスホ依存性抗体であるAT270の特異性を、タウの22のリン酸化部位を網羅する合成ホスホペプチドに対して確認した。これらのペプチドの配列を、表1に要約する。これらの部位のうち12個所に対応する非リン酸化ペプチドを、並行して分析した(図2)。AT270のみが、ホスホ-Thr181および/またはホスホ-Thr175を含むホスホペプチドと反応した。これらのペプチドを、捕捉アッセーで滴定し終えたとき、AT270は、ホスホ-Thr181のそれと比較して、ホスホ-Thr175を含むペプチドとモルベースで18倍、反応性が乏しかった(結果は示さず)。最後に、第166~196位の領域を網羅する、15アミノ酸長のビオチニル化リン酸化ペプチドを用いて、最小エピトープを画定した。免疫反応性ペプチドを図1cに示し、AT270の最小エピトープは

、PPAPKT (p) P (第176～182位) (配列番号:2) であった。

【0117】

1. 5: ホスホペプチドの設計、およびリン酸化の程度の決定

このペプチドの情報を用いて、第154～187位を網羅するホスホペプチドを合成した。この配列は、HT7 (第159～163位) およびAT270 (第176～182位) のエピトープ、ならびにHT7エピトープに対するN末端、およびAT270に対するC末端の追加の5アミノ酸を網羅する。このホスホペプチドの正確な濃度を、アミノ酸分析を用いて決定した [Blennow et al., 1995]。この濃度に基づくと、ペルオキシダーゼに基づくELISAの測定範囲は、精密プロファイリングを用いて5～300pMであった。アッセー内およびアッセー間の変動係数は、10%未満であった。

【0118】

どのようにリン酸化の程度がホスホタウ (181) および総タウの絶対レベルに関連するかを決定するために、異なる5種類のPHF-タウプレパラートを、それぞれのアッセーで同時に定量した。PHF-タウは、Goedertら (1992) に従い、PHF-タウを脳抽出物上清から選択的に沈降させるために1%N-ラウロイルサルコシナートを用いて、調製した。AD患者の側頭皮質 (PHF-A～D) または海馬 (PHF-E) からの組織を、Born-Bunge脳バンク (Dr. P. Craas, Antwerp、ベルギー国) から入手した。

【0119】

図3に示したとおり、ホスホ-Thr181のリン酸化の程度は、PHF-タウプレパラート間で異なった。最高のホスホタウレベルを有するPHF-タウプレパラートが、100%に近いリン酸化の程度を有すると仮定すると、ホスホタウ (181) /総タウ比は、リン酸化の程度の少なくとも3.3倍の過大評価となる。にもかかわらず、ホスホタウ (181) /総タウの比率が、リン酸化の程度を過大評価することを斟酌すると、CSF-タウからのタウ中のThr181のリン酸化の状態は、多くとも $59 \pm 18\%$ ($1.952/3.3$) であって、正常な条件下での脳由来タウについてのThr181のリン酸化状態 [20～30%; Watanabe et al., 1993; Matsuo et al., 1994] と密接に一致する。

【0120】

例2：アルツハイマー病、前頭側頭痴呆および／または血管性痴呆の患者でホスホタウ（181）を決定するアッセーにおける、標準化のためのホスホペプチドの使用

2. 1：患者

研究に含めたのは、FTDの患者18名（年齢範囲：48～77歳）、ADの患者60名（年齢範囲：可能性がある68～88歳、蓋然性があるのは58～90歳）、皮質下動脈硬化性脳症の患者17名（SAE：血管性痴呆の推定される一形態）（年齢範囲：67～84歳）、PDの患者15名（年齢範囲：59～82歳）、および対照17名（年齢範囲：68～80歳）であった。彼らの特徴を、表2に要約する。

【0121】

研究に含まれた患者は、すべて、FTD、AD、SAE、PDの臨床的診断を受けさせ、痴呆またはPDの患者についての予測的長期研究から、連続的に補充した。臨床的診断を確定し、CSFのサンプリングを実施した。次いで、Institute of Clinical Neuroscience, Sahlgrenska University Hospital, Moelndal、スウェーデン国で神経化学的分析を実施した。精神的疾患の診断および統計マニュアル〔Association AP, 1987〕または生化学的基準に従って、特定されない痴呆（たとえば混合痴呆）、重い精神医学的疾患（たとえば精神分裂病）の病歴、慢性アルコール中毒、明確な非退行性神経学的疾患（たとえば正常圧水頭症）、重い頭部損傷の病歴、重いCNS内感染、全身性疾病（たとえば悪性腫瘍）、および痴呆の二次的原因（たとえば甲状腺機能低下症）を有する患者は、除外した。大規模な脳梗塞および／または多数の空隙を有する患者も除外した。含まれた患者は、すべて、病歴、身体的、神経学的および精神医学的検査、血液のスクリーニング検査室用試験（痴呆のその他の原因、たとえば甲状腺機能低下症を除外するのに妥当な検査室用試験）CSFの定型的分析（たとえば細胞学）、ECG、胸部X線、EEG、脳のコンピュータ化断層撮影（CT）または磁気共鳴造影（MRI）、単一光子放射コンピュータ化断層撮影（SPECT）または¹³³キセノン吸入手法〔Cortexplorer; Risberg & Gustafson, 1983〕を用いた局所

的脳血流（C B F）の調査を包含する、臨床的調査を受けた。

【0122】

F T Dは、前記のとおり〔Sjoegren et al., 1997〕、Lund/Manchester基準〔Brun et al., 1994〕に従って診断した。F T D患者は、いずれも、梗塞の徴候が皆無であり、数人のF T D患者に白質の軽い変化が見出されたにすぎない。

【0123】

「蓋然的AD」の診断は、N I N C D S－A D R D Aの基準〔McKhann et al., 1984〕に従って、除外によってなされた。AD患者を、N I N C D S－A D R D Aの基準によって定義されるとおり、蓋然ADの1群、および可能ADの1群に区分した。

【0124】

S A Eについての診断基準は、下記のすべてであった：（a）精神的劣化（主として、非狭窄一情動疾患、および前頭認識機能不全；（b）歩行障害（運動失調および／または運動機能不全）；（c）病巣性の神経学的徴候；（d）高血圧および糖尿病のような血管性危険因子、または全身性血管病の存在；（e）MR IまたはC Tでの、二側散在性の皮質下－傍室深白質変化（> 2 mm）、小窩性梗塞、拡大した心室系、および1個所を越える皮質梗塞の不在。基準は、他の研究者〔Bennett et al., 1990〕が示唆したものと矛盾しなかった。S A E患者のうち15名は、皮質梗塞が皆無であり；残余の4名は、1個所の皮質梗塞があった。

【0125】

P Dの診断は、LangstronおよびKoller〔1991a, b〕による勧告に従ってなされた。P D患者は、すべて、運動緩慢、硬直および静止時振戦という三つの特徴のうち少なくとも二つを示し、すべてのP D患者が、L－ドーパ投与に応答性であった。痴呆の何らかの徴候を示したP D患者は、皆無であり、すべて、27以上のミニ精神状態検査（M M S E）〔Folstein et al., 1975〕の評点を有した。

【0126】

臨床診断は、すべて、生化学的分析の結果を知らない内科医が実施し、その逆

もなされた。患者のうち、その時点で痴呆を（たとえばコリンエステラーゼ阻害剤によって）治療していたものは皆無であった。

【0127】

痴呆を有する患者では、MMSE [Folstein et al., 1997] を用いて、痴呆の程度を評価した。

【0128】

正常な対照、およびPDの患者は、潜在的マーカーの感度および特異性の分析に含めた。

【0129】

対照群は、精神医学的または神経学的疾患、悪性疾患または全身性障害（たとえばリウマチ様関節炎、伝染病）の病歴、症状もしくは徴候のない個体からなった。MMSEを用いて、その認識状態を評価し、28未満の評点のものは、除外した。

【0130】

Goeteborg、Lund/MalmoeおよびLinköping大学（スウェーデン国）の倫理委員会が、研究を承認した。患者（またはその最近縁の親類）および対照は、すべて、ヘルシンキ宣言の条項に従って実施される研究に参加するための、告知された同意を与えた。

【0131】

2. 2 : CSF分析

すべての患者および対照に対して、腰椎穿刺をL3/L4またはL4/L5間空で実施した。最初のCSF 12mlを、ポリプロピレン管に捕集し、静かに混合して、勾配効果 [Blennow et al., 1993] を回避した。同時に、血清サンプルを採取した。1 μ lあたり500を越える赤血球を有するCSFは、すべて、排除した。CSFおよび血清サンプルを、2,000 x gで10分間遠心分離して、細胞その他の不溶性物質を除去した。次いで、アリコートをし、生化学分析まで-80°Cで貯蔵した。

【0132】

血清およびCSFアルブミンの定量的決定を、比濁分析によって、Behring Ne

phelometer Analyzer (Behringwerke AG, Marburg, ドイツ国) を用いて実施した。CSF／血清アルブミン比 [Tibbling et al., 1977] を、[CSFアルブミン (mg/L) ／血清アルブミン (g/L)] として算出し、血液脳関門 (BBB) 機能の尺度として用いた。

【0133】

CSF-タウを、以前に詳述した [Vandermeeren, et al., 1993b; Blennow et al., 1995] とおり、総タウ (正常タウおよびPHF-タウの双方) を測定するよう構成した、サンドウィッチELISA (INNOTEST hTau-Ag: Innogenetics, Gent、ベルギー国) を用いて決定した。

【0134】

ホスホタウ (181) のレベルを、上記のとおり、INNOTESTホスホタウ (181P) によって決定した。

【0135】

2. 3: 統計的解析

すべての変数は、正規分布し、そのため、影響変数 (CSF-タウおよびCSF-ホスホタウ) に関する群比較には、パラメトリック統計学を用いた。完全要因多重分散分析を、それぞれ、従属変数としてCSF-タウおよびCSF-ホスホタウを、共変量として年齢、持続期間、および痴呆の重篤度を、因子として診断カテゴリー (蓋然および可能AD、FTD、PD、SAE、および正常な加齢) を用いて実施した。変動に寄与しない因子は、解析から除外し、再演算を実施した。事後比較は、不等nについてのターキーの事後検定を用いて実施した。

【0136】

平均年齢は、可能ADと比較したPD ($p < 0.001$) および蓋然AD ($p < 0.05$) で有意に低かった。蓋然ADの患者は、可能ADの患者より有意に痴呆性であった ($p < 0.05$)。CSF／血清アルブミン比 (痴呆群についてのみ) および性別に関しては、いかなる患者群または対照群間にも差が見出されなかった (表2)。

【0137】

2. 4: 痴呆、パーキンソン病、および正常な加齢におけるCSF-総タウおよ

びCSF-ホスホタウ(181)

CSF-タウは、蓋然ADおよび可能ADで、FTD ($p < 0.001$)、PD ($p < 0.001$)、SAE ($p < 0.001$) および対照 ($p < 0.001$) と比較して、またFTDで、SAE ($p < 0.01$) と比較して有意に増加した(表3; 図4)。

【0138】

CSF-ホスホタウ(181)は、蓋然ADで、FTD ($p < 0.001$)、PD ($p < 0.001$)、SAE ($p < 0.001$) および対照 ($p < 0.0079$) と比較して、また可能ADで、FTD ($p < 0.001$) およびSAE ($p < 0.001$) と比較して有意に増加したが、対照と比較して増加しなかった。さらに、CSF-ホスホタウ(181)は、対照と比較して、FTD ($p < 0.0001$) およびSAE ($p < 0.0001$) でも有意に減少した(表3; 図5)。

【0139】

CSF-タウおよびCSF-ホスホタウ(181)を、それぞれ、すべての診断群で相関させた(蓋然および可能AD: $r = 0.86$ 、 $p < 0.001$; FTD: $r = 0.66$ 、 $p < 0.01$; SAE: $r = 0.58$ 、 $p < 0.05$; PD: $r = 0.62$ 、 $p < 0.05$; 対照: $r = 0.65$ 、 $p < 0.01$; 図6)。

【0140】

CSF-ホスホタウ(181)/CSF-総タウ比を算出し、蓋然AD ($p < 0.001$; 1.16 ± 0.24)、可能AD ($p < 0.001$; 1.10 ± 0.20) およびFTD ($p < 0.001$; 0.88 ± 0.34) で、対照(全3群について $p < 0.001$; 1.95 ± 0.60)、PD(全3群について $p < 0.001$; 1.92 ± 0.42) およびSAE(全3群について $p < 0.001$; 1.96 ± 1.08) と比較して、有意に減少していることが見出された。

【0141】

例3: 急性虚血性卒中の患者と比較してのアルツハイマー病の患者におけるCSF-ホスホタウ(181)およびCSF-総タウレベルの決定

3.1: 患者

C S F-総タウおよびC S F-ホスホタウ（181）を、急性虚血性の患者22名（男子16名、女子6名、平均年齢 $\pm$ SD：65.7 $\pm$ 9.2歳）からの長期的C S Fサンプルで検査した。患者は、すべて、以前に記載されたとおり〔Tarkowski et al., 1999〕、標準化された方法で評価した。可能なときは、C S Fサンプルを、5回の機会に捕集した：入来から0～1日（n=9）、2～3日（n=18）、7～9日（n=22）、3週（n=21）、および3～5ヶ月（n=21）。

【0142】

また、蓋然ADの患者54名（男子25名、女子29名、平均年齢 $\pm$ SD：73.3 $\pm$ 7.4歳）、および健康な対照17名（男子4名、女子13名、平均年齢 $\pm$ SD：68.6 $\pm$ 7.5歳）を調べた。平均年齢は、対照群よりADで有意に（ $p < 0.05$ ）に高かった。「蓋然AD」の診断は、NINCDS-ADRDAの基準〔McKhann et al., 1984〕に従って、除外によって下した。臨床的评价および診断手順は、別途詳述されている〔Andreasen et al., 1998, 1999〕。痴呆の程度は、MMSE〔Folstein, 1975〕を用いて評価し、AD群で23.8 $\pm$ 4.4であった。対照群は、精神医学的または神経学的疾患、悪性疾患または全身性障害の病歴、症状もしくは徴候のない個体からなった。28未満のMMSE評点の個体は、除外した。臨床診断は、すべて、生化学的分析の結果を知らずに実施され、その逆もなされた。

【0143】

卒中の患者を、発作の約1ヶ月後に、以前に詳述されたとおり〔Tarkowski et al., 1999〕、コンピュータ化断層撮影（CT）および磁気共鳴造影（MRI）によって検査した。大きさ（cm²で表す）をCTによって、また体積（mlで表す）をMRTによって決定した。

【0144】

3またはそれ以上の群間の比較には、Kruskal-Wallis試験を、また有意ならば、2群間の比較にMann-WhitneyのU検定を用いた。補正には、Spearman相関係数を用いた。

【0145】

GoeteborgおよびUmea大学の倫理委員会が、研究を承認した。患者（またはその最近縁の親類）および対照は、すべて、ヘルシンキ宣言の条項に従って実施される研究に参加するための、告知された同意を与えた。

【0146】

3. 2 : C S F 分析

腰椎穿刺をL3/L4またはL4/L5間空で実施した。最初のC S F 1.2 mlを、ポリプロピレン管に捕集し、静かに混合して、場合による勾配効果を回避した〔Blennow, 1993〕。1 μ lあたり500を越える赤血球を有する、C S Fサンプルを排除した。C S Fサンプルを、2,000 x gで10分間遠心分離して、細胞その他の不溶性物質を除去し、次いで、生化学分析まで-80°Cで貯蔵した。

【0147】

C S F-タウのレベルを、以前に詳述した〔Vandermeeren, et al., 1993b; Blennow et al., 1995〕とおり、総タウ（正常タウおよびP H F-タウの双方）を測定するよう構成した、サンドウィッチE L I S A（INNOTEST hTau-Ag: Innogenetics, Gent、ベルギー国）を用いて決定した。C S F-ホスホタウ（181）のレベルを、上記のとおり、INNOTESTホスホタウ（181 P）によって決定した。

【0148】

3. 3 : アルツハイマー病の患者、および卒中の患者におけるC S F-ホスホタウ（181）およびC S F-総タウ

卒中患者では、C S F-総タウは、急性発作の2~3日後に（24.4 $\pm$ 7.4 pM; $p=0.002$ ）、0~1日（平均年齢 $\pm$ S D : 5.4 $\pm$ 1.2 pM）と比較して顕著な増加を示し、7~9日（24.1 $\pm$ 4.3 pM; $p<0.0001$ ）、および3週間後（25.0 $\pm$ 4.1 pM; $p<0.0001$ ）には上昇したままであり、次いで、3~5ヶ月後（8.5 $\pm$ 1.2 pM; $p=0.35$ ）に正常レベルに復帰した（図8）。基線で採取したC S Fサンプルによる患者9名についての、C S F-総タウについての個々の値を図9に示す。

【0149】

対照的に、CSF-ホスホタウ(181)では、基線(平均 $\pm$ SEM: 9.1 $\pm$ 3.1 pM)と、2~3日(10.9 $\pm$ 1.0 pM)、7~9日(13.0 $\pm$ 2.1 pM)、3週間(11.5 $\pm$ 2.0 pM)または3~5ヶ月(10.6 $\pm$ 2.0 pM)との間に有意差はなかった(図8)。基線で採取したCSFサンプルによる患者9名についての、CSF-ホスホタウ(181)についての個々の値を図9に示す。

【0150】

CSF-総タウは、蓋然AD(平均 $\pm$ SD: 14.4 $\pm$ 5.5 pM)では、対照(8.3 $\pm$ 2.8 pM) ($p < 0.0001$)と比較して有意に増加した。CSF-ホスホタウ(181)も、蓋然AD(20.5 $\pm$ 6.5 pM)では、対照(15.9 $\pm$ 5.7 pM) ($p < 0.05$)と比較して有意に増加した。

【0151】

CSF-総タウおよびCSF-ホスホタウ(181)には、AD群($r = 0.93$, $p < 0.0001$)および対照群($r = 0.72$, $p < 0.01$)で正の相関関係がある(図10)。卒中群では、この相関関係は、0~1日($r = 0.63$, $p < 0.001$)および3ヶ月後($r = 0.80$)の方が、2~3日($r = 0.54$)、7~9日($r = 0.58$)、特に3週間後($r = 0.15$)より強かった。

【0152】

図10から、アルツハイマー病患者についてのCSF-ホスホタウ(181)/CSF-総タウの比率の間には、卒中患者と比較して差があることは、明らかである。アルツハイマー病患者($y = 0.82 \pm 4.39$, $r = 0.90$, $p < 0.0001$)、および卒中患者($y = 0.17 \pm 8.09$, $r = 0.415$, $p < 0.0001$)から得られた値についての回帰分析は、有意な差($p < 0.001$)を示した。

【0153】

CTによって測定した限りでの梗塞の大きさと、CSF-総タウの最高レベルとの間には、正の相関関係があった($r = 0.72$; $p < 0.01$)が、CSF-ホスホタウ(181)との相関は、有意ではなかった($r = 0.349$)。M

R I によって測定した限りでの梗塞の体積と、CSF—総タウの最大値と間にも、正の相関関係があった ($r=0.66$; $p<0.05$) が、CSF—ホスホタウ (181) との相関関係は、有意ではなかった ($r=0.59$)。

【0154】

【表4】

参考文献

Andreadis A., Brown W. and Kosik K. (1992) Structure and novel exons of the human tau gene. *Biochem.* 31: 10626-10633.

Andreasen N., Vanmechelen E., Van de Voorde A., Davidsson P., Hesse C., Tarvonen S., R  ih   I., Sourander L., Winblad B., Blennow K. (1998) Cerebrospinal fluid tau protein as a biochemical marker for Alzheimer's disease: a community-based follow-up study. *J Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 64: 298-305.

Andreasen N., Minthon L., Clarberg A., Davidsson P., Gottfries J., Vanmechelen E., Vanderstichele H., Winblad B., Blennow K. (1999) Sensitivity, specificity and stability of CSF-tau in AD in a community-based patient sample. *Neurology* 53: 1488-1494.

Arbit E., Cheung N.K., Yeh S.D., Daghighian F., Shang J.J., Cordon-Cardo C., Pentlow K., Canete A., Finn R. and Larson S.M. (1995) Quantitative studies of monoclonal antibody targeting to disialogangliosid GD2 in human brain tumors. *Eur. J. Nucl. Med.* 22: 419-426.

Association AP (1987) *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd ed. (revised). Cambridge University Press, Washington DC., US.

Atherton and Shepard (1989) *Solid phase peptide synthesis*. IRL Press, Oxford, UK.

Bennett D.A., Wilson R.S., Gilley D.W. and Fox J.H. (1990) Clinical diagnosis of Binswanger's disease. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 53: 961-965.

Binder L.I., Frankfurter A. and Rebhun L.I. (1985) The distribution of tau in the mammalian central nervous system. *J. Cell Biol.* 101: 1371-1378.

Blennow K., Fredman P., Wallin A., Gottfries C.-G., Langstrom L. and Svennerholm L. (1993) Protein analysis in cerebrospinal fluid. I. Influence of concentration

gradients for proteins on cerebrospinal fluid/serum albumin ratio. *European Neurology* 33: 126-128.

Blennow K., Wallin A., Agren H., Spenger C., Siegfried J. and Vanmechelen E. (1995) Tau protein in cerebrospinal fluid: a biochemical marker for axonal degeneration in Alzheimer disease? *Mol. Chem. Neuropathol.* 26: 231-245.

Bramblett G., Trojanowski J. and Lee V. (1992) Regions with abundant neurofibrillary pathology in human brain exhibit a selective reduction in levels of binding-competent tau and accumulation of abnormal tau isoforms (A68 proteins). *Lab. Invest.* 66: 212-222.

Bramblett G., Goedert M., Jakes R., Merrick S., Trojanowski J. and Lee V. (1993) The abnormal phosphorylation of tau at Ser396 in Alzheimer's disease recapitulates phosphorylation during development and contributes to reduced microtubule binding. *Neuron*. 10: 1089-1099.

Brion J., Passareiro J., Nunez J. and Flament-Durand J. (1985) Mise en evidence immunologique de la proteine tau au niveau des lesions de degenerescence neurofibrillaire de la maladie d'Alzheimer. *Arch. Biol.* 95: 229-235.

Brun A. (1987) Frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type. I. Neuropathology. *Arch. Gerontol. Geriatr.* 6: 193-208.

Brun A. (1993) Frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type revisited. *Dementia* 4: 126-131.

Brun A., Englund B., Gustafsson L., Passant U., Mann D.M.A., Neary D. and Snowden J.S. (1994) Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. *J. Neurol., Neurosurgery and Psych.* 57: 416-418.

Buee L., Delacourte A. (1999) Comparative biochemistry of tau in progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, FTDP-17 and Pick's disease. *Brain Pathol.* 9: 681-693.

Delacourte A. and Défossez A. (1986) Alzheimer's disease: Tau proteins, the promoting factors of microtubule assembly, are major components of paired helical filaments. *J. Neurol. Sci.* 76: 173-180.

Delacourte A., Flament S., Dibe E., Hublau P., Sablonniere B., Hemon B., Sherrer V. and Defossez A. (1990) Pathological proteins Tau64 and 69 are specifically expressed in the somatodendritic domain of the degenerating cortical neurons during Alzheimer's disease. *Acta Neuropathol.* 80: 111-117.

Delacourte A., Buée L. and Vermersch P. (1996) Immunocytochemistry in frontotemporal dementia. In: Pasquier F., Lebert F., Scheltens P. (eds.) *Frontotemporal dementia*. ICG Publications, Dordrecht, The Netherlands. pp. 115-124.

DeLays R., Hendrickx G., Dekeyser P., Demol H., Raymakers J., Brasseur R., Borremans F., Vanmechelen E. and Van de Voorde A. (1996) Mapping and sequence requirements of the phosphorylation-sensitive epitopes recognized by the monoclonal antibodies Tau1, BT2, and AT8. In: Schneider C.H. (ed.) *Peptides in Immunology*. John Wiley & Sons, New York, NY, US. pp. 239-244.

Ebly E.M., Parhad I.M., Hogan D.B. and Fung T.S. (1994) Prevalence and types of dementia in the very old: results from the Canadian Study of Health and Aging. *Neurology* 44: 1593-1600.

Flament S. and Delacourte A. (1990) Tau Marker? *Nature* 346: 6279.

Folstein M., Folstein S. and Mc Hugh P. (1975) "Mini-mental State" A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J. Psychol. Res.* 12: 189-198.

Ghanbari H., Kozuk T., Miller B. and Riesing S. (1990) A sandwich enzyme immunoassay for detecting and measuring Alzheimer's disease-associated proteins in human brain tissue. *J. Clin. Laboratory Anal.* 4: 189-192.

Goedert M., Spillantini M.G., Jakes R., Rutherford D. and Crowther R.A. (1989) Multiple isoforms of human microtubule-associated protein tau: sequences and localization in neurofibrillary tangles of Alzheimer's disease. *Neuron* 3: 519-526.

Goedert M., Spillantini M.G., Cairns N.J. and Crowther R.A. (1992) Tau proteins of Alzheimer paired helical filaments: abnormal phosphorylation of all six brain isoforms. *Neuron* 8: 159-168.

Goedert M., Jakes R., Crowther R., Six J., Lübke U., Vandermeeren M., Cras P., Trojanowski J.Q. and Lee V. (1993) The abnormal phosphorylation of tau protein at serine 202 in Alzheimer's disease recapitulates phosphorylation during development. *Proc. Natl. Acad. Sci. (USA)* 90: 5066-5070.

Goedert M., Jakes R., Crowther R.A., Cohen P., Vanmechelen E., Vandermeeren M. and Cras P. (1994) Epitope mapping of monoclonal antibodies to the paired helical filaments of Alzheimer's disease: identification of phosphorylation sites in tau protein. *Biochem. J.* 301: 871-877.

Goedert M., Crowther R.A., Spillantini M.G. (1998) Tau mutations cause frontotemporal dementias. *Neuron* 21: 955-958.

Greenberg S. and Davies P. (1990) A preparation of Alzheimer paired helical filaments that displays distinct tau proteins by polyacrylamide gel electrophoresis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 87: 5827-5831.

Grundke-Iqbal I., Iqbal K., Tung Y., Quinlan M., Wisniewski H. and Binder L. (1986) Abnormal phosphorylation of the microtubule-associated protein (tau) in Alzheimer's cytoskeletal pathology. *Proc. Natl. Acad. Sci. (USA)* 83: 4913-4917.

Gustafson L. (1993) Clinical picture of frontal lobe degeneration of non-Alzheimer type. *Dementia* 4: 143-148.

Hanger D.P., Betts J.C., Loviny T.L., Blackstock W.P., Anderton B.H. (1998) New phosphorylation sites identified in hyperphosphorylated tau (paired helical filament-

tau) from Alzheimer's disease brain using nanoelectrospray mass spectrometry. J. Neurochem. 71: 2465-2476.

Hasegawa M., Morishima-Kawashima M., Takio K., Suzuki M., Titani K. and Ihara Y. (1992) Protein sequence and mass spectrometric analyses of tau in Alzheimer's disease brain. J. Biol. Chem 267: 17047-17054.

Himmler A. (1989) Structure of the bovine tau gene: alternatively spliced transcripts. Mol. Cell Biol. 9(4): 1389-96.

Houbenwycyl (1974) Method of organic chemistry. Vol. 15-I et II. Eds. E Wunch, Thieme, Stuttgart, Germany.

Huang Q., He G., Lan Q., Li X., Qian Z. Chen J. Lu Z. and Du Z. (1996) Target imaging diagnosis of human brain glioma. Clinical analysis of 40 cases. Nucl. Med. Commun. 17: 311-316.

Iqbal K., Grundke-Iqbal I., Smith A., George L., Tung Y. and Zaidi T. (1989) Identification and localisation of a Tau peptide to paired helical filaments of Alzheimer's disease. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 86: 5646-5650.

Kondo J., Honda T., Mori H., Hamada Y., Miura R., Ogawara M. and Ihara Y. (1988) The carboxyl third of tau is tightly bound to paired helical filaments. Neuron 1: 827-834.

Kosik K.S., Joachim C.L. and Selkoe D.J. (1986) Microtubule-associated protein tau is a major antigenic component of paired helical filaments in Alzheimer's disease. Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 83: 4044-4048.

Ksiezak-Reding H., Liu W.K. and Yen S.H. (1992) Phosphate analysis and dephosphorylation of modified tau associated with paired helical filaments. Brain Res. 597: 209-219.

- Langston J.W. and Koller W.C. (1991a) Preclinical detection of Parkinson's disease. The next frontier: presymptomatic detection. Introduction. *Geriatrics* 46 Suppl. 1: 5-7.
- Langston J.W. and Koller W.C. (1991b) The next frontier in Parkinson's disease: presymptomatic detection. *Neurology* 41: 5-7.
- Lee V., Balin B., Otvos L. and Trojanowski J. (1991) A68: a major subunit of paired helical filaments and derivatized forms of normal tau. *Science* 251(4994): 675-8.
- Lewis S., Wang D. and Cowan N. (1988) Microtubule-associated protein MAP2 shares a microtubule binding motif with Tau protein. *Science* 242: 936-939.
- Mann D., McDonagh A., Snowden J., Neary D. and Pickering-Brown S. (2000) Molecular classification of the dementias. *The Lancet* 355: 626.
- Matsuo E.S., Shin R.W., Billingsley M.L., Van de Voorde A., O'Connor M., Trojanowski J.Q. and Lee V.M. (1994) Biopsy-derived adult human brain tau is phosphorylated at many of the same sites as Alzheimer's disease paired helical filament tau. *Neuron* 13: 989-1002.
- McKhann G., Drachman D., Folstein M., Katzman R., Price D., Stadlan E.M. (1984) Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report on the NINCDS-ADRDA Work group under the auspices of department of health and human services task force on Alzheimer's disease. *Neurology* 34: 939-944.
- Mercken M., Vandermeersen M., Lübke U., Six J., Boons J., Vanmechelen E., Van de Voorde A. and Gheuens J. (1992) Affinity purification of human tau proteins and the construction of a sensitive sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for human tau detection. *J. Neurochem.* 58: 548-553.
- Risberg J. and Gustafson L. (1983) ^{133}Xe cerebral blood flow in dementia and in neuropsychiatry research. In: Magistretti P.L. (ed.) *Functional Radionuclide Imaging of the brain*. Raven Press, New York, NY, US. Pp. 151-159.

- Sambrook J., Fritsch E., Maniatis T. (1989) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 2nd Edition, Cold Spring Harbour Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, USA.
- Sandrock D., Verheggen R., Helwig A.T., Munz D.L., Markakis E. and Emrich D. (1996) Immunoscintigraphy for the detection of brain abscesses. *Nucl. Med. Commun.* 17: 311-316.
- Selden S. and Pollard T. (1983) Phosphorylation of microtubule-associated proteins regulates their interaction with actin filaments. *J. Biol. Chem.* 258(11): 7064-71.
- Sjögren M., Edman A. and Wallin A. (1997) Symptomatology characteristics distinguish between frontotemporal dementia and vascular dementia with a dominating frontal lobe syndrome. *Int. J. Geriatric Psychiatry* 12: 656-661.
- Spillantini M.G. and Goedert M. (1998) Tau protein pathology in neurodegenerative diseases. *Trends Neurosci.* 21: 428-433.
- Tamada K., Fujinaga S., Watanabe R., Yamashita R., Takeuchi Y. and Osano M. (1995) Specific deposition of passively transferred monoclonal antibodies against herpes simplex virus type 1 in rat brain infected with the virus. *Microbiol-Immunol.* 39: 861-871.
- Tarkowski E., Rosengren L., Blomstrand C., Jensen C., Ekholm S. and Tarkowski A. (1999) Intrathecal expression of proteins regulating apoptosis in acute stroke. *Stroke* 30: 321-327.
- Tibblin G., Link H. and Ohman S. (1977) Principles of albumin and IgG analyses in neurological disorders. I. Establishment of reference values. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 37: 385-390.
- Tomlinson B.E. and Corsellis J.A.N. (1984) Ageing and the dementias. *In*: Hume Adams J., Corsellis J.A.N., Duchen L.W. (eds.) *Greenfield's neuropathology*. Edward Arnold, London, UK. pp. 951-1025.

Vandermeeren M., Lübke U., Six J. and Cras P. (1993a) The phosphatase inhibitor okadaic acid induces a phosphorylated paired helical filament tau epitope in human LA-N-5 neuroblastoma cells. *Neurosci. Lett.* 153: 57-60.

Vandermeeren M., Mercken M., Vanmechelen E., Six J., Van de Voorde A., Martin J.J. and Cras P. (1993b) Detection of tau proteins in normal and Alzheimer's disease cerebrospinal fluid with a sensitive sandwich enzyme-linked immunosorbent assay. *J. Neurochem.* 61: 1828-1834.

Vermersch P., Bordet R., Ledoze F., Ruchoux M.M., Chapon F., Thomas P., Destee A., Lechevallier B. and Delacourte A. (1995) C R Demonstration of a specific profile of pathological Tau proteins in frontotemporal dementia cases. *Acad. Sci.* 318: 439-445.

Wakabayashi T., Yoshida J., Okada H., Sugita K., Itoh K., Tadokoro M. and Ohshima M. (1995) Radioimaging of human glioma by indium-111 labelled G-22 anti-glioma monoclonal antibody. *Noshuyo-Byori* 12: 105-110.

Watanabe A., Hasegawa M., Suzuki M., Takio K., Morishima-Kawashima M., Titani, K., Arai T., Kosik K.S. and Ihara Y. (1993) In vivo phosphorylation sites in fetal and adult rat tau. *J. Biol. Chem.* 268: 25712-25717.

Wood J., Mirra S., Pollock N. and Binder L. (1986) Neurofibrillary tangles of Alzheimer's disease share antigenic determinants with the axonal microtubule-associated protein tau. *Proc. Natl. Acad. Sci. (USA)* 83: 4040-4043.

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> INNOGENETICS N.V.

<120> Diagnosis of Tauopathies

<130> PCT.112.T181

<140>

<141>

<150> 00870008.8

<151> 2000-01-24

<150> 00870280.5

<151> 2000-11-22

<150> 60/178,391

<151> 2000-01-27

<160> 54

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 5

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Pro Pro Gly Gln Lys

1 5

<210> 2

<211> 7

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (6)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 2

Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro

1 5

<210> 3
 <211> 34
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (28)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 3
 Pro Arg Gly Ala Ala Pro Pro Gly Gln Lys Gly Gln Ala Asn Ala Thr
 1 5 10 15
 Arg Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser
 20 25 30
 Gly Glu

<210> 4
 <211> 35
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 4
 catggctgag ccccgccagg agttcgaagt gatgg 35

<210> 5
 <211> 32
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 5
 cctgatcaca aaccctgctt ggccagggag gc 32

<210> 6
 <211> 6
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 6

Asp Arg Ser Gly Tyr Ser

1 5

<210> 7

<211> 7

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 7

Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys

1 5

<210> 8

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 8

Lys Gly Ala Asp Gly Lys Thr Lys Ile Ala Thr Pro Arg Gly Ala Ala

1 5 10 15

Pro Pro Gly Gln Lys

20

<210> 9

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 9

Gln Ala Asn Ala Thr Arg Ile Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys

1	5	10	15
---	---	----	----

Thr Pro Pro Ser Ser
20

<210> 10
<211> 22
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (12)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 10
Arg Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser
1 5 10 15

Gly Glu Pro Pro Lys Ser
20

<210> 11
<211> 21
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (11)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 11
Pro Pro Lys Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Gly Ser Pro Gly
1 5 10 15

Thr Pro Gly Ser Arg
20

<210> 12
<211> 21
<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 12

Pro Lys Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Gly Ser Pro Gly Thr
1 5 10 15

Pro Gly Ser Arg Ser
20

<210> 13

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 13

Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Gly Ser Pro Gly Thr Pro Gly
1 5 10 15

Ser Arg Ser Arg Thr
20

<210> 14

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 14

Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Gly Ser Pro Gly Thr Pro Gly Ser Arg Ser
1 5 10 15

Arg Thr Pro Ser Leu
20

<210> 15
<211> 21
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (11)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 15
Tyr Ser Ser Gly Ser Pro Gly Thr Pro Gly Ser Arg Ser Arg Thr Pro
1 5 10 15

Ser Leu Pro Thr Pro
20

<210> 16
<211> 21
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (11)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 16
Ser Gly Ser Pro Gly Thr Pro Gly Ser Arg Ser Arg Thr Pro Ser Leu
1 5 10 15

Pro Thr Pro Thr Arg
20

<210> 17
<211> 21
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 19
Gly Ser Arg Ser Arg Thr Pro Ser Leu Pro Thr Pro Thr Arg Glu Pro
1 5 10 15

Lys Lys Val Ala Val
20

<210> 20
<211> 20
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (11)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 20
Arg Glu Pro Lys Lys Val Ala Val Val Arg Thr Pro Lys Ser Pro Ser
1 5 10 15

Ser Ala Lys Ser
20

<210> 21
<211> 20
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (11)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 21
Lys Lys Val Ala Val Val Arg Thr Pro Lys Ser Pro Ser Ser Ala Lys
1 5 10 15

Ser Arg Leu Gln
20

<210> 22
<211> 12
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (7)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 22
 Val Lys Ser Lys Ile Gly Ser Thr Glu Asn Leu Lys
 1 5 10

<210> 23
 <211> 21
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (11)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 23
 Thr Asp His Gly Ala Glu Ile Val Tyr Lys Ser Pro Val Val Ser Asp
 1 5 10 15

Thr Ser Pro Arg His
 20

<210> 24
 <211> 21
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (11)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 24
 Ala Glu Ile Val Tyr Lys Ser Pro Val Val Ser Asp Thr Ser Pro Arg
 1 5 10 15

His Leu Ser Asn Val
 20

<210> 25
 <211> 21
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (11)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 25
 Ile Val Tyr Lys Ser Pro Val Val Ser Asp Thr Ser Pro Arg His Leu
 1 5 10 15
 Ser Asn Val Ser Ser
 20

<210> 26
 <211> 20
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (10)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 26
 Tyr Lys Ser Pro Val Val Ser Asp Thr Ser Pro Arg His Leu Ser Asn
 1 5 10 15
 Val Ser Ser Thr
 20

<210> 27
 <211> 21
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (11)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 27

Val Val Ser Asp Thr Ser Pro Arg His Leu Ser Asn Val Ser Ser Thr
 1 5 10 15

Gly Ser Ile Asp Met
 20

<210> 28

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 28

Asp Thr Ser Pro Arg His Leu Ser Asn Val Ser Ser Thr Gly Ser Ile
 1 5 10 15

Asp Met Val Asp Ser
 20

<210> 29

<211> 21

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)

<223> PHOSPHORYLATION

<400> 29

Ser Ser Thr Gly Ser Ile Asp Met Val Asp Ser Pro Gln Leu Ala Thr
 1 5 10 15

Leu Ala Asp Glu Val
 20

<210> 30

<211> 78

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 30

Arg Gly Ala Ala Pro Pro Gly Gln Lys Gly Gln Ala Asn Ala Thr Arg
 1 5 10 15

Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly
 20 25 30

Glu Pro Pro Lys Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Pro Gly Ser
 35 40 45

Pro Gly Thr Pro Gly Ser Arg Ser Arg Thr Pro Ser Leu Pro Thr Pro
 50 55 60

Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys Val Ala Val Val Arg Thr Pro
 65 70 75

<210> 31

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 31

Arg Gly Ala Ala Pro Pro Gly Gln Lys
 1 5

<210> 32

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 32

Gly Ala Ala Pro Pro Gly Gln Lys Gly
 1 5

<210> 33

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 33

Ala Ala Pro Pro Gly Gln Lys Gly Gln
1 5

<210> 34

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 34

Ala Pro Pro Gly Gln Lys Gly Gln Ala
1 5

<210> 35

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 35

Pro Pro Gly Gln Lys Gly Gln Ala Asn
1 5

<210> 36

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 36

Lys Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser
1 5

<210> 37

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 37

Ser Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser

1 5

<210> 38
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 38
 Gly Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Pro
 1 5

<210> 39
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 39
 Asp Arg Ser Gly Tyr Ser Ser Pro Gly
 1 5

<210> 40
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 40
 Pro Ser Leu Pro Thr Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys
 1 5 10

<210> 41
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 41
 Ser Leu Pro Thr Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys
 1 5 10

<210> 42
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 42
 Leu Pro Thr Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys Val
 1 5 10

<210> 43
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 43
 Pro Thr Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys Val Ala
 1 5 10

<210> 44
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 44
 Thr Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys Val Ala Val
 1 5 10

<210> 45
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 45
 Pro Pro Thr Arg Glu Pro Lys Lys Val Ala Val Val
 1 5 10

<210> 46
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (14)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 46
 Ala Thr Arg Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro
 1 5 10 15

<210> 47
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (13)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 47
 Thr Arg Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro
 1 5 10 15

<210> 48
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (12)
 <223> PHOSPHORYLATION

<400> 48
 Arg Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser
 1 5 10 15

<210> 49
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (11)
 <223> PHOSPHORYLATION

 <400> 49
 Ile Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser
 1 5 10 15

<210> 50
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (10)
 <223> PHOSPHORYLATION

 <400> 50
 Pro Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly
 1 5 10 15

<210> 51
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (9)
 <223> PHOSPHORYLATION

 <400> 51
 Ala Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly Glu
 1 5 10 15

<210> 52
 <211> 15
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

```

<220>
<221> MOD_RES
<222> (8)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 52
Lys Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly Glu Pro
  1             5             10             15

<210> 53
<211> 15
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (7)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 53
Thr Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly Glu Pro Pro
  1             5             10             15

<210> 54
<211> 15
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<220>
<221> MOD_RES
<222> (6)
<223> PHOSPHORYLATION

<400> 54
Pro Pro Ala Pro Lys Thr Pro Pro Ser Ser Gly Glu Pro Pro Lys
  1             5             10             15

```

【図面の簡単な説明】

【図1】

重複する合成ペプチド上のタウ抗体、HT7、タウ1、BT2、AT120およびAT270の精密マッピングを示す図である。免疫反応性ペプチドのみを示す。A：ピン上で合成されたペプチド上のマッピング。8アミノ酸が重複する48のノナペプチドを用いて、155～208のタウ領域を網羅した。B：紙上で

のペプチド合成。12アミノ酸長の重複する16ペプチドが、領域202～232のAT120エピトープを画定する。C：領域166～196を網羅するビオチニル化ホスホペプチド（リン酸化されたトレオニンを示す）上のAT270抗体のマッピング。

【図2】

合成ホスホペプチドのスクリーニングによって画定された限りでの、ホスホ-Thr181に対するAT270の特異性を示すグラフである。1 μ g/mlの濃度のストレプトアビジンで被覆したプレート上に、ビオチニル化ホスホペプチドを捕捉した。AT270は、ペルオキシダーゼとカップリングさせた二次抗体を介して検出した。ペプチドの配列を、表1に示す。

【図3】

HT7-AT270アッセイによって決定したホスホタウレベルと、総タウレベル（AT270-（HT7-BT2）アッセイ）との関係を示すグラフである。いくつかのPHF-タウプレパラートを異なる希釈で検定した。数字は、PHF-タウプレパラートの約0.5のOD₄₅₀に相当する希釈からの、異なる2枚のプレート上で二重に検定したとおりの生のデータを示す。グラフ上の棒は、標準偏差である。PHF-A～Dは、アルツハイマー病の脳の前頭側頭皮質に由来し、PHF-Eは、海馬領域から調製した。

【図4】

前頭側頭痴呆、パーキンソン病、アルツハイマー病および皮質下動脈硬化性脳症におけるCSF-総タウの散乱プロットを示すグラフである。

【図5】

前頭側頭痴呆、パーキンソン病、アルツハイマー病および皮質下動脈硬化性脳症におけるCSF-ホスホタウ（181）の散乱プロットを示すグラフである。

【図6】

CSF-総タウとCSF-ホスホタウ（181）との、研究でのすべての個体を包含する相関関係のプロットを示すグラフである。

【図7】

前頭側頭痴呆、パーキンソン病、アルツハイマー病および皮質下動脈硬化性脳

症の患者からのCSF中のホスホタウ（181）／総タウ比の散乱プロットを示すグラフである。

【図8】

急性卒中後の異なる時点でのCSF－総タウ（左）およびCSF－ホスホタウ（181）（右）を示すグラフである。柱は平均値であり、棒はSDである。異なる時点でのサンプル数；0～1日：n=9、2～3日：n=18、7～9日：n=22、3週：n=21、3～5月：n=21。0～1日と比較した有意度；CSF－タウについては、2～3日：p=0.002、7～9日：p<0.0001、3週：p<0.0001、3～5月：p=0.035、CSF－ホスホタウについては、0～1日と比較していかなる時点でも有意差はなかった。

【図9】

1日目にCSFサンプルを採取した患者9名についての、異なる時点でのCSF－総タウ（左）およびCSF－ホスホタウ（181）（右）の個々の値を示すグラフである。

【図10】

アルツハイマー病の患者（n=54）、および対照（n=17）（左）、ならびに急性卒中の患者（n=22、サンプル数=91）（右）におけるCSF－総タウとCSF－ホスホタウ（181）との相関関係を示すグラフである。

【図1】






Figure 1

【図2】


AT 270




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】



【図9】



【図10】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/EP 01/00560		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N33/68 A61K38/17 C07K14/47		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G01N A61K C07K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, STRAND, WPI Data, PAJ, BIOSIS		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 95 17429 A (INNOGENETICS NV ;VANDERMEEREN MARC (BE); VANMECHELEN EUGEN (BE);) 29 June 1995 (1995-06-29) cited in the application abstract; claims 1-17 ---	1-14, 18-20
Y	OTTO MARKUS ET AL: "Elevated levels of tau-protein in cerebrospinal fluid of patients with Creutzfeldt-Jakob disease." NEUROSCIENCE LETTERS, vol. 225, no. 3, 1997, pages 210-212, XP001003009 ISSN: 0304-3940 the whole document --- -/--	1-20
☒ Further documents are listed in the continuation of box C.		☒ Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents:		
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *G* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 23 July 2001		Date of mailing of the international search report 30/07/2001
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Gundlach, B

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 01/00560

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	BLENNOW K ET AL: "Tau protein in cerebrospinal fluid: A biochemical marker for axonal degeneration in Alzheimer disease?" MOLECULAR AND CHEMICAL NEUROPATHOLOGY, vol. 26, no. 3, December 1995 (1995-12), pages 231-245, XP001006261 ISSN: 1044-7393 the whole document ---	1-20
X	WO 94 13795 A (INNOGENETICS NV ;VANDERMEEREN MARC (BE); MERCKEN MARC (US); VANMEC) 23 June 1994 (1994-06-23) abstract; claims 1,12-15 ---	1-20
X	WO 96 04309 A (INNOGENETICS NV ;VANMECHELEN EUGEN (BE); VOORDE ANDRE VAN DE (BE)) 15 February 1996 (1996-02-15) abstract; claims 1,12 ---	1-20
X	WO 97 34145 A (MITSUBISHI CHEM CORP ;ISHIGURO KOICHI (JP); SATO KAZUKI (JP); PARK) 18 September 1997 (1997-09-18) abstract ---	1-20
X	WO 94 18560 A (TEIJIN LTD ;HOSODA KENJI (JP); EGUCHI HIROSHI (JP); NAKAMOTO TADAK) 18 August 1994 (1994-08-18) abstract ---	1-20
X	WO 93 03369 A (VOORHEIS PAUL H) 18 February 1993 (1993-02-18) abstract; claims 1-5 ---	1-20
X	WO 99 62548 A (GHETTI BERNARDINO; FARLOW MARTIN R; GOEDERT MICHEL; KLUG AARON; MURRELL) 9 December 1999 (1999-12-09) abstract ---	8-11, 15-17
A		4-6, 11-20
P,X	VANMECHELEN E ET AL: "Quantification of tau phosphorylated at threonine 181 in human cerebrospinal fluid: A sandwich ELISA with a synthetic phosphopeptide for standardization." NEUROSCIENCE LETTERS, vol. 285, no. 1, 5 May 2000 (2000-05-05), pages 49-52, XP000972339 ISSN: 0304-3940 the whole document --- -/--	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 01/00560

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
T	HESSE CAMILLA ET AL: "Transient increase in total tau but not phospho-tau in human cerebrospinal fluid after acute stroke." NEUROSCIENCE LETTERS, vol. 297, no. 3, 19 January 2001 (2001-01-19), pages 187-190, XP001004722 ISSN: 0304-3940 page 188, right-hand column, line 3 -page 189 abstract -----	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 01/00560

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9517429 A	29-06-1995	AU 698383 B	29-10-1998
		AU 1273695 A	10-07-1995
		CA 2178212 A	29-06-1995
		EP 0737208 A	16-10-1996
		JP 9506771 T	08-07-1997
		US 6008024 A	28-12-1999
WO 9413795 A	23-06-1994	AT 165866 T	15-05-1998
		AU 690092 B	23-04-1998
		AU 5809794 A	04-07-1994
		CA 2150816 A	23-06-1994
		DE 69318420 D	10-06-1998
		DE 69318420 T	28-01-1999
		DK 673418 T	01-03-1999
		EP 0673418 A	27-09-1995
		ES 2118373 T	16-09-1998
		JP 2879975 B	05-04-1999
		JP 8502898 T	02-04-1996
		US 5843779 A	01-12-1998
		US 6232437 B	15-05-2001
		US 5861257 A	19-01-1999
		US 6010913 A	04-01-2000
WO 9604309 A	15-02-1996	AU 710952 B	30-09-1999
		AU 3223495 A	04-03-1996
		CA 2195672 A	15-02-1996
		EP 0772634 A	14-05-1997
		JP 10506381 T	23-06-1998
		US 6121003 A	19-09-2000
WO 9734145 A	18-09-1997	NONE	
WO 9418560 A	18-08-1994	JP 6239899 A	30-08-1994
		AU 6010494 A	29-08-1994
WO 9303369 A	18-02-1993	AU 2414092 A	02-03-1993
		EP 0600951 A	15-06-1994
		US 5492812 A	20-02-1996
WO 9962548 A	09-12-1999	AU 4322999 A	20-12-1999

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	タームコード [*] (参考)	
G O 1 N	33/15	G O 1 N	33/15	Z
	33/50		33/50	Z
	33/53		33/53	D
	33/577		33/577	B
(31)優先権主張番号 0 0 8 7 0 2 8 0 . 5				
(32)優先日 平成12年11月22日(2000. 11. 22)				
(33)優先権主張国 欧州特許庁 (E P)				
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW				
Fターム(参考) 2G045 AA34 CA30 CB30 FB03				
4C084 AA16 NA14 ZA152 ZA162				
ZC642				
4H045 AA10 AA30 BA13 BA15 BA18				
EA50				

专利名称(译)	诊断为taopathy		
公开(公告)号	JP2003521499A	公开(公告)日	2003-07-15
申请号	JP2001555812	申请日	2001-01-18
[标]申请(专利权)人(译)	酒店卢武铉遗传学NV 基因创新有限公司		
申请(专利权)人(译)	酒店卢武铉遗传学NV		
[标]发明人	ファンメハーレンエーゲーン ファンデルステイケーレヒューゴ		
发明人	ファンメハーレン,エーゲーン ファンデルステイケーレ,ヒューゴ		
IPC分类号	G01N33/50 A61K38/00 A61K38/17 A61K45/00 A61P25/28 A61P43/00 C07K7/06 C07K14/00 C07K14/47 G01N33/15 G01N33/53 G01N33/577 G01N33/68		
CPC分类号	A61K38/00 A61P25/28 C07K14/4711 G01N33/6896 G01N2500/00 G01N2800/28 G01N2800/2821 G01N2800/52 Y10S435/975 Y10T436/10		
FI分类号	C07K7/06.ZNA A61K45/00 A61P25/28 A61P43/00.111 C07K14/00 G01N33/15.Z G01N33/50.Z G01N33/53.D G01N33/577.B		
F-TERM分类号	2G045/AA34 2G045/CA30 2G045/CB30 2G045/FB03 4C084/AA16 4C084/NA14 4C084/ZA152 4C084/ZA162 4C084/ZC642 4H045/AA10 4H045/AA30 4H045/BA13 4H045/BA15 4H045/BA18 4H045/EA50		
优先权	2000870008 2000-01-24 EP 60/178391 2000-01-27 US 2000870280 2000-11-22 EP		
其他公开文献	JP5247963B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供了基于个体中磷酸化tau (181) /总tau比的检测来诊断个体中tauopathy和/或相对于非tauopathy有区别地诊断tauopathy的方法。 本发明进一步提供了用于本发明方法中标准化的磷酸肽。

